Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30549711

55191

METHODUS FOLIORUM,

Seu Plantæ *Floræ Monſpelienſis*, juxta foliorum ordinem, ad juvandam ſpecierum cognitionem, digeſtæ.

Autore F. B. DE SAUVAGES, *Regis Conſiliario ac Medico in Univerſitate Monſpelienſi, Medicinæ Profeſſore Regio, Societat. Regiæ Scientiarum Londinenſis, Monſpelienſis, Upſalienſis, & Academiæ Suecicæ Socio.*

METHODE

Pour connoître les Plantes par les Feüilles.

A LA HAYE.

M. DCC. LI.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

A MONSIEUR LINNÆUS,

Conſeiller, Medecin du Roy de Suede, Profeſſeur Royal de Medecine, d'Hiſtoire Naturelle, & Intendant du Jardin des Plantes à Upſal, Membre des Academies des Curieux de la Nature, d'Upſal, Stockolm, Berlin, Montpellier &c.

MONSIEUR,

VOUS avez très-bien penſé, que les deux grands fondemens de l'Hiſtoire Naturelle & ſurtout de la Botanique, ſont la méthode & la Nomenclature; la Méthode conſiſte dans l'ordre ſelon lequel on arrange les parties de ſon ſujet, & ſans cet arrangement tout n'eſt que confuſion & qu'obſcurité. Rondelet, qui fut en cette Province le Reſtaurateur de la Botanique, quoiqu'il n'ait rien écrit ſur les Plantes, obſerve avec raiſon, que ſi on ſe propoſe de connoître & de diſtinguer dans un tas de graines celles de differentes Plan-

tes, on perdra ſon tems & ſa peine, à moins qu'on commence à faire differents petits tas où l'on mette enſemble toutes celles qui ſe reſſemblent & en differens lieux celles qui different entr'elles ; & il faudroit n'avoir aucune idée d'Hiſtoire Naturelle que de prétendre l'enſeigner en confondant pêle-mêle tous les ſujets ſans avoir aucun égard à leur ſimilitude, & à leur difference.

Cependant peu de gens ont une juſte idée de l'utilité & de l'avantage de cet arrangement ; ils ne ſentent pas que cet ordre eſt fait ſeulement pour faciliter la diſtinction des Plantes ; ils voudroient qu'il ſervît à en faire connoître l'eſſence ; & comme l'eſſence des choſes nous eſt & nous ſera toujours inconnuë, ils en concluent que les méthodes qui ne peuvent atteindre à ce but ſont inutiles. Il ſeroit ſans doute à ſouhaiter qu'on connût la ſtructure intime de chaque Plante & le caractére des ſucs qui coulent dans leurs tuyaux ; car comme nous n'étudions gueres la Botanique que pour parvenir à connoître les vertus des Plantes, & que ces vertus dépendent (dit-on) de la compoſition de leurs tuyaux & de leurs liqueurs, on ſe flatte que la connoiſſance de ces principes nous meneroit plus ſûrement que l'obſervation à la connoiſſance des vertus ; mais malheureuſement toutes ces prétentions ſont deſtituées de fondement, car la ſtructure des plus petits vaiſſeaux & la proportion des élemens qui entrent dans la compoſition des Plantes, échapent à nos ſens ; & par le peu que nous en connoiſſons, nous ne ſommes gueres plus avancés pour la connoiſſance des vertus.

Il faut donc pour connoître les Plantes s'en tenir aux phénoménes ou aux proprietés qui tombent ſous nos ſens ; parmi ces phénomenes il y en

a de mécaniques & de Phyſiques ; ceux de la premiere ſorte ſont la grandeur reſpective, la figure, le nombre, la ſituation des parties des Plantes ; les phénomenes Phyſiques ſont les qualités ſenſibles dont nous n'avons qu'une idée confuſe ; telles ſont les couleurs, odeurs, ſaveurs, dureté, molleſſe, &c.

Les phénomenes mécaniques dont nous avons tous des idées diſtinctes & indépendantes des ſens, ſont les ſeuls principes ſur leſquels vous nous avez apris, MONSIEUR, qu'il falloit élever l'édifice de l'Hiſtoire Naturelle. Ce ſont en effet les ſeules connoiſſances diſtinctes qui forment la Science, qui caractériſent l'entendement ; les connoiſſances confuſes ſont le partage de l'inſtinct ; l'homme a ces deux ſortes de connoiſſances, mais c'eſt l'entendement qui le diſtingue des bêtes. Vous avez très-bien remarqué que celles-cy connoiſſoient par inſtinct très-clairement les Plantes, comme le chien connoît le *chien-dent* pour le manger, le bœuf connoît les renoncules pour les éviter ; & vos recherches ſur ce ſujet ſont d'une utilité conſiderable. *

Mais l'homme connoîtroit peu ſon avantage s'il vouloit s'en tenir à cette connoiſſance confuſe, qui ne lui ſuffiroit certainement pas, quoiqu'elle ſuffiſe à la bête, vû qu'elle a les organes des ſens plus parfaits, & ce ſeroit en vain que l'entendement & la raiſon lui auroient été accordés, s'il n'en faiſoit pas uſage pour diſtinguer les Plantes, mineraux & animaux, par des idées diſtinctes, par des noms & des caractéres.

Ces caractéres ou notes intrinſeques aux Plantes auſquelles on peut les connoître & les diſtinguer, ne doivent donc ſe prendre, autant qu'il eſt poſ-

* Par Suecanus. *Upſal.* 1749.

ſible, que des principes mécaniques ; ceux qui ont voulu avoir égard, comme l'Illuſtre Mr. de Tournefort, aux couleurs, odeurs, &c. ſont tombés dans un excès que vous ſeul nous avez fait ſentir ; le nombre des eſpeces eſt devenu infini entre leurs mains, & par-là la Botanique extrêmément longue & difficile ; s'il y a autant d'eſpeces de Renoncules & de Tulipes qu'il y a de varietés dans leurs couleurs, odeurs, &c. il faudra paſſer ſa vie à n'étudier que ces deux genres, & on ne viendra jamais à bout de les épuiſer ; & après tout ce travail, trouverons-nous quelque difference dans leurs vertus rélatives à cette diverſité de couleurs ? Laiſſons cet amuſement aux Fleuriſtes & aux amateurs des papillons & des coquilles : l'Hiſtoire Naturelle a des bornes, ſi on détermine les eſpeces par les principes mécaniques, & c'eſt une obligation qu'on vous a de les avoir fixées.

L'arrangement des Plantes n'eſt jamais ſi clair que quand on le fait en Claſſes, Ordres, Genres & Eſpeces ; les eſpeces ſont les reſſemblances des individus dans leurs principes mécaniques, comme les genres ſont les reſſemblances des eſpeces dans les parties de la fructification quant à la figure, la grandeur reſpective, le nombre, &c. Si on ne ſait pas que le plus & le moins ne change pas les reſſemblances ni par conſequent les eſpeces, on tombera dans l'erreur de croire que des Plantes comme le Bouleau haut de trente pieds eſt une eſpece à part, ou même un genre à part du Bouleau haut d'un piéd, quoique cette difference des hauteurs ne vienne que du terrain, & en conſéquence de cette erreur on éloignera & on placera en des Claſſes differentes les arbres & les herbes quoique de même eſpece ou de même genre, ce

qui augmentera du double le nombre des Claſſes.

Juſqu'ici on n'avoit connu dans les Plantes & les autres ſujets de l'Hiſtoire Naturelle que certains caractéres pris arbitrairement, les uns des calyces, les autres des petales, &c. & il eſt bien vrai que ces caracteres ne peuvent embraſſer toutes les Plantes; car les unes n'ont point de calyce, les autres point de petales; ainſi ces mêthodes ſont toutes particulieres, & par-là défectueuſes; ce qu'on reproche à la méthode tirée des étamines peut être reproché à toutes les autres; mais il faut ignorer que vous avez établi les genres de toutes les Plantes ſur toutes les parties de la fructification pour vous adreſſer à vous ce reproche. Il falloit pourtant donner un ordre à ces genres, & un ordre que d'autres n'euſſent pas donné, fourniſſoit de nouvelles lumieres à la Botanique, nonobſtant que cet ordre ne fût pas meilleur que ceux qu'on avoit déja.

Il eſt ſans contredit que la méthode qui raſſemble les Plantes qui ont le plus grand nombre d'affinités, & que vous appellés *Méthode naturelle*, eſt préferable à toutes les autres; mais qui le ſçait mieux que vous, MONSIEUR, qui le premier nous avez donné des fragmens de cette méthode & les principes ſur leſquels Mr. Van Royen (*a*) & Mr. de Haller (*b*) ont élevé celles qui meritent le mieux ce nom. Il faut convenir pourtant que pas une n'eſt ſi facile que les méthodes artificielles, & qu'à en juger par l'utilité, celles qui ſont les plus faciles ſont préferables à toutes les autres. En effet, à quoi ſert une méthode Botanique, ſi ce n'eſt à faciliter aux Commençans la connoiſſance des noms génériques & ſpécifiques des Plantes qu'on rencontre, & il n'y a ſûre-

(*a*) Floræ Leydenſis prodromus. *Leydæ*. 1740. 8°.
(*b*) Enumeratio Stirpium Helvetiæ. *Gettting*. 1742. folio.

ment que ceux qui n'ont jamais fait uſage de votre méthode ni d'aucune autre pour découvrir les Plantes, & qui ne les ont apriſes que par tradition & par routine, qui n'en ſentent pas l'excellence & la ſuperiorité.

v Toutes les Plantes n'ont pas des étamines ſenſibles, & le nombre, le rapport de ces parties varie, j'en conviens, vous en convenés auſſi; & on a mauvaiſe grace de vous le reprocher: Ne nous avez-vous pas donné pour parer à cet inconvenient un Volume qui comprend toutes les Méthodes connuës juſqu'à vous, afin que les Commençans puſſent ſe ſervir d'autant de differens caractéres pour mieux s'aſſurer du genre de la Plante qu'ils examinent: j'ai beau chercher dans les Inſtitutions de Mr. de Tournefort une Veronique; en ſuivant ſes regles elle doit être parmi les fleurs monopetales anomales, & cependant elle y eſt parmi les regulieres; cette fleur faite en roſette eſt placée parmi celles faites en entonnoir; la méthode des fruits de Boerhaave y devient très-difficile à cauſe de la petiteſſe des capſules; mais on n'a qu'à jetter les yeux ſur le nombre des étamines & dans l'inſtant la methode ſexuelle la fera diſtinguer, & ainſi de cent autres.

Il eſt vrai que ſi on veut découvrir par cette méthode ſexuelle un genre de fleur compoſée, on ſe trouve ſouvent fort embarraſſé, mais on a la reſſource, dans cette Claſſe, de la méthode des calyces que vous avez perfectionnée: & ſi on y fait attention, la découverte d'un genre devient un probléme dont on trouve la ſolution avec un plaiſir ſingulier, quand on y applique ſucceſſivement les differentes méthodes; ceux qui connoîtront la Table miſe à la fin de votre Livre des Claſſes, & qui ſçauront s'en ſervir pour reſoudre

ces

ces problémes, verront que cette Table avance plus la Botanique que n'ont fait juſqu'ici de grands volumes pleins de deſcriptions ſans ordre & ſans caractére, ou qui pis eſt, plein de commentaires & de diſcuſſions critiques.

Il eſt donc avantageux d'avoir beaucoup de méthodes differentes, pourvû que les genres & les eſpeces reſtent les mêmes & ſans alteration, c'eſt pourquoi j'ai crû pouvoir en donner une qui loin d'exclure les autres les ſuppoſe connuës; car la méthode des feüilles ne ſuffit pas pour connoître les genres, non plus que les autres ne ſuffiſent pas pour diſtinguer les eſpeces, au moins avec facilité. Mais je me ſuis bien gardé de toucher aux genres ni aux eſpeces déja bien établies; & je me ſuis contenté de propoſer mes doutes ſur celles qui ne le ſont pas encore.

Je vous doits ici des remercimens pour les caractéres eſſentiels des Plantes & pour les noms ſpécifiques des animaux, que vous avez bien voulu à ma ſollicitation donner en Public dans la ſeptiéme Edition de vôtre Syſtéme; ces caractéres eſſentiels abrégent extrêmément les recherches, & on ne ſauroit trop les abreger pour ceux qui comme les Medecins ne veulent pas aprofondir l'Hiſtoire Naturelle, mais ſe contentent de s'aſſurer des Plantes, des animaux, &c. dont ils tirent des médicamens. On a beau dire que ces Plantes ſe reduiſent à un petit nombre; pour diſtinguer celles qui ſont uſuelles d'avec celles qui ne le ſont pas, il eſt néceſſaire de connoître les unes & les autres.

La Nomenclature ou juſte dénomination des Plantes eſt le ſecond fondement de la Botanique; & c'eſt ſur quoi les hommes les plus raiſonnables n'ont point de honte de n'écouter jamais leur raiſon. Nous ſommes, diſent-ils, faciles

ſur les noms, pouvû qu'on ſoit d'accord ſur les choſes; il eſt vrai que dans les converſations légeres ce ſeroit pédanterie d'en uſer autrement; mais il n'en eſt pas de même dans les Siences ſérieuſes, & il n'eſt pas poſſible de convenir des choſes, ou d'en avoir une idée diſtincte, ſi on ne convient auparavant des noms, ou ſi les termes de l'Art que l'on traite ſont équivoques, & n'ont aucune valeur fixe & déterminée. Un Philoſophe ne doit parler que pour ſe faire entendre; & comme les termes de l'Art qu'on enſeigne ſont cenſés nouveaux ou obſcurs pour ceux qui y ſont apprentis, un Profeſſeur ne peut s'en ſervir qu'après en avoir déterminé le ſens par une bonne définition. Les Géometres feroient bien peu de chemin, ſi au lieu d'un *Cercle*, d'un *Cylindre*, d'un *Cône*, ils employoient le mot vague de *rond* ſans l'avoir défini. Les Payſans n'ont que des notions confuſes des Plantes, non plus que les Oiſeaux & les Quadrupedes & ce qui le fait voir, c'eſt qu'ils ne peuvent énoncer leurs caracteres par des noms; ainſi un Payſan entendant ſous le nom vague de *Sauge* le Phlomis, l'Hormin, le Cataria & grand nombre d'autres genres, ne peut ſe former une idée diſtincte de chacune, & encore moins de leurs eſpéces. Les noms ſont enfin pour nos idées ce que les chiffres ſont pour les nombres: ſi en rendant un compte on ne donne pas à un tel chiffre une valeur fixe & conſtante, mais qu'on lui faſſe ſignifier tantôt ſept tantôt cinq, il eſt bien évident que le compte ſera faux, & qu'il faut être dupe ou fripon pour le faire tel: De même il faut vouloir tromper ou être trompé, ſi les termes qu'on employe dans le raiſonnement ſérieux, qui eſt une eſpece de reddition de compte, ſignifient

indiſtinctement diverſes choſes que la ſuite du diſcours ne détermine pas.

Les définitions des mots génériques dont on ſe ſert pour déſigner un genre, doivent donc être conſtantes, & les épithetes qu'on attache à chaque eſpece du genre doivent en être les définitions, ſans quoi elles ſont ou défectueuſes, ou ſuperfluës, & toujours érronées.

Les premiers Hommes qui ont donné les noms vulgaires aux Plantes, ont été des Herboriſtes, qui ignoroient les attentions qu'il falloit avoir pour en donner de bons; ainſi les ſçavans Botaniſtes ont dû & pû choiſir parmi ces differens noms, que chaque Plante avoit en differens pays, celui qui valoit le mieux; les noms latins, & ceux qui empruntés des Grecs ont été latiniſés, étoient, tout le reſte égal, préférables aux autres; & pour l'uniformité on n'en a dû recevoir que de pareils. C'eſt ainſi que les Tourneforts, les Rays, ont exclus tous les noms barbares & patois, & adopté les latins, quoique moins uſités, parce qu'il faut un langage uniforme & qui ſoit intelligible aux Sçavans du plus grand nombre des Nations; & ce langage eſt le latin.

Les noms latins les plus courts, s'ils ſont auſſi propres à faire diſtinguer le genre ſont les meilleurs; ainſi il a fallu exclure les noms compoſés, tels que *Herba Stæ. Kunigundis*, *H. S. Ruperti*, pouvant les rendre par le nom d'*Eupatorium*, de *Geranium*, quoique moins uſités; & peu à peu les Hommes ſe ſont accoûtumés à ces noms plus courts. Si un nom exprime quelque caractére de la Plante, il eſt préférable de cela ſeul à ceux qui n'en expriment point; ainſi le nom d'*Epilobium*, qui exprime que dans ce genre la fleur eſt portée ſur l'extrêmité d'une ſilique, porte une note intrinſéque

à la Plante, & vaut mieux que *Chamænerion*, qui porte une reſſemblance peu réelle avec le *Laurier-roſe*.

Les noms latins, courts & expreſſifs, ſont au ſurplus d'autant meilleurs, qu'ils ſont plus généralement reçus ou connus, parce qu'on en retient plus facilement l'idée; ainſi les noms *Officinaux* ſont préferables, tout le reſte égal, à ceux qui ne le ſont pas. *Scilla* eſt préférable à *Ornithogalum*, *Satyrium* à *Orchioides*. Suivant ces regles les noms ſpécifiques que Caſpar Bauhin ſubſtitua dans ſon Pinax à tant d'autres, qui de ſon tems étoient les ſeuls uſités, n'étoient pas les meilleurs, & l'uſage qu'on en a fait depuis lui juſqu'à nous, ne les a pas rendu préferables à d'autres. Mr. de Tournefort a été en droit d'en ſubſtituer de nouveaux, comme vous, MONSIEUR, d'en ſubſtituer à ceux de Mr. de Tournefort, tels que *Datura* offic. au *Stramonium Scilla* offic. a *ornithogalum*, *Anchuſa* offic. à *Bugloſſum*, parce qu'un homme ſenſé qui trouve pluſieurs noms pour une même Plante ne doit pas choiſir le pire, ni ſe laiſſer conduire par l'exemple ou la coûtume comme les moutons, quand la raiſon eſt contraire à cette coûtume.

Entre deux noms également bons, celui qui eſt le plus uſité eſt le meilleur ſans doute; mais l'uſage d'un nom ne lui ſuffit pas pour le rendre bon: Mr. Winſlow, tout modeſte qu'il ſoit, n'a-t'il pas changé les noms réçûs de la plûpart des muſcles, parce qu'ils étoient érronés; on ne lui a pas fait ſon procès pour cela: N'y aura-t'il que les Plantes dont on ne puiſſe changer les noms; ſi c'eſt le changer que de trier & de mettre à part le meilleur pour s'en ſervir, ſauf aux autres de prendre celui qu'ils voudront.

Ces noms ſont la matiere la plus commune des querelles parmi les Botaniſtes; mais qui eſt-ce qui

les ſuſcite ? Tous les Apoticaires ſe ſont élevés contre Mr. de Tournefort, pour avoir mis à l'écart des noms qui leur étoient plus familiers ; ils auroient voulu que le *Gnaphalium* eût retenu le nom de *Pes cati*, l'*Arum* de *Pes vituli*, l'*Hieracium* de *Lactuca leporis*, la *Parietaire* d'*Herba Stæ. virginis*, &c. Mais par la même raiſon il devroit proſcrire ces noms pharmaciens, parce qu'ils ne ſont pas connus dans d'autres Provinces ; car de dix en dix lieuës la même Plante a des noms differens : Comment ſatisfaire tout le monde ?

Ce qui fait le mécontentement de la plûpart des gens, c'eſt qu'ils ſe figurent qu'on n'a ſuivi que ſon caprice dans ces changemens ; ou que c'eſt pour le plaiſir de s'écarter de la route ordinaire qu'on les a faits ; mais un peu de reflexion ſur les regles que vous avez données (*a*) dans la *Critique Botanique*, leur feroit voir que cette Nomenclature n'eſt pas ſi arbitraire qu'ils penſent : n'importe, le préjugé du Peuple l'emportera toujours parmi eux ſur les raiſons les (*b*) meilleures, & vous ne viendrez jamais à bout de faire croire à ces génies qu'un *Enfant*, qu'une *Femme*, par exemple, ſont des *Hommes*, parce qu'en françois le mot d'*Homme* eſt pris communément pour l'homme mâle, ou l'homme fait, & il paroit ridicule de dire en cette langue, ce qui ne l'eſt ni en grec ni en latin, ni dans la réalité, que ce genre comprend le mâle & la femelle. Suivant ces beaux préjugés toute *Perdrix* doit être femelle, en vertu du nom que l'uſage lui donne, & un *Pinſon* ne ſçauroit faire des œufs, parce que le nom le détermine à être mâle. Voilà, MON-

(*a*) Critica Botanica. 8°. *Leydæ* 1737.

(*b*) Des Cenſeurs reprochent à Mr. Linnæus, d'avoir mis differents ſujets de l'Hiſtoire naturelle, ſous un nom générique, comme d'avoir rapporté la femme, l'enfant, ſous le nom d'*Homme*, le Taureau, le Veau, le Vache, ſous le genre de Bœuf.

SIEUR, les beaux raiſonnemens que le Peuple fait contre la Nomenclature que les Philoſophes employent. Voyez s'ils valent la peine d'être refutés.

Le commun des gens n'a aucune notion de genre ni d'eſpece, comme il paroit par cette façon de penſer, qu'un *Enfant eſt un Enfant, & non un Homme*, que le *Scordium* n'eſt pas un *Teucrium*, ni le *Bon-henri* un *Chenopodium*, ni le *Merle* une eſpece de *Tourdre*, ni le *Rhomb* une eſpece de *Sole*: Il ne trouve pas étrange que les Poiſſonniers faſſent trois genres differens de la *Dorade*, ſelon ſes trois differens âges, & il ſuffit qu'un végétal, un animal, lui ſoit extrêmement familier, pour qu'il érige ſes moindres varietés en des genres, tandis qu'il voudroit confondre ſous ce même nom ceux qui ſont étrangers ou rares. De là il arriveroit qu'une méthode & une Nomenclature qui conviendroit en un pays, ſeroit fauſſe dans un autre, & par conſéquent ne pourroit ſe ſoûtenir. Il faut donc qu'un Naturaliſte ſe mette au-deſſus de ces ſortes de préjugés, qui dépendent de la langue, des uſages & des pays, ſans quoi on érigeroit tous les individus en eſpeces, & toutes les eſpeces en genres: Bientôt le ſexe, l'âge, ſuffiroit pour les établir, & il faudroit croire avec le Peuple que le Poulet, la Poule, le Chapon, &c. ſont d'autres eſpeces que le Coq; parce qu'il a plû de leur donner un nom propre diſtinct, comme Mr. de Tournefort a crû que le Pommier, le Poirier & le Coignaſſier étoient des arbres de differens genres, quoiqu'ils ayent une grande reſſemblance dans toutes les parties de la fructification, reſſemblance qui fait le genre.

Ceux qui font ces objections font voir clairement qu'ils n'ont pas juſqu'ici connu l'utilité & l'avantage d'une bonne méthode; car s'ils l'avoient compris, ils auroient vû auſſi qu'il eſt eſſentiel de

diſtinguer les genres des eſpeces, & celles-cy des varietez, ſans quoi le nombre des eſpeces devenant tous les jours plus grand & comme infini, les Botaniſtes ne parviendroient jamais au but qu'ils ſe propoſent, & leur étude n'auroit point de bornes.

Vous avez rendu la Botanique très-aiſée, MONSIEUR, & l'avés élevée ſur des principes qui lui donnent un air de Science, au lieu que ce n'étoit autrefois qu'une routine; on vieilliſſoit à apprendre par cœur, comme des Perroquets, quelques milliers de phraſes ſouvent inutiles & inintelligibles; le nombre des Botaniſtes étoit ſi petit qu'à peine en France en connoiſſoit-on deux ou trois dans le même tems; les apprentis n'aprenoient rien que par tradition, heureux ceux qui avoient bonne mémoire; car un homme eût été un ſot, ſi lui montrant une Plante, il n'eût ſçû prononcer ſur le champ le nom, tout bizarre qu'il fût, qu'il avoit plû à Jean ou à Caſpar Bauhin de lui donner, comme *Gramen gros montbelgard.* J. B. *Gramen ſpicâ hirſutâ ad gramen du gros accedens.* J. B. Et comment retenir tant de noms qui ne ſignifioient rien & qui n'avoient aucun rapport avec la Plante, à moins de paſſer ſa vie à les repeter ſous les yeux du maître, ou à les confronter avec des deſcriptions confuſes d'une longueur infinie & des figures ſouvent déplacées, comme celles de J. Bauhin; il falloit même avoir pour cet effet une grande Bibliothéque Botanique, ce qui eſt d'une grande dépenſe, au lieu qu'aujourd'hui avec deux petits volumes un homme en s'amuſant peut ſeul, découvrir le caractére & par conſéquent le nom & ſurnom de toutes les Plantes de la campagne en moins de trois mois, aux ſeules heures de recréation. Vos noms ſpécifiques ſont des ſignalemens qu'on peut, ſi on veut, ne confier qu'à un

Catalogue, ſi on a des choſes plus importantes à retenir dans ſa memoire, ces ſignalemens feront dans le beſoin reconnoître la Plante qu'on cherche.

La connoiſſance ſera d'autant plus certaine qu'on connoîtra chaque Plante par un plus grand nombre de caractére, & c'eſt à quoi ſervent les diverſes méthodes. Je trouve, par exemple, aux champs un arbre dont les feüilles ſont conjuguées, dont la fleur eſt pentapetale reguliere, dont le fruit eſt charnu contenant pluſieurs pepins; par la méthode des feüilles je trouve qu'elle eſt de la Claſſe neuviéme, Ordre VI. où je trouve le ſeul *Sorbier* qui ait ces caractéres; mais ſi je compte les piſtilles, comme c'eſt auſſi la ſeule de cet Ordre qui en ait trois ſelon les genres que vous avez donnés, je me confirme dans la verité, & confrontant ulterieurement tous les caractéres que vous y raſſemblés & qui forment les méthodes de Ray, Ruppius, Boerhaave, Tournefort, Hebenſtreit, Knaut & autres, dans un moment je m'aſſure parfaitement que c'eſt l'arbre cherché; & il n'arrive gueres qu'on oublie ce qu'on a eu le plaiſir de découvrir d'une façon qui flatte la vanité & l'amour propre, ainſi qu'un Géometre retient aiſément la ſolution d'un probléme qu'il a trouvée: au ſurplus on peut commencer par la fleur, par le calyce, par le fruit, de même que par les feüilles, en un mot ſuivre telle méthode que l'on veut & que la ſaiſon permet; on parvient également de l'eſpece au genre ou du genre à l'eſpece.

Ce que j'en dis icy, MONSIEUR, n'eſt ſûrement pas pour vous apprendre quelque choſe de nouveau, ce ſeroit plûtôt pour repeter ſous vos yeux ce que vous m'avez appris, pour voir ſi je ſaiſis bien votre penſée; mais j'ai voulu par cette Lettre

Lettre donner aux apprentifs une idée générale des méthodes, & ſaiſir cette occaſion pour vous remercier des excellens Ouvrages que vous donnés au Public; ſans leſquels je vous avouë que je n'aurois jamais rien apris dans la Botanique: Je vous dois en mon particulier des remercimens pour cette tendre & conſtante amitié dont vous m'honorés depuis que Mr. Boerhaave voulut bieu former entre nous cette liaiſon qui m'eſt infiniment précieuſe. Que de belles découvertes en Hiſtoire Naturelle, en Medecine, Théorique & Pratique ne me communiquez-vous pas! Vos Eleves répandus par ordre du Roy de Suede dans toutes les parties du Monde, vous mettent à même de ſçavoir tout ce qu'il y a de nouveau & de curieux; & vous ſeul en découvrez plus que tous vos Correſpondans enſemble: Vous répondez aux envieux Cenſeurs en faiſant mieux qu'eux; & les laiſſant dans le deſeſpoir de jamais vous atteindre, vous paroiſſez n'être ſenſible qu'au plaiſir de rendre ſervice au Public par vos travaux, à celui d'inſtrulie les Eleves que vos Ouvrages forment dans tous les pays, & de faire avancer les Sciences que vous avez embraſſées avec une rapidité qui n'a pas d'exemple.

Au reſte vous ne trouverez pas dans cet Ouvrage tout ce que vous en attendiés. Le Pays eſt certainement fertile en belles Plantes, & celles de l'Eſperou que j'ai ajoûtées à celles du *Botanicum Monſpelienſe*, ne laiſſent pas de faire un Recuëil fort ample; mais vous auriés voulu que j'y euſſe détaillé le caractére des eſpeces, quelques nottes ſur les lieux d'où elles viennent, ſur leur uſage dans les Arts, dans la Medecine, & j'avouë que c'eût été mieux; cependant ſi vous conſiderez que je ſuis chargé d'enſeigner les Plantes par un Brevet

du Roy, qui n'a lieu que pour quelques années; que je ne puis employer à cette étude que quelques heures de récréation; que je ne puis gueres viſiter les Plantes de la campagne qu'en allant voir des malades aux Villes & Villages d'alentour; que je n'ai pas des yeux aſſez bons pour examiner les mouſſes & les gramens, qu'on ne trouve en ce pays qu'en petit nombre des Livres de Botanique, point d'Herbier, que je n'y ai d'autre ſecours que celui des jeunes gens qui m'aportent des Plantes pour les leur faire connoître. Sur toutes ces conſiderations vous trouverez, peut-être, que j'en ai aſſez fait, pour faciliter aux Aprentifs la connoiſſance des eſpeces, & pour répondre à votre empreſſement. Vous trouverez bien des Plantes repetées en differentes Claſſes, mais c'eſt que ces Plantes ont des feüilles de differente façon, & par-là elles apartiennent à ces Claſſes également. On eſt bien aiſe de les trouver là où ces differentes feüilles les indiquent. Ma troiſiéme Claſſe, de même que la ſeconde, eſt ſousdiviſée ſelon la figure des feüilles, les autres le ſont à raiſon des fleurs d'une ou de pluſieurs piéces, régulieres ou irrégulieres; c'eſt parce que je n'ai pas eu le tems de rendre le tout uniforme, & que j'ai craint que le premier arrangement ne fût trop confus, parce que ces figures des feüilles varient beaucoup. Je ne déſeſpere pas que vous ne donniez un jour une autre tournure à cette méthode, comme vous l'avez fait à celle des calyces, & que vous ne trouviez le moyen de diſtinguer par des noms plus exacts les differentes figures des feüilles, ce qui dans ma Nouvelle Méthode ſeroit néceſſaire pour diſtinguer les eſpeces, ſans avoir beſoin de recourir aux genres ou à la fructification. Adieu, mon cher Collégue, aimez-moi toujours comme je vous aime.

A Montpellier ce premier Sptembre 1751.

MÉTHODE

Pour connoître les eſpeces des Plantes par les Feüilles.

LA Botanique eſt la connoiſſance des Plantes & de leurs vertus. La connoiſſance des Plantes eſt ou empirique ou dogmatique. La connoiſſance empirique ou de routine eſt incertaine, & de peu de durée. La dogmatique, ou qui procede par principes, eſt plus aiſée, plus ſûre, & charge moins la mémoire. Avant ce Siécle pour apprendre à connoître les Plantes d'un pays, il falloit ne faire que cela, vieillir ſur les deſcriptions ſouvent confuſes des Plantes,les confronter avec des figures toûjours imparfaites, paſſer la plus grande partie de ſa vie à herboriſer; c'eſt qu'on n'avoit point de méthode. Aujourd'hui par le moyen des Principes, la découverte du nom & des caractéres d'une Plante eſt un amuſement. Dans quelques jours on apprend une méthode, telle que celles que Mr. Linnæus a ramaſſées dans ſon Livre intitulé: *Claſſes Plantarum*; & par ſoi-même, au moyen de ſes *Genres*, ou du *Syſtema Naturæ* qui en contient les caractéres eſſentiels, on découvre tel genre de Plante qui ſe préſente, pourvû qu'il ſoit en fleur & en fruit: Pour plus de facilité on peut conſulter les Planches que Mr. de Tournefort a données des fleurs & des fruits; & graces aux ſoins de ces grands Maîtres, on apprend plus en un mois, qu'on n'apprenoit avant eux en dix ans.

Les differentes parties qui compoſent la fleur &

le fruit ont fourni differens caractéres pour reconnoître les Plantes, & c'eſt dans le ramas & l'arrangement de ces caractéres que conſiſte la Botanique dogmatique. Les piéces du calyce de la plûpart des Roſes, piéces alternativement barbuës, ſont, par exemple, le caractére de ce genre; le double calyce dont l'exterieur eſt de trois piéces forme celui de la Mauve: Malheureuſement une ſeule partie ne donne pas un caractére commun à tous les genres: Certains ſe reconnoiſſent aiſément aux pétales, d'autres au nombre des étamines, quelques-uns au calyce, & il faut employer ſouvent pluſieurs de ces caractéres enſemble pour s'aſſurer d'un genre; il faut donc connoître les differentes méthodes de Mr. de Tournefort, Boerhaave, Magnol, Linnæus, * pour s'en ſervir à cette découverte; or tout cela devient aiſé au moyen des Claſſes & des Genres de ce dernier Auteur.

Il nous manquoit une méthode qui fît connoître les Plantes par les feüilles; il eſt vrai qu'elle ne peut pas ſervir à connoître les genres, parce qu'il eſt établi par le conſentement des Nations, que les genres des Plantes ne ſe prendront que des fleurs ou des fruits; mais elle n'eſt pas moins avantageuſe pour diſtinguer les eſpéces, & par là les ramener ſouvent à leur genre.

Tout le monde ſent l'avantage de la méthode des feüilles; ce caractére s'étend à tout autant de Plantes que pas un autre; il n'y a guéres que la

---

* Depuis l'impreſſion des Claſſes de Mr. Linnæus il en a paru quelques autres fort bonnes, comme celles de Mr. Adrien, Van Royen, Floræ Leydenſis, Prodromus in 8°. celles du célébre Mr. de Haller, *Enumeratio Stirpium Helvetiæ* 2. vol. folio, celles du Sçavant Profeſſeur Mr. Hamberger en forme de Theſe, celles de Mr. Heiſter, &c.

24e. partie des Plantes qui manque de feüilles, encore même c'eſt en excluant du nombre des Plantes *feüillées*, celles qui, comme la Joubarbe, les Cardaſſes, les Joncs, &c. ont des eſpéces de feüilles graſſes, où extrêmement charnuës, qu'on prend pour des articles ou rameaux.

Le caractére des feüilles eſt preſqu'auſſi conſtant que celui qu'on tire de toute autre partie, pourvû qu'on ne regarde pas à la figure ni à la grandeur abſoluë qu'elles ont, mais qu'on s'attache à leur ſituation reſpective, & à celle des feüillets qui les compoſent, de même qu'à l'arrangement des nerfs & des veines qu'on obſerve ſur leur diſque. Les feüilles des Plantes labiées, & toutes celles qui ſont deux à deux à l'oppoſite (*Adverſifoliæ*) gardent une ſituation & une figure fort conſtantes, les verticillées, les feüilles en évantail, celles en main ouverte, ſont auſſi aſſés conſtantes dans leur ſituation & dans celle de leurs feüillets; il n'y a que les feüilles laciniées de la plûpart des Cruciformes, Chicoracées & Carduacées qui varient quant à la figure, & aux déchirures.

Le grand avantage du caractére tiré des feüilles ſur ceux que les fleurs & les fruits fourniſſent ſe tire de leur durée & de leur grandeur. Les pétales, les étamines, les loges & les graines de la plûpart des Plantes échapent aux ſens, au lieu que les feüilles en ſont très-ſenſibles. Les pétales, les étamines, paſſent en peu de jours, au lieu que les feüilles durent pluſieurs mois.

Après-tout, je n'ai garde de comparer la méthode des feüilles à pas une autre tirée des parties de la fructification. Pour faire penſer qu'elle puiſſe ſupléer à leur défaut, je crois qu'il faut commencer à connoître les genres, ce que ma méthode n'enſeigne pas, qu'alors on doit rechercher les carac-

téres des eſpéces, leſquels ſe tirent preſque toujours des feüilles, & c'eſt à cette recherche que cette nouvelle Méthode peut beaucoup ſervir.

Il faut pour en faire uſage s'inculquer bien d'abord dans l'eſprit les caractéres de chaque Claſſe : Il y en a onze ; on peut les aprendre en quelques heures, ſurtout ſi on a déja l'idée de l'arrangement des feüilles & des feüillets de quelques Plantes vulgaires.

I. *Plantæ Aphyllæ.* Plantes effeüillées, ou qui n'ont jamais des feüilles : Telles ſont les Plantes fongueuſes, Trufes, Champignons ; celles qui n'ont que des écailles colorées (autrement qu'en verd) telles que l'Orobanche, l'Hypociſte, &c. Les Plantes graſſes, qui au lieu de feüilles ont des articles charnus, comme les Cierges, les Euphorbes, les Joubarbes ; les Plantes dont les feüilles ſont en tout ſemblables aux tiges, & que par-là on peut méconnoître ; telles que les Joncs, la Ciboule, les Porreaux, &c. enfin les Lythophytes, comme le Corail (ſi on n'aime mieux les exclure du regne végétal,) & les Plantes filamenteuſes, telles que la Cuſcute.

II. *Plantæ Ceſpititiæ.* Les Gazons, ou les Plantes qui n'ont que des feüilles radicales & ſimples, & dont les tiges ou hampes ſont nuës, quoiqu'il puiſſe y avoir quelque écuſſon (*bractea*) autour des fleurs, qu'on peut prendre pour feüille florale, telles ſont l'Oreille d'Ours, la Mandragore, la Dent de Lion, la Paquerete, le Plantain, l'Hyacinte, le Narciſſe, & j'y rapporte auſſi celles dont les feüilles radicales dans leur origine montent le long de la tige qu'elles enguainent pour s'en écarter plus haut, tels ſont pluſieurs Joncs, Orchis, & quelques Gramens. *b.*

III. *Planctæ Sparſæ-Anguſtifoliæ.* Plantes à feüil-

les éparſes & étroites. Ce ſont toutes celles qui ont des feüilles le long des tiges & des rameaux, diſpoſées çà & là, une plus haut, l'autre plus bas, comme au hazard & ſans ordre conſtant, leſquelles feüilles ſont ſimples & entieres. *c. d.*

Cette Claſſe, à cauſe de ſon étenduë, ſe partage en deux ; ſçavoir en celles dont les feüilles ſont étroites, c'eſt-à-dire, dont la longueur ſurpaſſe plus de trois fois la lárgeur ; & en celles dont les feüilles ſont larges dont il eſt queſtion dans la Claſſe ſuivante. Nous rangeons dans celle-ci les Mouſſes qui ont des feüilles le long des tiges, la plûpart des Plantes graminées & frumentacées, comme le Froment, le Seigle, le Roſeau, le Chien-dent ; les liliacées à tiges feüilluës, comme le Lys, la Flambe. On appelle *Monocotyledones* les graminées & les liliacées, parce qu'elles ne pouſſent qu'une feüille ſéminale en naiſſant, celles qui en pouſſent deux ſont *Dicotyledones*. Celles-ci ſontà feüille lineaire, ou auſſi étroite que le rameau d'où elles partent, ou à feüilles en ruban, comme le Lin, le Belveder, ou en fer de lance étroite comme l'Amandier, le Saule ; je les ſousdiviſe à raiſon des fleurs en pluſieurs Ordres.

I V. *Plantæ Sparſæ-Latifoliæ.* Plantes à feüilles ſimples, entieres, éparſes, ſans ordre, & à même-tems larges reſpectivement à leur longueur. J'appelle larges les feüilles dont la largeur eſt au moins le tiers de leur longueur ; ainſi une feüille dont la largeur égale la longueur, ou eſt la moitié de cette même longueur, eſt cenſée large, quelle que ſoit ſa grandeur abſoluë : C'eſt là l'idée qu'en ont eu la plûpart des Anciens, qui ont diviſé les Plantes à raiſon de la largeur des feüilles (*in leptophyllas & platyphyllas.*) Je ſousdiviſe cette Claſſe eu égard à la ſigure des feüilles, comme il

ſera expliqué ailleurs ; les unes ſont tailliées en cœur comme le Meurier, la Bardane ; les autres en fer de fléche, comme la Sagittaire ; les autres en rond, comme le Tilleul ; les autres en ovale, comme l'Ophyogloſſe, &c.

V. *Plantæ Adverſifoliæ.* Plantes à feüilles ſimples oppoſées, ou deux à deux à l'oppoſite & à la même hauteur, l'une vers un côté, l'autre en un ſens contraire. Cette Claſſe ſe diviſe à raiſon des fleurs. On appelle *incomplettes* les fleurs qui manquent de pétales ou lames colorées autrement qu'en verd, ou qui ayant de ces lames colorées n'ont point de calyce, & dont les étamines répondent aux piéces du prétendu pétale, & non à leur entre-deux. *Fundam. Botanica.* 90. Les fleurs complettes ont des pétales & des calyces enſemble. Toutes les Plantes à fleurs en gueule, tous les Œillets, Lychnis, ou les Diploſtemones de Mr. Haller ſont de cette Claſſe ; il n'y a qu'une ſeule Papilionacée & cinq genres de fleurs compoſées qui y appartiennent. *L.*

VI. *Plantæ Verticillatæ.* Plantes verticillées ou dont les feüilles ſont rangées trois à trois, quatre à quatre, ou en plus grand nombre autour d'un point commun de la tige comme centre & par étages, ou à la même hauteur, comme les bras d'une Girandole qui ſoûtient des bougies, ou les branches d'un luſtre. La Prêle, la Garance, le Caille-lait, le Laurier-roſe, le Martagon, le Genevrier ſont de cette Claſſe. *Y.*

VII. *Plantæ digitatæ.* Plantes à feüilles en évantail, ou en côtes d'évantail, en griffes d'oiſeau. Ce ſont toutes les feüilles compoſées de pluſieurs feüillets, comme deux, trois, quatre, &c. qui ont chacun une queuë diſtincte, & qui part d'une queuë commune, ou d'un centre commun ; telles

ſont

ſont les feüilles de la Geſſe qui ſont de deux feüillets, du Trefle ou Triolet, de la Luzerne, qui ſont de trois feüillets, du Chanvre, du Marronier d'Inde, &c. qui ont chacun pluſieurs feüillets. On appelle feüilles compoſées, celles dont les queuës ſont branchuës, & la piéce membraneuſe qui porte ſur chaque rameau de la queuë s'appelle *feüillet* ou *foliole*; on reconnoit que les feüilles ſont compoſées en ce que les feüillets ſont à peuprès ſur un même plan, & qu'ils ne tombent pas ſéparement de la feüille entiere, outre que la queuë commune eſt d'une couleur differente, & d'une conſiſtance moins ferme que la branche ou la tige de ſa plante.

Les feüilles en griffe ſimple ſont comme AB. &c.
Celles en griffe compoſée ou branchuë ſont comme - - - - - - - - - - - - - - - - - - A D.

VIII. *Plantæ Palmatæ.* Plantes à feüilles en main ouverte. Ces feüilles ſont ſimples, ou ne portent pas communément des feüillets diſtincts & ſéparés entr'eux par leur baſe, mais elles ſont refenduës de la pointe vers la baſe, ou de la circonférence vers le centre plus ou moins profondément, comme on le voit aux feüilles du Dattier, du Figuier, de la Paſſe-roſe, du Houblon, de l'Erable, du pié d'Alouette; ou bien elles ont le bord anguleux & des nerfs rayonnés, qui d'un centre commun s'étendent à chaque angle de la circonférence, comme dans la Mauve, les Courges, Melons. Toutes les feüilles ſont éparſes, ſi vous exceptez l'Obier, le Leonure, le Molucella, le Teucrium, le Geranium & l'Erable qui les ont oppoſées. *a.n.*

IX. *Plantæ Pinnatæ.* Plantes à feüilles *pinnées* ou *conjuguées*, c'eſt-à-dire, compoſées d'une côte, commune qui d'eſpace en eſpace ſe diviſe à droite & à gauche en des brins ou queuës propres,

chargées chacune de leurs feüillets poſés ſur le même plan. On les diſtingue des Plantes à feüilles oppoſées, en ce que les côtes communes des pinnées ſont d'un verd plus clair & d'un tiſſu plus tendre que les rameaux d'où elles prennent naiſſance, que leurs feüillets ne tombent que par la chûte de la côte commune; que l'endroit ou cette côte commune (*Rachis*) s'inſere à la Plante eſt ſuperieurement applati ou creuſé en Sillon & inférieurement convexe, & en ce que les feüillets & la feüille entiere appliqués ſur un plan le peuvent toucher par toute leur face, au lieu que les feüilles des Plantes oppoſées, (à moins qu'elles deviennent rampantes, ce qui n'arrive qu'à quelques branches,) ſont rangées deux à deux par étages, ou ſur differens plans: Cette Claſſe eſt aiſée à connoître ſi on manie des feuilles de Pimprenelle, de Sorbier, Framboiſier, Roſier, Poischiche, Veſſe, Collutea, Œillet d'Inde, &c. on y verra des feuillets oppoſés entr'eux, comme au Frêne, ou épars & alternatifs comme aux Poischiches, Lentilles; les côtes communes terminées par un ſeul feuillet impair comme au Roſier, ou par deux comme au Lentiſque, ou par un filet comme à l'Ers, ou par une vrille friſée ſimple ou branchuë comme au Pois, Lentilles, &c. *AC. AF.*

X. *Plantæ Decompoſitæ.* Plantes à feuilles aîlées, ou décompoſées, c'eſt-à-dire, dont la côte commune ſe branche, non une ſeule fois comme aux pinnées, mais ſe ſubdiviſe deux ou pluſieurs fois avant de porter les derniers feuillets; comme une aîle d'oiſeau ſe diviſe non-ſeulement en plumes à droite & à gauche, mais encore chaque plume porte des filets ou de la barbe encore d'un & d'autre côté. L'examen des Plantes vulgaires de cette Claſſe, comme de la Fougere, de la Rhuë, Sen-

ſitive, Anemone, Fenouil, Cerfeuil, Carotte, Perſil, Millefeuille, Matricaire, &c. rendra cette définition aſſez ſenſible.

Folium bipinatum - - - - - - - - - - - - - *A G.*

Folium tripinnatum - - - - - - - - - - - - *A E.*

XI. *Plantæ Laciniatæ.* Plantes à feuilles laciniées ou déchiquetées. On appelle laciniées ou frangées les feuilles ſimples dont le diſque eſt notablement & irréguliérement échancré, ſans que les piéces ayent de queuë diſtincte, ni des nervures rayonnées; elles tiennent un milieu entre les feuilles ſimples mais entieres, & les feuilles compoſées de feuillets diſtincts. On les diſtingue des feuilles en main ouverte en ce que les laciniées ont des veines partant à droite & à gauche de l'axe de la feuille, & non des nerfs partans d'un centre commun, outre que les dechirures ſont irrégulieres, & ne vont pas régulierement de la pointe de la feuille vers le ſommet de la queuë.

Les laciniées qui ont la piéce du ſommet fort grande & les autres vers la queuë plus petites, répréſentent en quelque façon un Luth ou un Violon, & on les appelle *lirées*, (*folia lirata;*) les piéces de la queuë ſe nomment des pinnules, (*pinnæ, pinnulæ.*) - - - - - - - - - - - - - - *V.*

Celles dont les piéces ou lanieres latérales ſont à peu près de même grandeur que le ſommet, ſont appellées en latin (*pinnatifidæ, ſemipinnatifidæ,*) en ce qu'elles reſſemblent aux feuilles pinnées, faites en peigne, en barbe de plume; mais les pinnules n'ont pas des queuës diſtinctes. Si les Lanieres rebrouſſent vers la queuë, on les nomme *Sagittato-pinnatifidæ*, en crochet de fléche, (*o*) ſi elles tournent fort en déhors ou vers la pointe *haſtato-pinnatifidæ*, en crochet de halebarde (*x*) où elles ſont, *ſinuées* (*P*) ou *déchirées* (*V*) Les feuilles

de Raves, Senevé, Raifort, &c. ſont lirées, celles du Velar, des Epinards, ſont en fer de fléche; celles de pluſieurs Chardons ſont ſimplement lacinées. Les feuilles de cette Claſſe ſont alternes ou éparſes, & leur figure eſt ſujette à bien des variations.

On trouvera les mêmes Plantes repetées dans les diverſes Claſſes auſquelles elles peuvent apartenir, à cauſe de leurs variations. La Corneille (*Lyſimachia lutea major*. C. B.) ſe trouve communément à feuilles oppoſées; il a donc falu la ranger dans la Claſſe V. n. 59. mais elle ſe trouve auſſi à feuilles verticillées; il a donc falu la repeter dans la Claſſe VI. n. 50.

Quand le plus grand nombre des feuilles d'une même Plante a une figure ou une ſituation conſtante, cette ſituation & cette figure dérermine la Claſſe; ainſi le *Solanum dulcamara* a preſque toutes ſes feuilles entieres, & il n'y a que les plus hautes qui ſont tailllées en fer de halebarde ou fleurdèliſées; toutes ſont éparſes, le grand nombre la détermine à être de la Claſſe IV. n. 129.

Le Salicaria purpurea. a toujours les feuilles des branches oppoſées deux à deux, mais quelquefois celles de tige ſont éparſes & très-rarement verticillées; le lieu eſt déterminé par la ſituation des feuilles les plus nombreuſes, qui ſont celles des branches.

Sans ces répétitions les Commençans ne pourroient jamais trouver le nom de la Plante qu'ils ont ſous leurs yeux, ne pouvant déviner que l'arrangement ou la figure de ſes feuilles eſt communément toute autre que ce qu'elle leur paroît.

Ceux qui veulent herboriſer avec fruit, & découvrir par eux-mêmes les eſpéces des Plantes, doivent outre ces Claſſes des feuilles, porter ſur

eux celles qui ſervent à faire connoître les genres, à quoi le *Syſtema Naturæ* de Mr. Linnæus peut fort bien ſervir. Il eſt en même-tems néceſſaire d'entendre les termes dont on ſe ſert pour exprimer les differences des feuilles rélativement à leur figure, à leurs attaches. Mais on ne doit pas s'attendre dans la Botanique à aucune définition exacte ni à aucune préciſion mathématique, & il faut toûjours avoir recours aux feuilles connuës auſquelles ces termes conviennent, pour découvrir les inconnuës auſquelles on les applique.

La feuille eſt une piéce membraneuſe communément verte, qui tient aux tiges ou aux branches des Plantes par une baſe ou par une queuë plus convexe en deſſous qu'en deſſus.

La feuille qui n'a point de queuë, s'appelle *Seſſile*, *folium Seſſile*; celle qui en a une, eſt ſurnommée *montée*, *folium petiolatum*; la partie membraneuſe de la feuille eſt appelée *Diſque*.

L'Aileron (*Stipula*) eſt une piéce membraneuſe d'une autre figure que les feuilles de la même Plante, & qui ſoûtient la queuë des feuilles, comme on voit aux Trefles, Luzernes, Ciſtes, &c. &

L'Ecuſſon (*Bractea*) eſt une piéce membraneuſe de figure & de couleur communément différentes de celles des feuilles, & qui ſoûtient les calyces des fleurs. On en voit dans les Sauges, Stachys, &c.

La feuille ſe diviſe en ſimple & en compoſée.

La feuille dont la queuë n'eſt point branchuë, qui n'a qu'une piéce diſtincte & membraneuſe eſt appellée ſimple - - - - - - - *A.B.C.D.* &c.

La feuille qui eſt formée de pluſieurs piéces membraneuſes jointes enſemble par les branches d'une queuë commune, eſt dite *compoſée u Z. AB. AC. AD. AF. AG.*

Les feuilles ſimples ſont ou entieres (*indiviſa*) ou

taillées en main ouverte (*palmata*,) ou laciniées (*laciniata.*)

Les feuilles ſont cenſées entieres quand elles n'ont ni à leur ſommet ni à leurs côtés de profonde ſinuoſité, ou découpure, quand elles n'ont que des dentelures, cils, crénelures, ou autres petites éminences & cavités dans leur bordure.

On appelles ces feuilles *dentelées* (*Serrata*) quand leurs bords portent des avances anguleuſes, ſouvent triangulaires, dont la pointe tourne communément vers le ſommet de la feuille (E)

On appelle *crenelées* (*crenata*) celles dont les petites avances qui ſe trouvent dans les bords ſont preſque continuës, & ne regardent pas le ſommet déterminement G.

On appelle *Bretellées* ou dentées (*dentata*) les feuilles dont les petites avances des bords ſont écartées les unes des autres, ne regardent pas conſtamment le ſommet, & n'ont pas une figure triangulaire, ni une baſe beaucoup plus large que le reſte de l'avance O. V. X.

On les appelle *friſées* (*criſpa*) quand les bords ſont pliſſés ſur eux-mêmes & recoquillés.

On les nomme *ſinueuſes - épineuſes* Si elles ſont comme *S.*

On appelle *ciliées* (*ciliata*) les feuilles bordées de poils en en maniere des cils des paupieres *D.*

On appelle *très-entieres* (*integerrima*) les feuilles qui n'ont aucune de ces ſortes de petites avances ou cavités, quelque figure d'ailleurs qu'ait le diſque, comme en cœur, fléche. A. F. H.

La figures des feuilles varie infiniment, & il n'eſt pas poſſible de la déterminer à un petit nombre d'eſpéces, puiſqu'il n'y a pas deux feuilles ſur le même arbre qui ſe reſſemblent exactement ;

mais nous devons pourtant, pour ne pas multiplier les noms & les figures à l'infini, les rapeller à quelques eſpéces principales, dont les figures, cy-jointes donneront une idée vague.

La feuille eſt ou épaiſſe ou charnuë, ou mince & membraneuſe. La feuille épaiſſe eſt ou en ſtilet (*ſubulata*) ou cône fort aigu, comme le Jonc, ou triangulaire comme le Souchet (V.) ou anguleuſe de deux côtés & obtuſe du troiſiéme comme la Maſſe d'eau, &c. Voyez d'autres différences parmi les Joubarbes & les Meſembryanthemum. On les appelle (*Ancipites*) quand elles ſont tranchantes des deux côtés, comme les Flambes.

Les feuilles membraneuſes, ou feuilles proprement dites, ſont ou *circulaires* (*orbiculatæ*) quand (étant ſans aucun angle) leur longueur eſt à peu près la même que leur largeur *A. s*.

On les nomme *elliptiques.* quand la longueur excede la largeur, & que les deux bouts, ſont arrondis & preſque égaux. B.

On les nomme *ovales*, (*ovata*) quand leur baſe eſt arrondie, & que le ſommet eſt plus rétreci, mais un peu mouſſe. C.

On les nomme *oblongues*, (*oblonga*) quand leur longueur excede de beaucoup leur largeur, & que les deux bouts ſont rétrecis, & à même-tems arrondis. k.

Mucronata folia, feuilles en fer d'eſponton d. 5. 7.

Les feuilles ovales qui ſont plus étroites par leur baſe, ou celles qui d'une baſe étroite ſe vont terminer à un ſommet plus large & arrondi, s'appellent feuilles en ſpatule (*Spatulata*) (*obverſe-ovata*) ce ſont des eſpontons renverſés. D. T.

Les piéces arrondies & ſaillantes des feuilles s'appellent *lobes*, (*lobi*,) & les feuilles en ont

quelquefois deux ou trois vers leur ſommet (*biloba*, *triloba*) a. n. F. Z. Y.

Les feuilles qui ont deux lobes à leur baſe, & dont le ſommet finit en pointe mouſſe ſont taillées en cœur (*cordata*) E. lequel eſt quelquefois droit d'autres fois oblique. G.

Si la feuille a deux lobes à ſa baſe & ſon ſommet arrondi elle eſt taillée en rein. (*reniformis*. H.

Les feuilles qui ont deux crochets rentrans vers la baſe, repreſentent un fer de fléche. (*Sagittata*. I.

Si au lieu de crochets pointus il y a des lobes ou oreillettes, on les appelle en latin (*auriculata*) K 8.

Si les crochets (*hami*) tournent en dehors, la feuille eſt faite en fer de halebarbe (*haſtata.*) K. 7.

La feuille qui ſe termine des deux côtés en pointe par une ligne courbe, repreſente un fer de lance (*lanceolatum*) (L. M. ou étroite comme (M.) (*f.*) ou large comme. L.

Celles dont les bords ſont paralleles entr'eux dans une grande partie de leur longueur, ſont ou de moindre largeur qu'une ligne géometrique, ou à peu près (*linearia*) S. ou grêles comme des filets & ſimples (*filamentoſa*, *capillaria*,) & on les nomme capillaires, ou bien elles ſont fermes en façon de petites aiguilles (*aciformia.*) R.

Si elles ſont larges & longues en maniere de ruban ou de bandelette (*ligulata*,) ou en feuille de Saule N. f.

Il y en a de larges qui ſont courtes & obtuſes à leur ſommet, comme la langue humaine (*linguiformia*) Q. 7.

Quelques-unes ſont preſque triangulaires (*trigona*) P.

D'autres ſont triangulaires iſocelés en façon de bayonette courte (*iſocelia*, *gladiata*) O (j.)

Si elles ſont fort longues comme une lame d'épée, ou

on les appelle en latin (*enſiformia* ,) (*graminea* ,) O. b. f.

Celles qui ont quatre angles , celui du ſommet & celui de la baſe étant aigus s'appellent Rhomboïdes , (h. i.) ou en coin *cunéiforme* , comme (j.)

Les feuilles taillées à pans ont 5 , 6 , 7 , angles , on les nomme quinquangulaires, anguleuſes, &c. X.

Quand on trouve des feuilles qui participent de deux figures on exprime dans leur épithete les deux noms de ces figures , mettant au premier celle dont elle participe le moins ; ainſi (*folium ovato-cordatum*) aproche plus du cœur , & folium *cordato-ovatum* aproche plus de l'ovale ; ainſi c'eſt une feuille triangulaire arrondie *trigono-ovatum.*) 8. 11.

Les feuilles ſimples découpées en main ouverte (n) (a)

Les feuilles ſimples laciniées ſont ou ſinuées (p)
ou ſimplement laciniées (pinnatifida) (o)
ou en lyre (*lyratum*) (v)
ou déchiquetées en fer de halebarde (*haſtato-pinnatifida*) (x)
ou les déchlquetures ſonr redoublées (*bis pinnatifida*) (r)

Les feuilles composées ſont en griffe d'oiſeaux à deux doigts 17. (&)
ou à trois piéces , ou en trefle (*trifoliata*) (e)
ou de 5 , 7 , 9 , ou pluſieurs feuillets (AB.)
ou à griffe compoſée & branchuë (AD.)

Les feuilles compoſées , conjuguées ou pinnées , ont au moins quatre feuillets , comme une vulneraire (U.)
plus ſouvent elles en ont cinq , ſept , ou davantage (AD. AG.)
ces feuillets ſont ou oppoſés *pinnata* (A F.) ou épars ſans ordre (*pennata*) (U)

La conjugaiſon eſt tantôt terminée par un feuillet impair, (*impari-pinnatum.*) AC. AF. quelquefois elle eſt bruſquement terminée par deux (z)

Si la feuille eſt aîlée ou décompoſée, alors la queuë qui dans les compoſées s'apelle la côte (*coſta alata*) ſe diviſe ſouvent en trois rameaux, qui ſont chacun garnis de feuillets AG.

D'autres fois cette côte commune ſe diviſe d'eſpace en eſpace en rameaux latéraux, qui vont en décroiſſant A E.

Il y en a qui ſont plus compoſées encore, & dont la côte commune ſe diviſe & ſe ſubdiviſe trois ou quatre fois avant de porter des feuillets A E.

Ces derniers feuillets ſont capillaires comme dans le fenouil, linéaires, comme dans le ferula, en poinçon (*ſubulati*) comme dans l'échinophora, découpés (*pinnatifidi*) comme dans l'anthriſcus plinii; à pluſieurs lobes comme dans AE.

Folium bi-tripinnatum pinnis-pinnatifidis &.

Les feuilles compoſées ont leurs feuillets ſur un même plan, mais celles qui les ont ſur différens plans, ou toutes mêlées, s'apellent branchuës (*folia ramuloſa*) comme le Coralloïdes, le Ranunculus, Ceratophyllus, &c. A D.

Le plan des feuilles eſt ou liſſe (*glabrum*) ou cottoneux (*tomentoſum*) ou hériſſé de poils (*hiſpidum*, ou ſimplement drapé (*villoſum.*)

Les feuilles partent ou de la racine (*radicalia*) ou de la tige & des rameanx (*caulina*, ou ſoûtiennent chaque rameau (*ramifera*,) ou partent les premieres de la graine ſemée pour ſécher en peu de jours (*ſeminalia*,) ou ſont près des fleurs (*floralia.*) Si elles ſoûtiennent des ombelles, on les apelle des Fraiſes (*involucra.*)

L'attache des feuilles eſt par une queuë (*petiolata*,) ſinon elles ſont aſſiſes (*ſeſſilia.*) Et alors ſi elles courent le long de la tige en s'y attachant dans une partie de leur longueur, on les nomme en latin (*decurrentia.*) c. 1. d. 8.

Si elles embraſſent la tige par leur baſe en tout ou en partie, on les nomme en latin (*amplexicaulia.*) m. 12. d. 7.

Si elles ſont couchées les unes ſur les autres comme les tuiles ou les briques d'un toit. (*imbricata.*) d. 9.

Si deux feuilles oppoſées qui embraſſent la tige ſont ſoudées enſemble, (*connata.*) n. 13. 14.

Si la feuille eſt ſoûtennë par une queuë qui porte ſur le diſque même, & non ſur le bord, comme le Bouclier apellé *Pelta* (*peltatum.*) y. m. 15.

Les feuilles terminées par une pointe fine (*acuminatæ*); par une vrille (*viticuloſa*); par une bréche (*retuſa*); par deux lobes arrondis (*obverſe cordata*) (F.) celles qui ſont chantournées dans leurs bords (*repanda*) (Y.)

Les feuilles qui font un angle très-aigu avec le haut de leur tige s'apellent droites ou dreſſées (*erecta*,) ou couchées les unes ſur les autres (*imbricata*,) (c. 9.) Si elles font un angle droit on les dit ouvertes (*patentia*, *patula*) [C. 2] quand elles ſe recourbent en bas [*inflexa*] [C. 3.] & ſi s'étant courbées en bas elles ſe redreſſent [*revoluta*] [C. 4.]

Les côtes, les vrilles [*cirrhi*] [*viticulæ*] portent quelquefois un, quelquefois deux, ou pluſieurs feuillets; on les apelle en latin [*monophylli*, *diphylli*, *polyphylli.*] &c. [17)

Les fibres qui s'étendent de la baſe de la feuille vers le ſommet s'apellent *nerfs*, & quand il y a pluſieurs de ces nerfs les feuilles ſont dites *nerveu-*

ſes, comme A. X. Y. n.

Les fibres qui partent du nerf moyen, ou de l'axe de la feuille de part & d'autre s'apellent des *veines*, & quand il n'y a qu'un nerf & pluſieurs veines, on nomme ces feuilles *Veneuſes*. B. C. D.

Si les feuilles n'ont point de nerfs, on les apelle folia *enervia*, telles que F. H. I.

Si elles n'ont point de veines ou de rezeau (*avenia.*) F. H. I.

Le concours des organes de la génération des plantes & ſurtout des étamines, des piſtiles, & même des pétales s'apelle *fleur*.

S'il n'y a que des étamines la fleur eſt *mâle*, s'il n'y a que des piſtilles la fleur eſt *femelle*; ſi les uns & les autres ſe trouvent enſemble dans le même lit ou calyce la fleur eſt hermaphrodite, comme AK.

La fleur eſt *complette* ſi les étamines, les piſtilles ſe trouvent avec des pétales & leur calyce; s'il n'y a que les premiers, ou ſi les pétales ou le calyce manquent, la fleur eſt *incomplette*.

Les pétales ſont ou en godet, & alors chaque fleur n'en a qu'un, (*flos monopetalus.*) La fleur eſt monopetale, ou bien ils ſont en lames ſans aucune figure de godet, tuyau ou cavité, & alors ils ſont pluſieurs enſemble rangés autour des étamines ou des piſtilles, & la fleur s'apelle polypetale, *flos polypetalus.* Le *Nectarium* eſt une piéce analogue au pétale par ſa couleur & ſa conſiſtance, ou même une partie du pétale qui rend ſouvent le contour de la fleur irrégulier, mais qui eſt deſtiné à contenir le miel que les abeilles ſuccent, & non à enveloper les étamines & les piſtilles, bien qu'il tienne ſouvent la place des pétales.

Les fleurs ſont ou régulieres ou anomales. Les régulières ſont celles dont toutes les piéces, ſçavoir les étamines & les pétales, de même que

leurs ſegmens, ſont taillées uniformement, & placées à égale diſtance de l'axe commun repréſenté par le piſtille. S'il y a des étamines courbées d'un côté plus que de l'autre, des pétales inégaux, ou placés d'une différente façon, ou chargés d'appendices, éprons, mammelons & apellés nectarium, ou dont le tuyau eſt courbe, &c. on les apelle *anomales*, *difformes*. Telles ſont les fleurs en gueule, papillon, &c.

Les fleurs monopetales regulieres ſont faites en tuyau, cloche, grelot, ſonnette, entonnoir, roſette, ſouſcoupe, *tubulati*, *campanulati*, *globoſi*, *ovati*, *infundibuliformes rotati*, *Hypocrateriformes*; ainſi A H. eſt une fleur monopetale reguliere en cloche.

Les fleurs polypétales ont ou deux ou trois ou quatre ou cinq, &c. ou pluſieurs pétales; on les ſurnomme *dipetali*, *tripetali*, *retrapetali*, *pentapetali*, *polypetali*, &c.

Elle repréſentent une croix (*cruciformes*) une roſe (*roſacei*) telle que (A K) un lys à ſix pétales, *hexapetali liliacei*, un papillon ou une fleur légumineuſe (*papilionacei*,) un muffle ou un maſque (*perſonati.*)

Par *étamine* ou filet (*ſtamen*, *ſtemon*) on entend ces filamens qui entourent le germe, & qui ſont terminés par un ſommet (*apex*) apellé *anthere*, où ſe prepare la pouſſiere Séminale qui doit féconder les piſtilles. Mr. Linnæus les apelle des mâles (*aner*, *andros*,) & à raiſon de leur nombre les fleurs ſont ſurnommées *monoſtemones*, ou *monandri* s'il y en a deux; *triandi*, *tetrandri*, *pentandri*, *Hexandri*, *polyandri*, &c. s'il y en a 3. 4. 5. 6. pluſieurs.

Si les étamines ſont au même nombre que les piéces du pétale, ou que ſes ſegmens, on ſurnomme la fleur *iſoſtemon*, s'il y a deux fois plus d'étamines que des piéces du pétale *diploſtemon*, s'il

y en a moins *mejoſtemon* ; mais ces termes ne ſont gueres d'uſage, excepté chez Mr. de Haller, Mr. Van-Royen ſe ſert du nom ; de *diploſantheræ*, *oliganthera*, &c.

La figure A I. repréſénte une fleur à 4. étamines (20.) & un *piſtille*, dont le *germe* (23.) eſt ſurmonté du *ſtyle* (22. & l'extrêmité du ſtyle (21.) s'apelle *ſtygmate*.

Les piſtilles ſont la partie femelle des fleurs, ils ſont deſtinés à recevoir par leurs ſtygmates ou vulves apellées pavillons, la pouſſiére ſéminale des anthéres, & à la conduire par les ſtyles ou trompes (*tubæ*) juſqu'au germe ou ovaire dans lequel ſont les œufs ou graines de la plante, qui par-là ſe trouvent fécondés. Si le germe eſt fécondé il ſe *nouë* ou ſe renfle, ſinon il avorte.

A raiſon du nombre des ſtygmates ou femelles (*gyne*) les Auteurs diviſent les plantes en *monoſtyles*, *diſtyles*, qui ont un, deux piſtilles, &c. ou en *monogynes*, *digynes*, ce qui eſt la même choſe. Mr. Hamberger ſe ſert du premier nom, qui n'eſt pas métaphorique, & Mr. Linnæus de l'autre (AI.) repréſente une fleur à un piſtille, A K. une autre à pluſieurs piſtilles.

On trouvera les autres termes expliqués dans le Syſtéme de Mr. Linnæus, dans le Prodrome de Mr. Van-Royen, &c. Dans les fleurs monopetales il faut diſtinguer le *tube* ou tuyau, qui eſt la partie la plus étroite de la fleur ſouvent enchaſſée dans le calyce, & la partie évaſée ſouvent découpée, & qu'on apelle *limbe*. Voyez A H. dans les fleurs polypétales ; la partie du pétale qui eſt adhérente au calyce s'apelle *l'onglet* (*unguis*) des pétales, & la partie flottante s'apelle *lame* (*lamina*) A L.

Les fleurs & les fruits ſont arrangés & aſſemblés différemment ; cet aſſemblage eſt ou ſimple ou

compoſé, ſelon que le pédicule eſt ſimple ou branchu.

Si les fleurs & les fruits ſont portés ſur un pédicule long, de façon à être couchés les uns ſur les autres, ou très-ſerrés en forme oblongue comme les épis du blé, la fructification eſt en épi; *ſpicata.* A N.

Si les fleurs & les fruits avec leurs pédicules branchus ont une figure ovale ou ſphérique comme une grappe, on les nomme *grappe* (*racemus*), *corymbus*) A P.

Si les pédicules propres ne partent pas tous d'un centre, & cependant s'élevent preſque à la même hauteur, on les apelle *panaches* (*panicula.*) A M.

Si les pédicules propres partent tous d'un centre commun & de là s'élevent à la même hauteur, ils repréſentent un paraſol (*umbella.*) A O.

Les épis ſont ſimples ou compoſés, de même que les panaches, les grapes, paraſols, d'autres petits épis (*ſpicula*,) d'autres petits panaches ou plumails (*muſcaria*,) de petits grapillons ou trochets, de petites umbelles (*umbellulæ.*)

ABREGÉ

DES CLASSES SUIVANTES

LEs Feuilles ſont ou *ſimples* ou *compoſées.*

Les feuilles ſimples ſont ou *entieres* ou *diviſée*

Si on excepte les Plantes qui n'ont jamais d feuilles. APHYLLÆ

Les autres qui les ont ſimples & entieres ſon de différentes Claſſes.

1. Ou bien elles n'ont que des feuilles à la ra cine CESPITITIÆ
2. Ou bien elles en ont auſſi le long des tiges & des branches, mais ſi ces feuilles ſont éparſe & ſans ordre conſtant, ou bien.
3. Elles ſont fort longues relativement à leur lar geur ANGUSTIFOLIÆ
4. Ou bien elles ſont larges reſpectivement à leu longueur LATIFOLIÆ
5. Si les feuilles ſont oppoſées deux à deu ADVERSIFOLIÆ
6. Si elles ſont rangées trois à trois ou davantag autour de chaque nœud VERTICILLATÆ

les feuilles ſimples mais diviſées ſont de deu ſortes.

7. Les unes ſont fenduës de la pointe vers l baſe PALMATÆ
8. Les autres ſont fenduës ou échancrées par le côtés LACINIATÆ

Enfin les feuilles compoſées ſont celles dont l queuë ou côte commune eſt branchuë, chaqu branche, portant ſon feuillet diſtinct, mais ſu un plan commun. 9

CLAVIS CLASSIUM.

FOlia ſunt vel *ſimplicia* tum *integra* tùm *diſſecta* vel *Compoſita.*

Simplex petiolum indiviſum, *compoſitum* petiolum ramoſum obtinet. *Integro* diſcus indiviſus excepto margine folii, *diſſecto* diſcus etiam diviſus ut in palmatis & laciniatis.

I. Plantæ ſunt vel foliis, tum radicalibus num caulinis deſtitutæ nudæ ſeu *Aphyllæ*

II. Vel foliaræ, æque radicalibus tantùm gaudent foliis iiſque ſimplicibus *Ceſpititiæ*

vel foliis etiam caulinis ornatæ

Folia caulina ſunt vel *ſimplicia* & integra,

III. eaque ſine certo ordine ſparſa atque lengitudo eorum eſt ſaltem tripla latitudinis *Angnſtifoliæ*

IV. Si longitudo ſit ad ſummum tripla latitudinis *Latifoliæ*

V. Si folia ſunt in caule & ramis ex adverſo bina. *Adverſifoliæ*

VI. Si ſint trina vel plura radiartim caulem aut ramos ambientia *Verticillatæ*

VII. Folia *compoſita* petiolis radiatim ramoſis & foliolis diſtinctis ornata *Digitatæ*

VIII. Folia ſimplicia diſſecta digitatis affinia *Palmatæ*

XI. Folia compoſita ex foliolis ſecundum axim communem hinc & inde diſtincte naſcentibus *Pinnatæ*

X. Si petioli, coſtæ communi annexi, ſint ramoſi *Decompoſitæ*

XI. Folia ſimplicia diſſecta pinnatis vel decompoſitis affinia *Laciniatæ*

Plantas Monſpelienſes puncto notatas volui.

CLASS. I.

9. Si ces feuillets ou leurs queuës partent d'un centre commun, comme les côtes d'un évantail, ou les griffes d'un oiſeau. *Digitatæ*


10. Si ces feuillets ſont rangés a côté de la côte commune & le long d'un axe comme les dents d'un peigne ou d'un rateau *Pinnatæ*

11. Mais ſi ces feuillets lateraux ne ſont pas ſimples & que leurs queuës refenduës, portent pluſieurs autres feuillets entiers ou decoupés *Decompoſitæ.*

On trouvera dans ces Claſſes des feuilles ſimples diviſées, parmi les compoſées, pour ne pas trop écarter les plantes qui ont beaucoup d'affinité.

Le point qui précède immediatement le nom des eſpéces marque qu'elles ſont des environs de Montpellier.


Stagnon Sculp.t



APHYLLÆ FUNGOSÆ.

CLASSIS PRIMA.

PLANTÆ APHYLLÆ.

ORDO PRIMUS.

Aphyllæ Fungoſæ, iiſque affines.

1 LYCOPERDON ſubrotundum laceratum dehiſcens. *Linn.* Boviſta offic. *Veſſe de loup.*

2 Lyc... ſolidum. *Linn.* Subterraneum. Tubera off. *Truffe.*

3 AGARICUS caulefcens pileo convexo ſquamato albido, lamellis rufis. *Linn. Eſcumel. Boulet.* Lamellis rubellis.

4 AGARICUS caulefcens pileo flavo convexo, lamellis albis. *Linn.* Amanita divi Georgii. *Dillen.*

5 Ag... caulefc. petiolo craſſo albo, pileo plano ſanguineo lamellis albis. *Linn.* Fungus ſupernè ſaturè rubens. *B. M.*

6 AGARICUS caulеſc. albus, petiolo breviſſimo; pileolo hæmiſphærico. *Linn. Mouſſeron.*

7 Ag. caulеſc. pileo albo convexo, ſquamis cinereis, lamellis niveis. Fungus albus venenatus viſcidus. *J. B.*

8 Ag... caulеſc. pileo umbilicato fuſco, lamellis albis. Amanita faſciculoſa ab arborum radices. *Dillen. Pivoulade.*

9 Ag... caulеſc. lamellis ramoſis decurrentibus. *Linn.* Fungus pallidus vel luteus ſe contorquens. *J. B. Chanterelle. Gerille.*

10 Ag... caulеſc. pileo convexo croceo, lamellis flavis. *Jaune d'iou. B. M. Dorgue.* Jaſeran. *J. M. Oronge.*

11 Ag... caul. durior, totus amethyſtinus, lamellis craſſioribus.

12 Ag... caul. coniformis, flaveſcens, viſcidus, oris ſtriatis. (Fung. Haller.) *Piſſeco.*

13 Ag... (acaulis) imbricatus hirſutus lamellis violaceis. *Buxbaum.*

14 Ag... (acaulis coriaceus) villoſus, lamellis ſinuoſis, & invicem implexis. B*uxbaum.*

15 BOLETUS cauleſcens ſupernè ſordidè ruber, infernè luteus. Fungus poroſus craſſus ruber. *Raii.*

16 Bol... acaulis perennis, ſupernè cinereus, infernè luteus. Agaricus igniarius.

17 Bol... acaulis linguiformis, mollis ruberrimus. *Langueboüine.* Lingua in caudicibus caſtanearum. *Cæſ.*

18 HIDNUM cauleſcens pileo convexo, lævi, flexuoſo. *Linn. Penchinille.*

19 Hid... caul. supernè album, craſſum. Erinaceus eſculentus albus craſſus *Michel. Arcialous.*

.20 HIDNUM. acaule pileo tuberoſo dentibus flavis. *Sabatelle.*

.21 MERULIUS flavus oris contortis & laceris. *Haller.* Differt ab Agarico quod venas ſubtus ramoſas, non lamellas habeat.

.22 CLATHRUS ſeſſilis ſubrotundus. *Linn.* ovatus. Boletus cancellatus purpureus. *Tourn.*

.23 PHALLUS volvâ exceptus pileo apice pervio. *Linn.* Fungus fœtidus Penis imaginem referens. *J. B.*

.24 Phal... petiolo nudo, pileo ſubtus undiquè adnexo. *Linn.* Fungus eſculentus rugoſus albicans, quaſi fuligine infectus. *T. Mourille.*

.25 ALCYONIUM durum.

.26 Alc... XII. Burſa marina. *C. B. Orange de mer.*

.27 Alc... XIV. *C. B.* Pila vel ſphæra marina. *J. B. Paume de mer.*

.28 Alc... XV. *C. B.* veſiculoſum veſicaria marina. *J.* B.

.29 CLAVARIA clavâ integerrimâ obtuſâ erecta. L*inn.*

.30 Clav... ramoſiſſima. *Royen.* Corallo fungus *Galinole.*

.31 PEZIZA minima nivea.

.32 Pez... calyce campanulato. *Linn.*

.33 Pez... cyathiformis ſeminifera. Cyathoides cinereum &c. *Haller.*

.34 Pez... cartilaginea cavo hæmiſpherico.

.35 Pez... fuliginoſa, acaulis, fumum explodens

.36 ELVELA coriacea ſquamoſa truncis adnaſcens Agaricus villoſus tenuis infernè lævis. *Dill.*

.37 MUCOR globoſus flavus. *Haller.*

.38 Muc... granulis filamentoſis fugax putreſcentibus adnaſcens. *Linn.*

. 39 MUCOR gelatinoſus fuſcus, piſiformis.

. 40 TREMELLA plicata undulata. *Linn. Noſtoc.*

. 41 Trem... ſeſſilis membranacea auriformis cinerea. *Linn.* Auricula Judæ.

. 42 Trem... tuberculoſa, ſolida rugoſa. *Linn.* Trem. Fluviatilis gelatinoſa & uterculoſa. *Dillen.*

. 43 Trem... marina tubuloſa. *Dillen. Le boyau de chat.*

. 44 SPONGIA ramoſa. *C. B. Eponge.*

. 45 Spo... ad uſum præſtantiſſima, foraminibus exiguis pervia. *T.*

. 46 BISSUS membranacea aquatica. *Linn.*

. 47 Biſſ... petræa nigerrima. *Dillen.*

ORDO SECUNDUS.

Aphyllæ Squamis veſtitæ Floriferæ.

. 48 AZARUM aphyllum ſquamoſum. *Hipociſtis.* Off.

49 LATRÆA. *Linn.* Clandeſtina. *T. L'herbe cachée. A Perpignan.*

. 50 SQUAMARIA. *Linn.* Aphyllon. *J. B. à l'Eſperou.*

. 51 LIMODORUM. *Haller.* Orchis abortiva violacea. *C. B.*

. 52 NEOTTIA bulbis faſciculatis nectarii labio bifido. *Linn.* Ophrys aphylla. *Hall.* Nidus avis. *T. à l'Eſperou.*

. 53 OROBANCHE caule ramoſo. *Linn.* floribus albis.

. 54 Orob... caule ramoſo floribus violaceis.

. 55 Orob... caule ſimplici cæruleo bracteis brevibus. Orob. magna purpurea Monſpeſſulana. *J. B.*

56 OROBANCHE caule ſimplici bracteis longioribus. Orob. major Caryophyllum olens. *T.*

ORDO III.

Aphyllæ Aizoideæ articulis vel foliis craſſis carnoſis.

A. *EXOTICÆ.*

57 CACTUS ſexangularis oblongus erectus. Linn. *Cierge de Surinam.*

58 Cact... novemangularis longus erectus. Linn. *Cierge du Perou.*

59 Cact... ſcandens angulis quinque vel pluribus obtuſis. *Linn. Cierge grimpant.*

60 Cact... ſcand. teres ſpinis & verrucis creberrimis. *Cierge rampant.*

61 Cact. ſcand. triangularis articulatus. *Linn.*

62 Cact... quadrangularis, longus erectus, angulis compreſſis. *Linn.*

63 Cact... quatuordecimangularis ſubrotundus. *Linn.* Sphæricus. *Tête à l'Anglois.*

64. Cact... ſubrotundus tectus tuberculis ovatis barbatis. *Linn. Melon épineux.* Sphæroideus eſt.

65 Cact... compreſſus articulatus ramoſus, articulis ovato-oblongis ſpinis ſetaceis. *Linn. Cardaſſe.*

66 Cact... compreſſus articulatus ramoſus articulis ovatis ſpinis ſolitariis. *Linn. Raquette.* Opuntia minima. *C. B.*

67 EUPHORBIA aculeata quadrangularis nuda. *Linn.*

68 Euph... aculeata nuda ſeptem angularis, ſpi-

nis ſolitariis ſubulatis floriferis. *Linn. Euphorbe à épines fleuries.*

69 EUPHORBIA aculeata nuda multangularis aculeis geminatis. *Linn.* Euphorbium offic. Cæteris, ſi nudæ ſint, folia cecidere quod frequenter accidit.

70 Euph... inermis nuda filiformis (funiformis) volubilis cicatricibus oppoſitis. *Linn.*

71 Euph... inermis fruticoſa ſubnuda filiformis (funiformis) erecta, ramis patulis determinatè confertis. *Linn. Diſcipline.*

72 Euph... inermis fruticoſa ſubnuda filiformis flaccida, foliis alternis. *Linn.* Tithymalus aphyllus mauritanicus. *Dillen.*

73 Euph... inermis tecta tuberculis imbricatis foliolo lineari inſtructis. *Linn. Tête de Meduſe.*

74 STAPELIA denticulis ramorum patentibus. *Linn.* Aizoides aphylla. *Moriſſ. Fleur de Crapaud.*

75 Stap... denticulis ramorum erectis. *Linn.* Aſclepiaſtrum.

76 KLEINIA foliis carnoſis planis ovato oblongis. *Linn. L'antieuphorbe.*

77 MESEMBRYANTHEMUM foliis dolabriformibus. *Linn.*

78 Meſem... foliis ſubcilindraceis acutis, connatis arcuatis.

79 Meſem... foliis alternis ſubulatis triquetris longiſſimis. *Linn.*

80 Meſem... foliis apice barbatis. *Linn.*

81 Meſem. caule hiſpido foliis papilloſis. *Linn.* plura vide ſcil. ultrâ triginta in florâ Leydenſi.

82 ALOE foliis ovatis ſubulatis tuberculis cartilagineis undique adſperſis. *Linn. Aloé perlé.*

83 Al... foliis erectis ſubulatis, radicatis, undique inerme ſpinoſis. *Aloé à dent de brochet.*

84 Al... foliis rhomboidalibus ventricoſis obliquè

reſectis triquetris. *Aloé à pouce écraſé.*
Cæteræ ſpecies pro foliatis haberi debent.

85 CRASSULA foliis ſubulatis obſoletè tetragonis. *Linn.*

86 Craſſ... foliis ſubulatis radicatis, caule nudo. *Linn.*

B. *INDIGENÆ.*

87 SALICORNIA annua. Salicor.

88 Salic... ſemper vivens. *Sonſouire.*

89 SALSOLA foliis pungentibus. *Linn.* Kali ſpinoſum cochleat. *C. B.*

90 Salſ... foliis inermibus. *Linn.* Salſola ſativa *Cæſalp. Soude.*

91 CHENOPODIUM fruticans foliis linearibus teretibus carnoſis. *Linn. Engane.*

92 Chen... herbaceum foliis ſemicylindricis acutis alternis. Sed. minus album ſemine ſplendente. *T. Blanchete.*

93 Chen... herbac. foliis teretibus obtuſis tomentoſis alternis. Kali minus villoſum. *C. B.*

94 SEDUM minimum annuum ſtellatum rubrum. *B. M.* folia apice obtuſiſſima, ſæpè opoſita. *Tillæa erecta.* H. Upſ.

95 Sed... foliis teretibus umbellâ ſemicirculari. *Haller.* Sed. minùs luteum (pallidum) ramulis reflexis. *C. B.*

96 Sed... foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis, erectiuſculis alternis racemo triplici. *Linn.* Sed. parvum acre flore luteo *C. B.* folia, confertiſſima conica.

97 Sed... fol. ſubulatis oppoſitis confertis, adnatis, baſi membranaceâ ſolutâ, umbellâ racemoſa. *Linn.* Sedum minus luteum folio acuto. *C. B. Triquemadame.*

98 Sed... foliis teretibus ſparſis ſpinulâ terminatis, umbella ramoſâ. Sedi minoris ſpe-

cies Monſpeſſulana flore albo. *J. B.*

99 SEDUM foliis oblongis obtuſis teretiuſculis ſeſſilibus, patentibus paniculâ ramoſâ. *Linn.* Sed. min. teretifolium album. *T.*

100 Sed... foliis conicis, floribus in alis ſeſſilibus majoribus luteis. *Haller.*

101 Sed... foliis teretibus floribus ad ramos longos erectos, ſeſſilibus. *Hall.* Sed. min. teretifolium alterum. *C. B.* luteum.

102. Sed... foliis cordato-ovatis, compreſſis, ſæpius oppoſitis, floribus ſparſis. Sed. minius folio circinnato. *C. B.*

103 Sed... foliis breviter ovalibus caule laxe ramoſo, floribus magnis albis. *Haller.*

104 ASTER flore terminatrice foliis linearibus tricuſpidatis. *Linn. Limbarde.*

105 TILLÆA procumbens. *Linn.*

Aliò dimittimus Cepæam, Rhodiolam, Crithmum, Aſterem & Spergulam ac Cotyledonem foliis compreſſis gaudentes.

ORDO IV.

Aphyllæ Junceæ & Filiformes vel Teretifoliæ.

106 APHYLLANTES. *Linn. Bragalou.*

107 SCIRPUS culmo nudo ſpicâ terminatrice ſubovatâ. *Linn. Jonc à maſſe.*

108 Scirp... Teres paniculâ ſub apice culmi ramoſâ. *Haller.* Scirp. ſpicis copioſis. *Linn.* Scirp. paluſtris altiſſimus. *T.* ſpicæ oblongæ.

109. Scirp... paniculâ ſolùm folioſâ, ſpicis globoſis,

globoſis, pedunculatis lateralibus. Juncus Holoſchœnus. *Lugdun.*

110. SCIRPUS caule folioſo flaccido, ſcapis alternis capitatis. *Roy.* Juncus equiſes. Capitulo minori. *T.* folium unicum filiforme.

111 SCHÆNUS culmo tereti, tribus foliis patulis & floſculis aggeſtis terminato. Scirpus maritimus capite glomerato. *T.*

112 Schænus floſculis ſpicatis. *Linn.* (*Lateralibus.*) Juncus lithoſpermi ſemine. *B. M.*

113 ERIOPHORUM ſpicis pendulis. *Linn.* Linagroſtis. *T.* *A l'Eſperou.* Folia tamen habet plana ſpicas plures.

114 Erioph... foliis teretibus ſpicâ unicâ ſubrotunda. *Haller.*

115 JUNCUS fol. articuloſis, denſioris paniculæ ramis bis ramoſis. *Haller.*

116 Jun... culmo nudo ſtricto paniculâ laterali. *Roy.* Juncus lævis paniculâ ſparsâ. *T.* Squamæ ad baſim culmi.

117 Jun... culmo nudo ſtricto capitulo laterali. *Roy.* Juncus lævis paniculâ non ſparſâ. *C. B.*

118 Jun... culmo nudo foliis ſetaceis capitulis glomeratis aphyllis. *Linn.* Gramen. Junceum foliis & ſpicâ Junci. *C. B.*

119 Jun... culmo nudo nutante paniculâ laterali. *Roy.* *Seſſili.* Junc. lævis paniculâ ſparsâ major. *C. B.* Vaginæ caulinæ.

120 Jun... culmo nudo mollior paniculâ laterali compactâ. Junc. lævis. *Lugd.* *Jonc liſſé.*

121 Junc... culmo pungente. paniculâ ex folii ſolitarii axillâ. Junc. acutus capitulis Sorghi. *C. B.* fimbriæ pinnato ſetaceæ.

122 Jun... culmo nudo paniculam arcuatim

tegente. Junc. Melancranis. *Lugd.* Apex culmi complanatus & arcuatus paniculam obumbrat.

123 JUNCUS foliis articuloſis, ramoſæ paniculæ ramis ſemel ramoſis. *Haller.*

124 CEPA ſcapo ventricoſo, foliis longiore radice depreſsâ. *Linn.* *L'Oignon.*

125 Cep. ſcapo longitudine foliorum, foliis ventricoſis. Radice oblongâ; Cepa oblonga. *C. B.* *Ciboule.*

126 Cep... ſcapo longitudine figurâ-que foliorum, foliis ſubulatis teretibus, ſpathis globoſis. *Linn.* Cep. ſectilis juncifolia. *C. B.*

127 Cep... radice ovatâ tunicatâ fæta bulbillis ovato-acuminatis hinc planis. *Roy.* *L'Echalotte.*

128 Cep... capite bulbifero, vaginâ longiſſimè caudatâ. *Hall.* Allium ſylveſtre bicorne flore obſoleto. *C. B.*

129 ALLIUM montanum bicorne flore obſoletiore. *C. B.* radix bulbillis fæta, folia teretia, floſculi longè pedunculati.

130 All... juncifolium bicorne luteum. *C. B.* bulbus oblongus, folia teretia, floſculi lutei pedunculati.

131 All... ſylveſtre ſive moly moſchatum capillaceo folio. *C. B.* Bulbus oblongus, cortice reticulari rufo; floſculi longè pedunculati.

Cætera Allia Monſpeliaca foliis planis gaudent.

132 All. foliis teretibus vaginâ longâ ſtrictâ, umbellâ bulbiferâ. *Hall.* Ampelopraſum proliferum. *Lobel.*

133 PORRUM capite bulbifero, ſtaminibus alternè trifidis. *Haller.* Allium ſylveſtre te-

nuifolium lobel. *J. C.* All. ſylv. Mathiol. folia fiſtuloſa, bulbilli bulbum radicis ſtipantes, odor Allii, ſpatha bifida.

134 PORRUM capite ſphærico, abſque bulbis, ſtaminibus alternè trifidis. *Haller.* All. Montan. capite rotundo. *C. B.*

ORDO V.

Aphyllæ anomalæ filiformes & Lithophyta.

A. *FILIFORMES.*

135 CUSCUTA nuda repens filiformis. *Linn.* Cuſcuta minor. *C. B.*

136 Cuſc.... nuda repens funiformis. Cuſcuta major. *C. B. Raſque.*

137 CONFERVA filis longiſſimis ſimpliciſſimis æqualibus. *Linn.*

138 Conf... filis ramoſis æqualibus radicatis. *Linn. Queüe de Renard.*

139 LICHEN filamentoſus pendulus, ramis implexis, ſcutellis radiatis. *Linn.* Uſnea offic.

140 Lich... fruticuloſus perforatus, ramoſiſſimus, ramulis nutantibus. *Linn.* Coralloides corniculis candidiſſimis. *T.*

141 BISSUS tenerrima viridis vellutum referens. *Dillen.*

B. *LYTHOPHYTA.*

142 ISIS rubra ramis patulis teretiuſculis. *Royen.* Corallum rubrum offic.

143 SERTULARIA caule ſimplici, umbraculo orbiculato peltato. *Linn.* Acetabulum marinum procerius. *T.*

144 SERTULARIA ramoſiſſima, articulis cylindraceis filo trajectis catenulatis. *Royen.* Corallina fiſtuloſa fragilis ſubtilior. *J. B.*

145 Sert... pinnata ramoſa articulis caulinis obverſè ovatis compreſſiuſculis trichotomis ramorum cylindraceis. *Roy.* Corallina. *J. B.*

146 Sert... dichotoma ramoſiſſima, ramulis & articulis capillaceis. Corallinæ affinis, Muſcus marinus tenui capillo. *J. B.*

147 MADREPORA ſimplex ramoſa, ramis teretibus lævibus ſolidiuſculis, lamellis integerrimis. *Linn.* Madrepora vulgaris. *T.*

108 Madr... ſimplex acaulis orbiculata convexâ lamellis denticulatis. *Linn.* Fungus lapidoſus. *Cluſ.*

149 MILLEPORA membranacea flexilis ramoſiſſima, ramis diſtinctis planis obtuſis, ſupernè dilatatis. *Linn.* Fucus telam lineari texturâ ſuâ æmulans. *Raii.*

150 Mill... ramoſiſſima punctis ſubtus ſemiovatis prominulis ramis acutis. *Linn.*

CLASSIS SECUNDA.

Plantæ Ceſpititiæ vel Aphyllocaules foliis radicalibus.

FOLIA ſimplicia vel diſſecta, nunquam compoſita gerunt, eaque tantùm radicalia, ceſpitis ad inſtar ſæpius humifuſa vel aquis immerſa, Floralia raro.

I. Anguſtifoliæ Foliis ſimplicibus.

ORDO PRIMUS.

Foliis Oblongis apice anguſtiori rotundato vel obtuſo.

. 1 PRIMULA foliis denticulatis rugoſis. *Linn.* *Primevere.*

2 Prim... foliis ſerratis glabris. *Linn.* *L'oreille d'ours.*

3 Prim... foliis crenatis glabris. *Linn.* Primula veris rubro flore. *Cluſ.*

. 4 DORONICUM caule nudo ſimpliciſſimo. *Linn.* Bellis media. *Cluſ.*

. 5 LEONTODON foliis integris ſinuatis, pappo plumoſo, calyce glabro. Taraxacum *Hall.*

.6 Leon... foliis integris dentatis, calyce hiſpido, pappo plumoſo. Taraxac. *Hall.*

.7 Leon... foliis integris dentatis pappo ſimplici. Taraxac. *Hall.*

.8 MANDRAGORA. *Linn. La Mandragore.* Variat foliis lanceolatis.

9 PINGUICULA nectario cylindraceo longitudine petali. *Linn.*

10 DROSERA ſcapis radicatis foliis oblongis. *Linn.*

.11 STATICE caule ramoſo foliis lanceolato ovalibus glabris. Limonium maritimum majus. *C. B.*

.12 CREPIS caulibus nudis unifloris, foliis glabris ſpatulatis. Hieracium Chondrillæ folio glabrum minus. *C. B. A Gramont.*

.13 HYPOCHERIS foliis alternatim dentato ſinuatis caule nudo unifloro pedunculis glabris. *Linn.* Hieratium minus Dentis Leonis folio oblongè glabro. *C. B.*

.14 HYOSERIS caule diviſo nudo. *Linn.* Hieracium minimum. Cluſii. Calyce globoſo.

.15 HIERACIUM foliis integerrimis ovatis caule repente ſcapo unifloro. *Linn.* Piloſella offic. major hirſuta. *C. B.*

.16 Hierac... foliis integerrimis caule repente ſcapo nudo multifloro. *Linn.* Folia lanceolato ovalia.

.17 ALISMA fructu globoſo undique echinato. *Linn.* Caulis non ſtriatus folia lineari lanceolata.

.18 Ali... fructu ſexcorni. *Linn.* Damaſonium ſtellatum. *Lugd.*

.19 Ali... fructu obtuſè trigono. *Linn.* Plantago aquatica latifolia. *C. B.* caulis enneagonus, paniculæ verticillatæ.

.20 POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis pe-

tiolatis. *Linn.* Potamogeton rotundifolium. *C. B.* Folia ovalia, laurina, natantia.

ORDO II.

Foliis Spatulatis ſeu apice dilatatis & obtuſis.

21 STATICE foliis obverſè ovatis ramis nudis humifuſis intricatis. Limonium ſupinum reticulatum. *Boccon.*

22 STATICE foliis obverſè ovatis glabris caule nudo ramoſo. Limonium parvum Bellidis minoris folio. *C. B.*

23 Sta... fol. obverſè ovatis verrucoſis, caule ramoſo nudo. Limonium minùs annuum bullatis foliis vel echioides. *B. M.*

24 Sta... foliis ſpatulatis retuſis, caule ramoſo nudo. Limonium maritimum minùs foliis cordatis. *C. B.*

25 BELLIS ſcapo nudo unifloro. *Linn. Paquerette.*

26 DROSERA ſcapis radicatis, foliis orbiculatis. *Linn.* Ros ſolis folio ſubrotundo. *C. B.* *A l'Eſperou.*

27 GLOBULARIA foliis radicalibus cuneiformibus retuſis dentatis, denticulo intermedio minimo. *Linn.*

28 Glob... caule nudo foliis ad terram oblongè rotundis integerrimis. *Haller,*

ORDO III.

Foliis utrimque acutis ſeu lanceolatis.

29 PLANTAGO foliis ovali-lanceolatis pubeſcentibus, ſpicis globoſis. *Linn.* Plant. anguſtifolia capitulis Lagopi. *C. B.*

30 Plant... foliis lanceolatis ſpicâ ſubovatâ. *Linn.* Pl. anguſtifolia major. *C. B.*

31 Plant... fol. lanceolatis longitudine ſcapi, ſpicâ oblongâ. *Linn.* Pl. anguſtifolia minor. *Tabern.*

32 Plant... fol. lineari lanceolatis ſpicis globoſis. *Linn.*

33 PERSICARIA florum ſtaminibus quinis corollam ſuperantibus ſtylo bifido. *Linn.* Perſicaria Salicis folio. *Raii.*

34 ANDROSACE calycibus fructuum maximis. *Linn.*

35 ARETIA glabra obtuſifolia umbellifera. *Haller.* Androſace alpina. &c. *T.* Glandulas gerit in flore, folia acuta ſerrata.

36 DRABA caule nudo foliis crenatis. *Linn.* Alyſſum vulgare Polygoni folio caule nudo. *T.*

37 CONVALLARIA ſcapo nudo. *Linn.* Lilium convallium album. *C. B.*

38 ALLIUM foliis lanceolatis ſcapo nudo ſemycilindraceo, bulbo ſetis obvallato. *Linn.* All. ſylveſtre latifolium. *T.*

39 ALLIUM foliis lanceolatis radicalibus, ſeſſilibus, floribus umbellatis. *Roy.* All. latifolium luteum. *T.*

40 ARUM acaule foliis lanceolatis, ſpadice ſetaceo

taceo declinato. *Linn.* Arum Scorzoneræ folio. *T.*

41 ALOE foliis lanceolatis dentatis ſpicâ cartilagineâ terminatis radicalibus. *Linn.* Aloë Americana muricata. *T. B.*

42 Aloë foliis lanceolatis planis rectis radicatis. *Linn.* *Aloë de Guinée.*

43 Aloë fol. ovato-lanceolatis, carnoſis, apice triquetris angulis inerme dentatis. *Linn.* *Aloë à patte d'Araignée.*

ORDO IV.

Foliis Enſiformibus non vaginantibus.

A. *FOLIIS PLANIS.*

44 HYACINTHUS corollis campanulatis ſexpartitis. *Linn.*

45 Hya... corollis infundibuliformibus ſemiſexfidis baſi ventricoſis. *Linn.* *Hyacinthe Oriental, Muguet.*

46 Hya... corollis ovatis. *A Nîmes près Tourmagne.*

47 Hya... corollis globoſis ſummis pedunculatis foliis enſiformibus. Muſcari arvenſe latifolium purpuraſcens. *T.*

48 Hya... corollis ovatis ſummis ſellilibus foliis enſiformibus. Muſcari arvenſe cæruleſcens minus latifolium. *C. B.*

49 NARCISSUS foliis enſiformibus nectario longitudine petalorum. *Linn.*

50 Narc... fol. enſiformibus nectario rotato breviſſimo. *Linn.*

51 NARCISSUS fol. enſiformibus nectario cam-

panulato petalis longè breviore. *Linn.*

. 52 Nar. . . fol. enſiformibus ſpathâ multiflorâ nectario patulo petalis duplò breviore.

. 53 LEUCOIUM. *Linn. Perceneige. A Lattes.*

54 SCILLA radice tunicatâ. *Linn. La Squille.*

55 Sci. . . radice ſquamoſâ. *Linn.* Lilio-Hyacinthus. *T.*

56 Sci. . . radice ſolidâ floribus mutantibus alternis. *Linn.* Ornytogalum Cæruleum Byzantinum. *T.*

57 Sci. . . radice ſolidâ floribus patentibus confertis corymboſis. *Linn.* Ornyt. ſpicatum cinereum. *T.*

. 58 Sci. . . radice ſolidâ floribus erectis paucis. *Linn. à l'Eſperou.* Ornyt. bifolium Germanicum cæruleum. *T.*

59 Sci. . . latè umbellifera. Ornit. eriophorum Peruvianum. *T.*

. 60 COLCHICUM foliis planis erectis. *Linn.* Colch. commune. *T.*

. 61 PANCRATIUM ſpathâ multiflorâ foliis enſiformibus. *Roy.*

. 62 ALLIUM caule tereti propagine ex alâ. *Roy.* Allium latifolium liliflorum. *T.*

63 All. . . toto capitulo bulboſo latifolium. All. Caucaſon. *Lob.*

64 AMARILLIS ſpathâ uniflorâ corollâ æquali, ſtaminibus declinatis. *Linn.* Lilio Narciſſus autumnalis luteus major. *T.*

65 FRITILLARIA caule nudo, folioſâ florum coronâ terminato. Corona imperialis. *T.*

B. *FOLIIS DISTICHIS PLANIS.*

. 66 IRIS corollis barbatis ſcapo nudo longitudine foliorum multifloro. *Linn.* Iris latifolia caule aphyllo. *C. B.*

. 68 BUTOMUS Cæſalp. *Linn. Jonc fleuri.*

69 ALOÉ foliis linguiformibus patulis diſtichis. *Lin.*

70 HEMEROCALLIS radice tuberoſâ corollis monopetalis. *Linn. Belle de jour, Lys aſphodele ponceau & rougeâtre ſaffrané.*

C. *FOLIIS LINEARIBUS SUBULATIS NON TERETIBUS.*

. 71 NARCISSUS foliis ſubulatis nectario breviſſimo. *Linn. Jonquille.*

. 72 CROCUS flore fructui impoſito, tubo longiſſimo. *Roy. Saffran.*

. 73 HYACINTHUS corollis globoſis foliis in cylindrum convolutis. Muſcari anguſtifolium ſpicâ brevi odorâ. *Hall.*

. 74 SCILLA radice ſolidâ ſcapo multifloro floribus capitatis ornithogalum autumnale minus flore dilutè purpureo. *T.*

. 75 TRIGLOCHIN capſulis trilocularibus linearibus. *Linn.* Juncago paluſtris & vulgaris. *T. A Perauls.*

76 Trig. . . capſulis ſex-locularibus ovatis. *Linn.* Gramen ſpicatum, alterum. *C. B.*

77 ANTHERICUM foliis enſiformibus perianthiis trilobis, filamentis glabris. *Linn.* Petala anguſta acuta pſeudo aſphodelus. *Cluſ.*

. 78 Anth. . . fol. planis corollis planis deciduis. *Linn.* Phalangium parvo flore ramoſum. *C. B.* Radices teretes. *A l'Eſperou.*

79 Anth. . . fol. gramineis caule ſpicato nudo pedunculis non ramoſis. Phalangium parvo flore non ramoſum. *C. B.*

D. *FOLIIS CARINATIS.*

. 80 ORNITHOGALUM ſpicâ longiſſimâ filamentis triangularibus. *Hall.* Ornith. an-

guſtifolium majus floribus ex albo vireſcentibus. *C. B.*

81 ORNITHOGALUM ſcapo angulato diphyllo (Triphyllo) pedunculis umbellatis ramoſis. *Linn.* Ornith. luteum minus. *C. B.* folia tria umbellam ſuſtinent.

82 Ornit. . . ſcapo anguloſo diphyllo, pedunculis umbellatis ſimplicibus. *Linn.* Ornith. Luteum. *C. B.*

83 Ornit. . . pedunculis imis ſummos ſuperantibus. *Hall.* Ornith. floribus corymboſis, pedunculis ſcapum longè ſuperantibus filamentis alternis emarginatis. *Linn.* & Ornith. medium umbellatum anguſtifolium. *Linn. C. B.*

84 ASPHODELUS caule nudo foliis laxis. *Linn.* Aſpho. albus ramoſus maj. *C. B.* *Alede.* Quandò que ramoſus non eſt.

85 Aſph. . . caule nudo foliis ſtrictis. *Roy.* Aſph. fol. fiſtuloſis. *C. B.*

ORDO V.

Foliis Vaginantibus Enſiformibus, à radice decurrentibus.

A. CARINATIS.

86 CYPERUS culmo triquetro nudo paniculâ folioſâ, radicum tuberibus ovatis zonis imbricatis. *Roy.* Cyperus rotundus eſculentus anguſtifolius. *C. B.*

87 Cyper. culmo triquetro, paniculâ folioſâ, pedunculis ſimpliciſſimis ſpicis confertis.

67 TYPHA. *Linn.* *La Maſſe.*

Roy. radicibus nodoſis. Cyperus rotundus vulgaris. *C. B.* umbellulis nudis.

88 CYPERUS culmo triquetro folioſo, paniculâ folioſâ ſuprâ de compoſitâ, pedunculis nudis ſpicis alternis. *Roy.* differt à præcedenti umbellulis folioſis. Cyp. odoratus radice longâ ſeu Cyperus offic. *C. B.*

89 Cyper... culmo triquetro paniculâ folioſâ, pedunculis nudis ſuprà de compoſitis, ſpicis confertis. *Roy.* Cyper. gramineus *J. B.* Scirpus. *Haller.* Quia ſemen ariſtis ſeptum, folia plana.

90 Cyper... Culmo triquetro umbellâ trifoliâ, umbellulis nudis ſeſſilibus. Gramen cyperoides ſpicis minoribus minùs que compactis. *C. B.*

91 Cyper... culmo triquetro ſpicis ſeſſilibus confertis diſtichis apici trifoliato inſidentibus. Cyper. minimus paniculâ ſparſâ. *T.*

92 CAREX ſpicâ ſuprâ, decompoſitâ, ſpiculis androgynis, ovatis, ſeſſilibus, confertis, ſupernè maſculis. *Linn.* Gramen Cyperoides majus ſpicâ compactâ. *C. B.*

93 Car... ſpicis brevibus echinatis (Androgynis) ſeſſilibus, diſtinctis. *Hall.* Gramen nemoroſum ſpicis parvis aſperis. *C. B.*

94 Car... ſpicâ paniculatâ. *Haller.* Cyperus longus inodorus ſylvaticus. *C. B.*

95 Car... ſpicis obeſis ſubrotundis, in ſummo caule ſe alternè contingentibus (Androgynis.) *Haller.* Gramen Cyperoides paluſtre majus ſpicâ diviſâ. *C. B.*

96 Car... ſylvaticus ſpicis parvis ſeſſilibus in foliorum alis. *Ruppii.*

97 Car... ſpicis erectis oblongis ſeſſilibus alternis folio florali brevioribus, ſuperiori-

bus maſculinis. *Linn.* Cyperoides nigroluteum vernum minus. *T.*

98 CAREX ſpicis ad apicem tribus ſeſſilibus, fœmininis ſubrotundis, capſulis acutis recurvis. *Linn.* Gramen paluſtre echinatum. *Lob.*

99 Car... ſpicis pendulis femineis omnibus, unicâ androgynâ infernè maſculâ. *Linn.* Pſeudo Cyperus. *Dod.*

100 Car... ſpicis maſculinis memeroſis ſupernis, fœminis inferioribus, intermediâ unicâ Androgynâ. *Linn.* Gramen Cyperoides ſpicâ rufâ ſeu caule triangulo. *C. B.*

101 Car... minor ſpicâ divulſâ radice comatâ. *Dillen.* Gramen Cyperoides ſpicis minoribus minuſque compactis. *C. B.*

102 JUNCUS culmo foliis & floribus tribus terminato. *Linn.* Junc. trifidus. *J. B. Jonc.*

103 Jun... foliis angulatis culmo trichotomo, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Roy.* Gr. nemor. caliculis paleaceis. *C. B.*

104 Jun... fol. duris carinatis caule nudo floribus cartilagineis nitentibus in raram paniculam congeſtis. *Hall.* Junc. parvus cum pericarpiis rotundis. *T.*

105 SCHÆNUS capitulis teretibus umbellatis, foliis & carinâ ſerratis. Mariſcus. *Hall.* Scirpus paluſtris... *T.*

B. *PLANIFOLIÆ FOLIIS CAULEM SÆPE VAGINANTIBUS.*

106 ORCHIS radicibus ſubrotundis (Ovoidæis,) brachiolis labelli. Brevioribus, ſpinulâ ex diviſione medii trunculi eminente. *Hall.* Orch. Latifolia hiante cucullo major. *T.*

107 Orc... rad. ſubrotundis, ſpicâ denſâ, cruſculis labelli ampliter divergentibus. *Haller.*

Orchis militaris pretenſis humilior. *T.*

108 ORCHIS radicibus ſubrotundis, ſpicâ denſâ, labello æqualiter tripartito, calcare ovarii longitudine. *Haller.*

Orchis montana purpurea odorata. *C. B.*

109 Orc... radicibus ſubrotundis, cucullo, ſparſo, labello ampliter trifido crenato flore concolore. *Haller.*

Orchis morio-foliis ſeſſilibus maculatis. *T.*

110 Orc... bulbis indiviſis nectarii labro quadrifido crenulato obtuſo. *Linn.* Orchis morio mas foliis maculatis. *C. B.*

111 Orc... bulbis indiviſis, labello trifido punctato, lacinulâ mediâ longiori cornu germinibus breviore.

Orchis odore hirci minor flore purpuraſcente. *T.*

112 Orc... flore nudi Hominis effigiem repræſentans mas. *C. B.* cruſcula ſcilicet & pedes graciles non obtuſi cucullus clauſus.

113 Orc... bulbis indiviſis, nectarii labio quadrifido crenulato cornu obtuſo. *Linn.* Orchis morio fæmina. *T.*

114. Orc... radicibus cylindricis, bracteis flore brevioribus labello trifido obtuſo, ſeta germinibus breviore. Limodorum Auſtriacum *Cluſ.* Orchis abortiva violacea. *T.*

115 Orc... bulbis palmatis, nectarii cornu ſetaceo germinibus longiore, labio crenato. *Linn.* Orch. pal. minor calcaribus longis. *C. B.*

116 Orc... bulbis ſub palmatis rectis, nectarii cornu conico labio trilobo integerrimo, bracteis flore longioribus. *Linn.*

117 Orc... bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breviore labio crenato,

dorſalibus petalis patulis. *Linn.* Orc. palmata pratenſis maculata. *C. B.*

118 ORCHIS radicibus palmatis bracteis flore longioribus, nectarii labio trifido, cornu germinibus breviore. *Linn.* Orch. palmata pratenſis latifolia. *C. B.*

119 Orc... bulbis palmatis anguſtiſſimo folio calcare gracili, ovario breviore. *Hall.* Orchis palmata anguſtifolia minor odoratiſſima. *T.*

120 SATYRIUM radicibus ſubrotundis, labello longiſſimo gracili, calcare breviſſimo. *Hall.* Orchis barbata fœtida. *T.*

121 Saty... radicibus ſubrotundis cucullo clauſo, monopetala labello ovato-lanceolato. Calcar nullum fovea ſcrotiformis nulla, labellum purpureum trilobum ſed laciniâ mediâ maximâ ovato-lanceolata, nulla petala niſi cucullus. *A Gramont.*
Orchis montana italica flore ferrugineo nutente. *C. B.*

122 Saty... bulbis fibroſis nectarii labio obtuſo petalis breviore. *G. M.* Helleborina paluſtris noſtras. *Raij.*

123 CYPRIPEDIUM bulbis ſubrotundis foliis oblongis caulinis. *Linn.*
Orchis muſcæ corpus referens minor galeâ & alis herbidis. *T.*

124 Cyp... fol. ovato-lanceolatis. *Linn.* Calceolus Mariæ. *T.*

125 Cyp... bulbis ſubrotundis foliis ovalibus, orchis humilis lutea vigani. *Dalech.* Satyr. radicibus ovatis, labello picto trifido calcare nullo cucullo viridis alis & caudâ muſcæ luteis, brachiola nulla.

126 Cyp... radicibus ſubrotundis, calcare nullo,

lo, labello latiſſimo holoſericeo, unicolore, integro obtuſo.
Orch. fucum referens colore rubiginoſo. *T.*
127 CYPRIPEDIUM radicibus ſubrotundis, calcare nullo, labello holoſericeo vario latiſſimo mucronem ex medio emittente.
Orchis ſuciflora galeâ & alis purpuraſcentibus. *J. B.*
128 Cyp... radicibus ſubrotundis, calcare nullo, labello latiuſculo biſulco, brachiolis brevibus.
Orchis muſcæ corpus referens galeâ & alis herbidis. *C. B.*
129 NEOTTIA bulbis faſciculatis nectarii labio bifido. *Linn.* Nidus avis. *T.*
130 Neottia bulbis faſciculatis nectarii labio indiviſo. *Linn. Act. Upſal.*
Orchis ſpiralis alba odorata. *J. B.* Helleborine radicibus conicis. *Haller.*
131 Neottia bulbis ſubrotundis nectarii labio quadrifido. *Linn.*
Orchis Hominis nudi effigiem repræſentans fæmina. *Linn. Act. Upſ.*

C. *GRAMINIFOLIÆ.*

132 JUNCUS foliis planis ſpicâ ſeſſili pedunculatiſque. *Linn.*
Gramen exile hirſutum cyperoides lob. *R.*
133 Jun... foliis planis piloſis corymbo ramoſo. *Linn.*
Gram. hirſutum latifolium majus. *C. B.*
134 Jun... foliis planis, glumâ triflorâ aphyllâ, terminatrice. *Linn.*
Juncus exiguus montanus mucrone carens. *C. B.*
135 Junc... foliis planis culmo paniculato, ſpicis ovatis. *Linn.* D

Gram. hirſutum capitulo globoſo. *C. B.*

136 JUNCUS foliis planis latiſque paniculâ ſparſâ ramoſâ. *Hall.*

Gram. hirſutum latifolium minus. *C. B.*

Gram. luzulæ. *J. B.*

137 Jun. . . foliis planis latiſſimis, paniculâ ſparſâ duplicato ramoſa. *Hall.* Gram. luzulæ maximum. *J. B.*

138 Jun. . . foliis planis paniculâ ſparſâ ramis ramoſis. *Hall.*

139 Jun. . . foliis planis anguſtioribus paniculâ umbellatâ foliis breviori, floribus longiſſimis albis. *Hall.*

Gram. leucanthemum. *Lugdun.*

140 Jun. . . foliis planis latioribus, paniculâ umbellatâ, floribus minimis. *Hall.* Gram. hirſutum anguſtifolium majus. *C. B.*

141 ANTHOXANTHUM floſculis diendris. *Linn.*

142 NARDUS foliis denſe faſciculatis ſpicâ tereti. Nard. ſpuria Gangitis. *Dalech.*

123 Nar. . .

Gramen minimum. *Dalech.*

144 PHLEUM radice bulboſâ. Gramen nodoſum ſpicâ parvâ. *C. B.*

145 MYOSURUS foliis integris. *Linn.* Myoſurus. *J. B. A Gramont.*

146 PLANTAGO foliis lanceolato-linearibus (Scapo foliis duplò longiore) ſpipâ oblongâ. *Linn.* Plant. anguſtifolia albida. *T.*

147 Plan. . . foliis linearibus ſpicâ oblongâ. *Haller.* Plantago gramineo folio major. *T.*

148 Plan. . . foliis ſemicilindraceis integerrimis. *Linn.*

Coronopus maritimus major. *C. B.*

49 PLANTAGO foliis filiformibus, ceſpite

denſiſſimo, ſpicâ longâ. Plan. Gramineo anguſtiſſimo folio. *C. B.*

150 STATICE caule nudo ſimpliciſſimo. *Linn. Gazon d'Eſpagne.*

151 SILENE acaulis. *Linn.* Sychn. alpina folio gramineo. *T. A l'Eſperou.*

152 BANUNCULUS foliis linearibus radicatis, ſcapo nudo unifloro. *Linn.* Ran. montan. Gramineo folio. *C. B.*

153 CRASSULA fol. ſubulatis radicatis caule nudo. *Linn.*

154 DRABA foliis gramineis ciliatis. *Haller.* Alyſſum alpin. hirſutum luteum. *T. A l'Eſperou.*

ORDO VI.

Ceſpititiæ Anomalæ Anguſtifoliæ.

A. *FOLIIS LINEARIBUS.*

155 CONFERVA Plin. Alga vividis capillaceo folio. *C. B.*

156 FUCUS filiformis ſimplex *Linn.* Alga nigro capillaceo folio. *C. B.*

157 Fuc... ſive alga graminea *Dalech.* Alga anguſtifolia vitriariorum. *C. B. Bauque.*

158 Fuc... longiſſimo latoque ac tenui folio. *T.*

159 Fuc... folliculaceus ſertato folio. *C. B.*

B. *FOLIIS BASI INCISIS.*

160 ASPLENIUM frondibus (Ligulatis) linearibus integris baſi cordatis inflexis. *Linn.* Lingua cervina offic.

161 SAGITTARIA foliis ſagitatis ligulatis. Sagitta aquatica minor anguſtifolia. *C. B.*

ORDO VII.

Ceſpititiæ Latifoliæ foliis ovatis aut breviter lanceolatis, utrinque anguſtioribus.

162 PLANTAGO foliis ovatis. *Linn.*
163 Pl. . . foliis ovali lanceolatis pubeſcentibus ſpicis teretibus. Plan. latifolia incana. *C. B.*
164 STATICE caule ramoſo nudo, foliis lanceolato ovalibus glabris limonium maritimum majus. *C. B.*

Na. His adde cæteras ceſpititias Ord. I. & II. cum lateſcunt.

ORDO VIII.

Ceſpititiæ Latifoliæ foliis cordatis, vel ſagittatis.

165 RHEUM. *Linn. Rhubarbe de la Chine.*
166 CORTUSA foliis cordatis petiolatis. *Linn.*
167 CALLA foliis cordatis, ſpathâ planâ, ſpadice undique hermaphrodito. *Linn.*
168 CYCLAMEN. *Linn. Pain de Pourceau.*
169 ARUM acaule foliis cordato oblongis, ſpathâ bifida ſpadice recurvo. Linn.
170 Arum acaule foliis peltatis ovatis, baſi ſe-

mibifidis margine repandis. *Linn.* Colocaſia. *J. B.*

171 SAGITTARIA foliis ſagitatis (Latifolia.) *Linn.* Sagitta major. *C. B.*

ORDO IX.

Ceſpititiæ Rotundifoliæ.

A. *FOLIIS PELTATIS.*

172 COTYLEDON foliis peltatis. *Linn.* Cotyledon major. *C. B.*

173 HYDROCOTYLE foliis peltatis orbiculatis undique emarginatis.

B. *FOLIIS BASI BIFIDIS.*

174 HYDROCHARIS. *Linn.* Morſus ranæ foliis circinnatis. *T.*

175 MENIANTHES foliis orbiculatis corollis margine laceris. *Linn.* Nymphoïdes aquis innataus. *T.*

176 NYMPHÆA calyce magno pentaphyllo. *Linn. Nenuphar jaune.*

177 Nymphæa calyce tetraphyllo corollâ multiplici. *Linn.*
Nymphæa alba major. *C. B.*

C. *FOLIIS RENIFORMI-CORDATIS.*

178 SOLDANELLA. *Linn.* Sold. alpina rotundifolia. *C. B.*

179 VIOLA acaulis ſtolonibus teretibus reptantibus, pedunculis radicatis. *Linn.* Viola marina purpurea. *C. B.*

180 Viola acaulis ſtolonibus reptantibus deſtituta. *Hall.*

181 Viola acaulis flore foliis multò majore. *Haller.*

182 HEUCHERA. *Linn.* Mitella Americana flore ſqualido purpureo. *T.*

183 CONVOLVULUS foliis reniformibus. *Linn. Chou Marin.*

D. *SCAPO SQUAMOSO.*

184 TUSSILAGO Scapo ferè nudo unifloro foliis cordato-orbiculatis crenatis. *Linn.* Tuſſil. alpina rotundifolia glabra. *T.*

185 Tuſſil. . . Scapo imbricato unifloro foliis cordatis angulatis denticulatis. *Linn.* Tuſſil. vulgaris. *C. B.*

ORDO X.

Ceſpititiæ diſſectæ.

1°. *LICHENES.*

186 LICHEN leproſus candidus tuberculis candidis. *Linn.*

187 Lic. . . leproſus flaveſcens, lineolis nigris mappam referens. *Linn.*

188 Lic. . . pallidè viridis rugoſus margine undulatus. *Roy.* Lichen. *Dioſcor.*

189 Lic. . . nigricans omphaloïdes. *Vaill.*

190 Lic. . . foliis oblongis laciniatis, marginibus conniventibus ciliaribus. *Linn.* Muſcus catharticus. *Borrich.*

191 Lic. . . cinereus terreſtris. *Raii.*

92 Lic. . . ſcyphifer ſimplex crenulatus tuberculis fuſcis. *Linn.* Fungus terreſtris pixidatus. *H. R. M.*

93 Lic. . . foliis oblongis diviſis, ſuperficie reticulatâ & punctatâ. *Linn.* Pulmonaria. *Mathioli.*

94 JUNGERMANNIA acaulis foliolo ſolio innato. *Linn.*

95 BLASIA. *Michel.*

96 ANTHOCEROS. *Michel.*

97 RICCIA foliis ovatis duplici lineâ nigro punctatâ.

98 Riccia minima glauca ſegmentis anguſtioribus ad marginem piloſis. *Michel.*

99 MARCHANTIA calyce communi quinquefido hemiſphærico. *Linn.* Hepatica 3ª. *Tabern.*

100 March. . . calyce communi decemfido laciniis linearibus. *Linn.* Hepatica offic. *Vaill. au Labirinthe. Le long du Lez.*

101 March. . .

MARSILÆA major atro vireus floribus albicantibus è foliorum alis egredientibus. *Michel.* Licheus petræus. *C. B.*

2°. *ALGÆ.*

102 LEMNA foliis ſeſſilibus utrimque planiuſculis radicibus ſolitariis. *Linn. Lentille de Marais.*

103 Lem. . . (Lenticula) paluſtris bifolia fructu tetragono. *C. B.*

104 Lem. . . (Lenticula) paluſtris latifolia punctata. *C. B. A Leſtes.*

105 Lem. . . foliis petiolatis. *Linn.* Lenticula aquatica triſulca. *C. B. A Lunel.*

CLASSIS III.

PLANTÆ ANGUSTIFOLIÆ.

HUC pertinent omnes quarum ſolia per caulem ſine ordine ſparſa, ſimplicia, non diſſecta ita ſunt anguſta ut eorum latitudo maxima vix ſit tertia pars longitudinis.

ORDO PRIMUS.

Anguſtifoliæ muſcoſæ minimæ cryptogamæ.

1 POLYTRICHUM caule ſimplici maſ. fœmina. *Linn.* Polytr. Apuleii muſcus juniperifolius calyce expanſo. *Vaill.*

2 Polyt. . . capſulis oblongo rotundis calyptris villoſiſſimis. *Hall.*

3 BRYUM caule erecto foliis ſetaceis, capitulis globoſis. *Linn.*

4 Bruy. . . calyptrâ extinctorii formâ minus. *Hall.* Muſcus minimus cucullatus. *Niſſole.*

5 Bry. . . foliis ſetaceis, pedunculo reflexo, capitulis ſubrotundis. *Linn.*
Bryum trichoïdes hirſutie caneſcens. *Dillen.*

6 Bry. . . fol. ſubulatis imbricatis, capitulo pendulo apice rubro.

7 Bry. . . fol capillaceis capitulis conicis ſetâ terminatis.

8 Bry. . . piloſum molle, ſetis intortis. *Dillen.*

BRYUM

9 BRYUM heteromallum. *Dillen.*

10 Bryum tenue ſtellatum, ſetis purpureis. *Dillen.*

11 Bryum ſtellatum ſetis & capſulis longioribus. *Dillen.*

12 Bryum reclinatum foliis falcatis ſcoparum effigie. *Dillen.*

13 Bryum capſulâ nutante turbinato-ovatâ, calyptrâ reflexâ quadrangulari. *Linn.* Polytrichum apuleii minus. *Fuchſ.*

14 Bryum capſulis pendulis, foliis lenceolatis acuminato-ſetaceis, pedunculis longiſſimis. *Linn.*

15 MNIUM caule dichotomo foliis ſubulatis. *Linn.* Mnium majus ramis longioribus bifurcatis. *Dillen.*

16 Mn. . . caule ramoſo androgynum. *Linn.* Muſcoïdes muſcus capillaceus minimus capitulo minimo pulverulento. *Vaillen.*

17 Mn. . . caule ſimplici geniculis inflexo. *Fl. Lapp.*

18 JUNGERMANNIA ſurculis erectiuſculis foliolis undique imbricatis acuminatis erectis. *Linn.*

19 Jung. . . ſurculoſa erectiuſcula foliolis undique imbricatis acuminatis, hinc reflexis. *Linn.*

20 SPHAGNUM cauliferum & ramoſum paluſtre candicans reflexis ramulis foliis anguſtioribus. *Dillen.*

21 HYPNUM repens trichoïdes terreſtre luteovirens vulgare majus, capitulis erectis. *Dillen.*

22 Hyp. . . trichoïdes capitulis plurimis erectis lanuginoſum. *Hall.*

ORDO SECUNDUS.

Anguſtifoliæ Gramineæ.

A. *DYGINA SIMPLICIA.*

23 ISCHÆMUM foliis rigidis, ſpicis glabris. Gramen dactylon radice repente ſive Gramen offic. *T.*

24 Iſch. . . ſpicis villoſis. Gramen digitatum hirſutum. *J. B.*

25 PHLEUM ſpicâ longiſſimâ cylindraceâ. *Linn.* Gram. typhoïdes.

26 Phl. . . radice nodoſâ. Gram. nodoſum ſpicâ parvâ. *C. B.*

47 Phl. . . Spicâ ovatâ, caule ramoſo. *Royen.*

28 ALOPECURUS culmo erecto. *Linn.* Gram. typhoïdes ſpicâ auguſtiori. *C. B.*

29 Alop. . . culmo infracto ariſtis glumâ longioribus. *Roy.*

30 PANICUM ſpicâ compoſitâ ariſtis glumâ brevioribus. *Linn.* Pan. vulgare. *Cluſ. Le Panis.*

31 Pan. . . ſpicâ compoſitâ ariſtis ſpicâ longioribus. *Linn.* Panicum vulgare ſpicâ ſimplici & molliori. *T. La Paniſſe.*

32 Pan. . . ſpicis alternis remotis declinatis compoſitis. *Linn.* Pan. vulgare ſpicâ ſimplici aſperiuſculâ. *T.*

33 Pan. . . ſpicis alternis oppoſitiſve linearibus patentiſſimis muticis, floſculis alternatim alterutro pedunculato. *Roy.* Gram. dactylon folio latior. *C. B.* Iſ-

chæmo ſimile : Galli crus. *J. B.*

34 PANICUM paniculâ laxâ flaccidâ, foliorum vaginis pubeſcentibus. *Linn.* Milium. *J. B. le Millet.*

35 MILIUM floribus diſperſis. *Linn.* Miliaceum. Gramen. *Lobel.* ic. 3.

36 MELICA floribus ſub culmo pendulis. L*inn.* Gram. montanum avenaceum locuſtis rubris. *C. B.* Petalis imberbibus.

37 Mel... petalis exterioribus ciliatis. Gram. avenaceum montanum lanuginoſum. *C.* B.

38 ORYZA. *C. B.* Le *Ris. A Perpignan.*

39 NARDUS ſpicâ tereti, foliis denſo-faſciculatis. Nardus ſpuria Gangitis. *Dalech. A l'Eſperou.*

40 SECALE *J.* B. *Seigle.* Valvula exterior ciliata, ariſtata..

41 ANTHOXANTHUM floſculis diandris. L*inn.* Gram. ſpicatum pratenſe ſpicâ flaveſcente. C.B.

42 AGROSTIS paniculâ compreſsâ calycibus ſubulatis æqualibus hiſpidiuſculis coloratis. *Roy.* Gram. montan. paniculâ ſpadiceâ delicatiori. C. B.

43 Agr. . . culmo repente, vaginâ ſupremi folii ventricoſa. *Roy.* Glumæ calycis denticulis aſperæ, panicula purpurea.

44 Agr... petalo exteriore ariſtam rectam, ſtrictam & longam exſerente. *R.* Gram. capillatum. *J.* B.

45 Agr... floſculis gemellis altero ſterili, terminatricibus ternis. Gram. paniculatum latifolium locuſtis craſſioribus ſemine nigro Aquilegiæ ſimili. *T.*

B. *DYGINA COMPOSITA.*

46 AIRA floſculo maſculino ariſtato, fæminino mutico. *Linn.* Gram. pratenſe paniculatum molle. *C. B.*

47 Aira foliis ſubulatis, ariſtis è baſi floſculorum tonſilibus floſculo altero pedunculato. *Roy.* Gram. panicul. minimum molle. *H. R. M.*

48 Aira culmo inferiore repente, floſculis muticis calyce longioribus altero pedunculato. *Roy.* Gram. panicul. aquaticum miliaceum. *T.*

49 Aira paniculâ ſpicatâ, floribus muticis pedunculo longioribus glumis acuminatis inæqualibus. *Roy.* Gram. ſpicâ criſtatâ ſubhirſutum. *C. B.*

50 Aira foliis planis paniculâ patento, petalis baſi villoſis ariſtatis, ariſtâ rectâ brevi. *Linn.*

51 Aira foliis ſetaceis, culmis ſubnudis, paniculâ divaricatâ pedunculis flexuoſis. *Linn.* Gram. nemoroſum paniculis albis, capillaceo folio. *C. B.*

52 Aira paniculâ ſpicatâ, floſculorum medio ariſtato, ariſtâ reflexâ. *Linn.* Gram. phalaroides. Lobel. ic.

53 Aira paniculâ rarâ, calycibus fuſcis. Flor. lapp.
Gram. avenaceum capillaceum minoribus plumis. *C. B.*

54 Aira foliis planis, floribus trifloris ariſtatis, floſculo intermedio mutico diandro. *Linn.*

55 POA paniculâ diffuſa, angulis rectis, ſpiculis obtuſis, culmo obliquo compreſſo. *Linn.*

Gr. prat. paniculatum minus. *C. B.*

56 POA paniculâ diffuſâ, ſpiculis trifloris glabris, culmo erecto tereti. *Linn.* Gram. prat. paniculatum majus. *C. B.*

57 Poa paniculâ diffuſâ, ſpiculis quinquefloris baſi pubeſcentibus, culmo erecto tereti. *Linn.* Gr. prat. pan. medium. *C.* B.

. 58 Poa ſpiculis ovatis compreſſis muticis. *Linn.* Gram. pratenſe paniculatum minus. *C. B.*

. 59 Poa paniculâ ramoſâ ſpiculis multifloris. Gram. amoris. *J. B.*

. 60 Poa paniculâ lanceolatâ vix ramoſâ floribus alternis antrorſum verſis. *R.* Gram. minimum Monſpelienſe. *J. B.*

. 61 Poa ſpiculis uno verſu diſpoſitis. *Binn.* Gr. aſperum. *J. B.*

. 62 Poa ſpicis oblongis erectis. *Linn.* Gram. panicul. aquaticum fluitans. *T.*

. 63 ALOPECURUS ſpicâ villoſa oblonga folio involuta. *Queuë de Renard.* Alopecurus major. *Tabun.* Cauda vulpis Monſpel. icon. *Lobel.* An corolle ſit univalvis decidant oculatiores.

. 64 PHALARIS radice perenni. *Roy.* Phalaris bulboſa ſemine albo. *Park.*

. 65 Phal... radice annuâ. *Linn. Graine de Canari.*

66 BRIZA ſpicis ovatis floſculis ſeptemdecim. *Linn.*

. 67 Briza ſpicis ovatis, calyce floſculis breviore. *Linn.* Gramen tremulum majus. *C. B.*

. 68 Briza ſpicis triangularibus calyce floſculis longiore. *Linn.* Gram. tremulum minus locuſtâ deltoide. *Moriſ.*

. 69 CYNOSURUS bracteis pinnatifidis. *Linn.* Gramen criſtatum. *J. B.*

70 CYNOSURUS bracteis pinnato paleaceis cristatis. *Roy.* Gram. aleopecuroides ſpicâ aſperâ. *C. B. A la Mer.*

71 Cyn. . . bracteis integris. *Linn.*

72 LAGURUS ſpicâ ovatâ. *Linn. A Cete.*

73 AVENA calycibus diſpermis, ſeminibus lævibus. *Linn. Avoine. H.*

74 Avena ſeminibus baſi hirſutis. *Linn.* Avena piloſa.

75 Avena paniculâ nutante, calycibus bifloris, altero floſculo ariſtato. *Roy.* Gramen nodoſum avenaceâ paniculâ. *C. B. A Lates.*

76 ARUNDO paniculâ diffuſâ calycibus trifloris. *Roy.* Arundo ſativa. *C. B.*

77 Arundo paniculâ laxâ calycibus ſæpius bifloris, arundo vulgaris ſeu phragmites Dioſcor. *C. B.*

78 Arundo culmo ramoſo. *Linn.* Gramen plumoſum. *Lobel.*

79 BROMUS paniculâ coarctatâ ſpiculis complannatis. *Guettard.* Feſtuca prat. lanuginoſa. *C. B.*

80 Br. . . culmo paniculato ſpicis compreſſis. *Linn.*
Feſtuca Avenacea ſterilis elatior. *C. B.*

81 Br. . . ſeu feſtuca graminea glumis vacuis. *B. C.*

82 Br. . . paniculâ diffuſâ ſpiculis teretibus. *Guettard.*
Gramen Avenaceum dumetor. paniculâ ſparſâ. *Raii.*

83 FESTUCA culmo alternatim ſpicato ſpicis teretibus. *Linn.*
Gramen ſpicâ Brizæ majus. *C. B.*

84 Feſt. . . culmo paniculato ſpicis compreſſo ovatis. *Linn.*

Feſtuca graminea glumis hirſutis. *C. B.*

85 FESTUCA foliis ſetaceis, ſpicis ſolitariis. Gram. ſpicâ brizæ minus. *C. B.*

86 Feſt... ariſtis paniculæ circiter longitudine plumoſis. *Roy.*
Gram. ſpicatum ariſtis pennatis. *T. A Cete.*

87 Feſt... gramineâ effuſâ jubâ. *C. B.*

88 LOLIUM ſpicis ariſtatis radice annuâ. *Linn. Ivraye.*

89 Lol... ſpicis muticis radice perenni. *Linn. Margal.*

90 HORDEUM floſculis omnibus hermaphroditis. *Linn. Orge.* Hordeum Mathiol. & offic.

91 Hord... floſculis lateralibus maſculis muticis. *Linn. Pamoule.*

92 Hord... floſculis lateralibus maſculis ariſtatis. *Linn.* Gram. ſpicatum vulgare ſecalinum. *T.*

93 Hord... floſculis lateralibus maſculis muticis, involucro deſtitutis. Spelta noſtras. *Epautre fauſſe.*

94 TRITICUM raditce annuâ ſpicâ glabrâ ariſtatâ. *Linn.* Involucrum trifloris, floribus ariſtatis, modio maſculo. Triticum aeſtivum. *J. B.*

95 Trit... radice annuâ, ſpicâ muticâ. *Linn. Touzele Raſcalade.*

96 Trit... radice repente foliis viridibus. *Linn. Chien-Dent.* Gram. loliaceum radice repente ſive gram. offic. *T.*

97 Trit... involucris unifloris, floribus ariſtatis, ſpicâ diſtychâ. Hordeum diſtychum ſpicâ nitidâ, zea ſeu briza nuncupatum. *T. Epautre.*

98 Trit... foliis acuminatis pungentibus. *Roy.* Gramen loliaceum radice repente maritimum. *T.*

C. *DICLINA SEU MONICA.*

99 HOLCUS glumis villoſis. *Roy.*

. 100 Holcus glumis glabris *Linn.* Milium indicum. *Math. Sorghi.*

. 101 CENCHRUS ſpicâ ovatâ ſimplici. *Linn.* Gram. ſpicâ ſubrotundâ echinatâ. *C. B.*

. 102 Cenchrus paniculâ ſpicatâ. *Guettard.* Gram. ſpicatum locuſtis echinatis. *C. B.*

. 103 ÆGYLOPS. *Linn.* Feſtuca altera capitulis duris. *C.* B.

. 104 COIX ſeminibus ovatis. *Linn.* Lithoſpermum arundinaceum. *C.B.* Lacryma job. *Cluſ.*

. 105 ZEA. *Linn.* Mays granis aureis. *T. Blé de Turquie.*

. 106 SPARGANIUM foliis aſſurgentibus triangularibus. *Linn.* Sparga. ramoſum. *C. B.*

ORDO III.

Enſifoliæ Caulibus folioſis Nodoſis Monocotyledones, adde Ordo V. Claſſis II.

A. *FOLIIS PLANIS ERECTIS LONGIS.*

. 107 IRIS corollis barbaris caule (floreſcente) foliis longiore multifloro. *Linn.* Iris vulg. germanica ſive ſylveſtris. *C. B.*

. 108 Iris corollis barbatis, foliis caulem uniflorum ſuperantibus.

. 109 Iris corollis barbatis, caule foliorum longitudine unifloro. Iris perpuſila acaulis ferè. *C. B.*

IRIS

110 IRIS corollis barbatis, caule longitudine foliorum multifloro. Iris luteo variegata. *Lobel.*

111 Iris foliis linearibus, corollis imberbibus, fructu hexagono caule ancipiti. *Linn.*

112 Iris foliis enſiformibus corollis imberbibus, petalis internis ſtygmate minoribus. *Linn.* Iris paluſtris lutea. *C. B.*

113 Iris foliis enſiformibus corollis imberbibus, petalis internis longitudine ſtygmatis. Iris fœtidiſſima. *C. B.*

114. GLADIOLUS caule ſimpliciſſimo foliis enſiformibus. *Linn.*

115 ALOE foliis caulinis dentatis amplexicaulibus vaginantibus. L*inn.*

116 Aloë foliis ſpinoſis confertis dentatis vaginantibus ſupernè planis maculatis. L*inn.* Aloë vulgaris. *C. B. Aloes Succotrin.*

117 Aloë fol. canaliculatis trifariam imbricatis caulinis, apice reflexo patulis. *Linn. Aloës en Echutiere.*

118 Aloë fol. canaliculatis trifariam imbricatis radicalibus erectis angulis cartilagineis ternis. L*inn. Aloes Perroquet.*

119 BROMELIA fol. ſpinoſis, fructibus coalitis caulem cingentibus. L*inn. Anànas.*

120. CORDYLINE fol. pungentibus integerrimis. *Roy.* Yuca foliis Aloes. *Boerrhave.*

121 ACORUS. *Linn.*

122 POLIANTHES floribus alternis. *Linn. Tubereuſe.*

123 FRITILLARIA radice rotundà. *Roy.* Racemo nudo terminatrici. *Linn. le Lys de Perſe.*

124 LIRIUM fol. ſparſis corollis campanulatis intùs glabris. Lilium album vulgare. *C. B. le Lys.*

125 LIRIUM fol. ſparſis floribus reflexis, corollis reſolutis. *Linn.* Lilium flor. reflexis anguſtifolium. *C. B. Lys rouge.*

126 ALLIUM foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis. *Linn.* Allium radice oblongâ obductâ reticulo. *Hall.*

127 All. foliis gramineis radice bulboſâ, umbellâ erectâ bulbiferâ, vaginis breviſſimis. *Hall.* All. montanum foliis Narciſſi majus. *C. B.* Allium montanum latifolium maculatum. *C. B.*

128 All... foliis enſiformibus, radice bulbillis ſtipatâ, floribus amplis umbellatis. Moly minus roſeo amplo flore. *B. M.*

129 All... radice lignoſâ tranſverſâ umbellâ erectâ. *Hall.* All. montanum folio Narciſſi minus. *C. B.*

B. *FOLIIS OBLONGIS LANCEOLATO OVALIBUS.*

130 SERAPIAS anguſtifolia tomentoſa floribus herbaceis intùs albis. Hellebor. anguſtifolia pratenſis. C. B.

131 Serapias longifolia floribus magnis paucis purpureis. *Hall.* Damaſonium alpinum. *Lugd.*

Na. Huc jure cypripedia referri poſſunt & orchides quarum folia verè ſunt caulina, & à radice non decurrentia.

132 CONVALLARIA foliis alternis pedunculis pendulis multifloris.
Polygonatum latifolium vulgare. *T. Sceau de Salomon.*

133 Convall... foliis alternis penduculis pendulis unifloris.

Polygonatum latifolium flore majore odoro. C. B.

134 COMMELINA foliis ovato-lanceolatis caule repente glabro petalis duobus majoribus. *Linn.*

135 TRADESCANTIA. *Linn.* Phalangium Virginianum flore cæruleo majori. *T.*

C. *FOLIIS CARINATIS, VEL ANGULOSIS.*

136 IRIS corollis imberbibus, foliis quadragonis. *Linn.*

Hermodactylus folio quadrangulo. *T.*

137 Iris caulefcens foliis margine conniventibus, corollis imberbibus. Xyphium latifolium caule donatum flore cæruleo. *T.*

138 ASPHODELUS caule ſimplici folioſo, foliis trigonis fiſtuloſis. *Linn.* Aſpho. luteus flore & radice. *C. B.*

139 PORRUM radice ambiente tunicatâ oblongâ ſolitariâ. *Linn.*

Porr. commune capitatum. *C. B.* *Poireau.*

140 Porr. . . capitulo bulboſo erecto foliis planis ſubcrenatis vaginis ancipitibus. *Linn.* Flor. Suecica.

141 Porr. . . radice laterali ſolidâ, foliis linearibus, caule erecto, umbellâ ſubgloboſâ. *Roy.* Allium ſphœrico capite folio latiore ſive Scirodopraſum alterum. *C.* B.

142 Porr. . . radice laterali cordatâ ſolidâ, pedunculo revoluto capitulo bulbifero. *Linn.* Alliopraſum caule ſummo circumvoluto, *C.* B. *Rocambole.*

143 Por. radice conoïdeâ, bulbillis innixa, foliis planis.

Por. . . ſylveſtre vinearum. *C. B.* Sciro-

doprafum latifolium ſpontaneum. *Micheli.*

144 PORRUM radice & capite bulbiferis, floſculis longè pedunculatis, foliis ligulatis. Allium bicorne proliferum flore intùs albeſcente cum ſtriâ purpuraſcente externè. *C. B.*

Adde Cæpas, Allia, Porra, Claſſis. I. Ord. I V.

ORDO IV.

Anguſtifoliæ Dicotyledones foliis Linearibus ſeu lineâ Geometricâ non latioribus.

A. *FASCICULATIS ANGUSTISSIMIS.*

145 PINUS foliis geminis primordialibus ſolitariis glabris. *Linn.*
Pinus ſylveſtris. *C. B.* Cono pendulo, nucleis ſtrigoſis. *Hall.*

146 Pin. .. foliis geminis primordialibus ſolitariis ciliatis. *Linn.*
Pinus ſativa. *C. B.*

147 Pin. .. foliis geminis cono erecto nucleis ſtrigoſis nudiſque. *Hall.*

148 Pin. .. foliis quinis cono erecto, nucleo eduli. *Hall.*

149 ABIES foliis faſciculatis obtuſis. *Linn.* Larix. C. B. *Meleſe.*

150 ASPARAGUS foliis ſetaceis caule herbaceo. *Linn.*
Aſpar. Sylveſtris Mathiol. non amarus eſt. *A Lates.*

151 ASPARAGUS foliis filiformibus mollibus caule herbaceo.
Aſpar. ſativa. *C. B.* differà priori ſolâ culturâ.

152 Aſpar. . . maritimus craſſiore folio. *C. B.* Turiones amari ſunt.

153 Aſpar. . . foliis aciformibus pungentibus caule fruticoſo inermi.
Aſpar. foliis acutis. *C. B.* Corruda. *J. Cluſ. Roume counil.*

154 CAMPHOROSMA. *Linn.* Camphorata hirſuta. *C. B.*

155 POLYCNEMUM. *Linn.* Chenopodium humifuſum folio breviori & capillaceo. *T.* Camphorata congener. *C.* B.

156 ALSINE ſegetalis gramineis foliis unum latus pectantibus. *Vaill.* An arenaria.

157 SPERGULA foliis aciformibus denſis, ramis ramoſis ſubnudis alſine ſaxatilis laricis folio flore minore. *H. R. M.*

158 POTAMOGETON foliis ſetaceis parallelis approximatis diſtychis. *Linn.* Potam. gramineum ramoſum. *C.* B.

Na. Lathyris anguſtifoliis folia ſunt digitata.

B. *FOLIIS IMBRICATIS VEL DENSISSIMIS NON FASCICULATIS FRUTICOSÆ.*

159 ABIES foliis ſolitariis apice acuminatis. *Linn.* Abies tenuiori folio fructu deorſum inflexo. *T.*

160 TAMARIX floribus pentandris. *Linn.* Tamarix Narbonenſis. *C.* B.

161 EMPETRUM procumbens. *Linn.* Erica baccifera. *C.* B.

162 CISTUS fruticuloſus procumbens foliis

aciformibus nudis helianthemum tenuifolium glabrum erectum luteo flore. *J. B.* ciſtus humilis ericæ folio luteus erectior *H. R. M.* Nullæ ſtipulæ.

163 CISTUS fruticuloſus procumbens foliis aciformibus nudis, floribus auriculatis. Ciſtus ericæ folio humilior. *C. B. au Capouladou.* Auriculæ à calycis foliolis duobus reflenis.

164 ERICA humilis cortice cinereo arbuti flore. *C.* B. Er. foliis ramuliſque ternis apice floriferis caule procumbente, floribus amplis.

165 Erica juniperifolia denſè fruticans Narbonenſis. *Lobel.* Stamina corollis ovalibus longiora, folio quina ſubverticillato.

166 Erica major floribus herbaceis purpurantibus. *Lobel.* Folio lanceolato lineari oppoſito imbricato; flores uno verſu ramoſi.

167 Erica ſcoparia floribus herbaceis. *Lobel.* Ramuli erecti & folia ſetacea terna verticillata, flores ſeſſiles exigui, ſecundum caules.

168 Erica maxima alba. *C.* B. folia quaterna rami thyrſiflori.

169 FRANKENIA foliis aciformibus congeſtis. Anthyllis perennis ſupina flore purpuraſcente. *D. Niſſole au bas du l'Es ſous Lattes.*

C. *HERACEÆ LINARIÆ FOLIO.*

170 CORIS. *Linn.* Folia ericæ denſa, flores in ſpicam ovalem denſam congeſti.

171 EUPHORBIA inermis foliis linearibus acutis ad umbellam quinis iſocelibus, ad umbellulas ter dichotomas ovato trigonis,

Tithymalus annuus phitruſæ faciæ. *Lobel.*

172 EUPHORBIA inermis foliis ad caulem linearibus obtuſis, ad umbellam denis pluribus ve lineari-lanceolatis, bracteis ſubrotundis tithym. Cypariſſias. *Fuchſ. T.*

173 Euph... inermis foliis ad caulem linearibus, ad umbellam ternis vel quinis lineari-lanceolatis bracteis cordato-lanceolatis tithym. ſeu eſula exigua. *C.* B. variat foliis acutis & obtuſis.

174 Euph... inermis foliis confertis linearibus, ad umbellam ſex pluribus ovatis, bracteis ſemi orbiculatis.

Tithym. foliis pini. *C.* B.

175 Euph... inermis foliis linearibus caulis latitudine, ad umbellam quinis ovalibus, bracteis trigonis pithiuſa dioſc. ex icone petala acute lunulata. *A la Colombiere.*

176 Euph... inermis foliis linearibus, caulis latitudine, ad umbellam quinis, bracteiſe trigonis : *Folia ad umbellam quina linearia.*

Pithiuſa altera.

177 Euph... inermis foliis omnibus, bracteis que linearibus.

Tithym. exiguus erectus. *H. C.* B. Folia ad umbellam terna.

178 Euph. inermis foliis lanceolato-linearibus, involucri univerſalis foliolis quinis ovato-acutis, partialibus ſemi orbiculatis. *Linn.* Tithymalus amygdaloïdes anguſtifolius. *Tab.* Eſula minor. *Dalech.*

179 ANTIRRHINUM foliis linearibus confertis, caule nitido paniculato pedunculis ſpicatis nudis. *Roy. Flores albo-cœrulei.*

Linaria capillaceo folio odora. *C.* B.

180 Anth... foliis linearibus alternis recurvis,

ramis caule brevioribus. *Roy.*
Linaria arvenſis cœrulea. *C.* B. *Vers Cete*

181 ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus confertis caule erecto ſpicis terminatricibus, ſeſſilibus, floribus imbricatis. *Roy.*
Linaria lutea vulgaris. *J.* B.

182 Anti... foliis linearibus acuminatis alternis floribus racemoſis caule diffuſo. *Roy.*
Linaria pumila lutea. *C.* B.

183 RESEDA linariæ folio *C.* B. Seſamoides fructu ſtellato. *T.* *A l'Eſperou.* Reſ. foliis ſparſis ſubulatis.

184 THESIUM floribus ſparſis.
Alchimilla linariæ folio calyce floris albo. *T.* Sanamunda linariæ folio. *Magnol.* Anthyllis montana Lugdunenſium.

185 CHRYSOCOMA calycibus laxis. *Linn.*
Conyza linariæ folio. *T.*
Chryſ. foliis linearibus petiolo ſub flore intumeſcente. *Hall.* *En Automne vers Fontfroide.*

186 GNAPHALIUM caule ramoſo foliis longis & anguſtis glomerulis florum ſubſtratis *Hall.* Filago vulgaris tenuiſſimo folio erecto. *T.*

187 Gnaph. . . caule ramoſo diffuſo floribus confertis terminatricibus. *Linn.* Gnaph. caule ramoſiſſimo diffuſo umbellulis ſeſſilibus fuſcis. *Hall.*
Gnaphalio vulgari ſimilis Bot. Monſp.

188 Gnaph... caule erecto ramoſiſſimo glomerulis florum ad alas longè ſeſſilibus. *Hall.* filago incana floribus per caulem ſparſis. *T.*

189 Gnaph... caule erecto ramoſo foliis breviſſimis, glomerulis ſeſſilibus, diſſitis, propè ſummitates poſitis. *Hall.*

Gnaph.

190 GNAPHALIUM ramis ſpicatis frequentiſſimis alis foliorum inſidentibus. *Haller.* Elychr. ſpicatum. *Magnol. T.*

191 Gnaph. foliis anguſtiſſimis, caule non ramoſo brevi ſpicâ nudâ ſubfuſcâ terminato. *Hall.* Elych. alpinum minimum capillaceo folio *T.*

192 Gnaph. foliis linearibus alternis floribus ſæpiùs ternis terminantibus, ſeſſilibus *Linn.* Elych. ſylveſtre anguſtifolium capitulis conglobatis. *C. B.*

193 Gnaph. foliis peranguſtis confeſtis umbellâ exiguâ luteâ caulem terminante. *Hall.* Elych. ſive ſtoechas citrina anguſtifolia. *C. B.*

194 LINUM perenne foliis anguſtiſſimis calice ariſtato. *Hall.* Linum ſylveſtre anguſtifolium floribus dilutè purpurascentibus. *C. B.* albis. *Lobel.* flores duplo vel triplo calice longiores

195 Linum perenne foliis lanceolatis argutè mucronatis, calice mutico. *Hall.* Linum ſylveſtre cœruleum folio acuto. *C. B.* folia ſunt ſubulata, baſi latiora petala obtuſa calice triplo longiore.

196. LEPIDIUM floribus apetalis diandris *Linn.* Naſturtium foliis imis multifidis, ſummis linearibus peranguſtis. *Hall.* *à Villeneuve.*

197. LYTHRUM floliis linearibus Salicaria minima tenuifolia. *T.* hyſſopifolia minor. *J. B* *à Gramont.*

198. BUPLEURUM gramineo folio, umbellis & calyculis omnium minimis *Hall.* Bupl. foliis linearibus acutis ſeſſilibus. *Linn.* Bupl. anguſtiſſimo folio. *C. B.* folia hîc ſunt linearia.

199. Buple. . . foliis gramineis, calice peculiari quinque folio ariſtato rigido. *Hall.*

Bupl. minimum anguſtifolium. *C.* B. folia linearia.

200 BUPLEURUM foliis linearibus petiolatis, floralibus lanceolatis. Bupl. annuum anguſtiſſimo folio. *T.*

201 ZANNICHELLIA. *Michel. Tab.* 34 *Linn. L'alguette. Au* Lez. Potamogetum capillaceum capitulis ad alas trifidis. *C. B.* folia ſupernè oppoſita, infernè alterna.

202 POTAMOGETON foliis linearibus alternis diſtinctis, infernè vaginantibus. *Linn.* Potam. puſillum fluitans *Boccon.*

203 Potam. . . foliis linearibus alternis remotis. *Roy.* Potam puſillum gramineofolio caule tereti. *Raii.*

204 Potam. . . foliis ſeraceis parallelis approximatis diſtinctis. *Linn.* Potam. gramineum ramoſum. *C. B.*

205 PHYTEUMA foliis linearibus, floribus capitatis. *Linn.* Rapunculus minimus folio tenui gramineo. *J. B.*

206 LITHOSPERMUM ſeminibus lævibus, corollis vix calicem ſuperantibus foliis linearibus. *Roy.* Buglоſſum luteum annuum minimum. *T.*

207 Lithos. . . fruticoſum corollis calyce majoribus, foliis linearibus. hiſpidis. Bugloſſ. frutic. Roriſmarin. folio *T.*

208 EPILOBIUM ſpicatum foliis integerrimis linearibus faſciculatis. *Hall.* Chamoenerium anguſtifolium alpinum flore purpareo. *T.*

ORDO V.

Dicotyledones linifoliæ ſeu foliis ligulatis acutis caule proprio vel lineâ geometricâ latioribus

A HERBACEÆ.

209 CAMPANULA foliis ligulatis vix denticulatis floribus rerminatricibus Camp. arvenſis linifolia. *J. B.*

210 PHYTEUMA foliis linearibus floribus capitatis. *R.* Rapunculus ſpicâ hemiſphæricâ, foliis tenuiſſimis. *Hall.*

211 EUPHORBIA inermis foliis elliptico ligulatis, imbricatis, ad umbellas quinis ovato oblongis, bracteis concavis. Tithym. maritimus. *C. B.*

212 Euph. . . inermis foliis ligulatis patulis, ad umbellam quinis ovato oblongis acutis, bracteis trigonis.
Tithym. Lithoſpermi maris folio. *B. M.* villos facilè deponit.

213 Euph. . . Inermis fruticoſâ, ramis ſiccis pungens, foliis ad umbellas ternis ſæpius ovatis, floribus ſolitariis Tithym. maritimus ſpinoſus. *Herm.*

214 Euph. . . inermis foliis ligulatis ſpinulâ terminatis, ad umbellam duodenis bracteis trigonis ſpinulâ terminatis, Umbella ſimplex folia glauca. *à l'Eſperou.*

215 Euph. . . inermis foliis ligulatis, ad umbellam ovatis decem vel pluribus brac-

teis trigono ovatis. *Folia atrovirentia caule rubro, petala luſulata.*

216 EUPHORBIA inermis foliis ſerratis, ad umbellam trinis cordatis, crenatis. Tithym. ſerratus Monſp. *Lobel.*

217 Euph. . . inermis foliis ſerratis, ad umbellam quinis lanceolatis. Tithim. characias folio ſerrato. *C. B.* variat foliis nunc oppoſitis, nunc verticillatis ternis.

218 Euph. . . inermis foliis ligulatis breviſſimis reflexis ad umbellam cordatis quinis, bracteis cordatis caule ſimpliſſimo; (quandòque unifloro) an varietas Tithym. amigdaloid anguſtifolii. *Tab.* 5.

219 KLEINIA. foliis lanceolatis planis caule levi ventricoſo. *Linn.*

220 SAXIFRAGA foliorum marginibus cartilagine crenatis. *Linn.*

221 ANTIRRHINUM foliis lanceolato linearibus petiolatis calycibus longiſſimis lateralibus. *Linn.* Antirrh. arvenſe minus. *C. B.* flores ſparſi ſeſſiles calyce breviores ſive calcare.

222 Antirrhin. . . calycum foliolis brevibus ovatis, floribus ſpicatis calcare deſtitutis. *Hall.* Antirrh. vulgare *C. B.*

223 Antirrh. . . foliis lanceolatis obtuſis alternis caule diffuſo ramoſiſſimo. *Linn.* flores ſparſi, caudati, folia viſcida Antirrh. arvenſe minus. *T.*

224 CORISPERMUM foliis alternis. *Linn.* Coriſpermum hyſſopifolium Act. Acad. Pariſi. ann. 1712. *à Agde.*

225 POLYGALA foliis lineari - lanceolatis caulibus diffuſis herbaceis. *Linn.* Polygala vulgaris. *T.*

226 POLYGALA foliis lanceolato-linearibus acutis caule erecto. Polygala annua erecta Monſpeliaca. *B. M.*

227 CHENOPODIUM foliis lineari lanceolatis planis, integerrimis. *Linn.* Chenop. linifolio villoſo. *T. Belveder.*

228 POLYGONUM latifolium. *C. B.* item Polig. maritimum. *C. B.* ſtamina quina tantùm numero.

229 Polyg. . . auguſtifolium. *C. B.* variant foliis anguſtis & latis.

230 LITRUM foliis ligulatis alternis. *Linn.* Salicaria hiſſopifolio *T.*

231 CORRIGIOLA caule florum faſciculis terminato. *Linn.* Polygoni vel lini-folia per terram ſparſa. *J. B.*

232 EPILOBIUM foliis lanceolatis ramoſè florens. *Linn.* Epilobium ſpicatum foliis integerrimis linearibus faſciculatis. *Hall.*

233 THLASPI ſiliculis ellipticis foliis lanceolato linearibus integerrimis. Thlaſpi parvum ſexatile flore rubente. *J. B.*

234 LINUM ramis foliiſque alternis lineari-lanceolatis radice annuâ. *Linn.* Linum arvenſe. *C. B.*

235 Lin. . . foliis lineari-lanceolatis, pedunculis bifidis floribus luteis *Lin.* Silveſtre minus luteo flore *C. B. ann. Capouladous.*

236 Lin. . . foliis ramiſque alternis lineari-lanceolatis, radice perenni. *Linn.* Lin. perenne majus cœruleum capitulo majori *Moriſſ.*

237 Lin. . . perenne-foliis lanceolatis argutè mucronatis calyce mutico. *Hall.* Linum ſylveſtre flore cæruleo folio acuto. *C. B.*

238 Lin...foliis aſperis umbellatumluteum. *B.M.* folia ligulata ſubulata, rigida, flores ſo-

liati, ſegmenta calicis ovata.

239 LINUM ſylveſtre anguſtifolium cœruleo amplo flore. *B. M.* foliola calicis acuta, flores in ramis bifidis ſparſi.

240 CYNOGLOSSUM foliis lineari-lanceolatis. *Linn.*

Omphalodes Luſitanica linifolia. *T.*

241 XERANTHEMUM receptaculis paleaceis, ſeminum pappo quinque ſeto. *Linn.* Xeranth. flore ſimplici cœruleo majori *T.*

242 Xeranth. .. capitulis inapertis. *Hall.* Xeranth. incanum flore albo. *T.*

243 RANUNCULUS foliis lanceolato linearibus ſeſſilibus. *Linn.* Ranunc. montanus folio gramineo *T.*

244 ARTEMISIA foliis lanceolato-linearibus alternis integerrimis. *Linn.* Draco herba *Dod. l'Eſtragon.* Abrotanum hortenſe linifolio acriori & odorato. *T.*

245 ACHILLEA foliis lanceolatis dentato-ſerratis denticulis tenuiſſimè ſerratis. *Linn.*

246 Achillea foliis integris minutiſſimè ſarratis. *Vaillant.*

247 CONYZA foliis lineari-lanceolatis, ramiferis majoribus.

Conyza caulibus rubentibus tenuioribus flore luteo nudo. *B. M.*

248 ASTER foliis lanceolatis integerrimis glabris, ramis inequatis, floribus corymboſis. *Linn.* Aſt. maritim. paluſtis cœruleus ſalicis folio *T.* folia lineari-lanceolata.

249 Aſter. foliis linearibus acutis caule corymboſo ramoſiſſimo. *Linn.* Aſter tripolii flore anguſtiſſimo & tenuiſſimo folio. *Moriſſ.*

250 Aſt. .. caule erecto umbellifloro, ramis ſimplicibus foliis ligulatis. Aſter tripolii flo-

re. *T.* caulis fruticoſus flores dilutè cœrulei folia glabra integerrima utrinque acuta. *à Gramont.*

251 ASTER foliis caulinis lineari-lanceolatis, glabris integerrimis ramiferis majoribus, radicalibus oblongis.
Aſter luteus major foliis Succiſæ. *C. B.*

252 ERIGERON foliis lanceolato-linearibus, ramis lateralibus multifloris folioſis. Virga aurea minor foliis glutinoſis & graveolentibus. *T.* folia ramifera majora integerrima ramis floriferis breviora.

253 Eriger... caule ſæpius unifloro, foliis lanceolato linearibus rigidis radice tuberoſâ. Conyza tuberoſa lutea foliis anguſtis & rigidis. *B. M.* Conyza marina *Lug.* odor Olibani, calyx non hirſutus. *A Fontfroide.*

254 Eriger... pedunculis alternis unifloris. *Linn.* Aſter arvenſis cœruleus acris. *T.* folia integerrima lanuginoſa, radicalia lanceolata, caulina ligulata, mollia ſubhirſuta. *Vers Fontfroide en Automne.*

255 Eriger. perunculis unifloris lateralibus calycibus ſquaroſis *H. Upſ.* Virga aurea major foliis glutinoſis & graveolentibus. *Tourn.*

256 Eriger... floribus paniculatis. *Linn.* Virga aurea Virginiana annua Zanoni. Folia lanceolato-linearia.

257 BUPLEURUM alpinum anguſtis nervoſis foliis calyce unifolio levirer inciſo. *Hall.* Bupl. alpinum anguſtifolium medium. *H. B. M.*

258 Bupl... foliis gramineis vaginantibus. Bupleurum annuum anguſtifolium. *B. M.*

259 POTAMOGETUM foliis linearibus ob-

tuſis caule compreſſo. *Linn.* folia emergentia ſunt undulata.

260 POTAMOGETUM foliis lanceolatis alternis undulatis. *Linn.* folia omnia ſunt undulata & ligulata.

261 BUPHTALMUM foliis lineari-lanceolatis integerrimis glabris calycibus nudis. *Linn.* Aſteroides. *T.*

262 CONVOLVULUS foliis lineari-lanceolatis caule ramoſo. *Linn.* Convolvulus linariæ folio. *C. B.* pedunculi terni.

263 Convol. . . foliis lanceolatis obtuſis ſericeis. *Linn.*
Convol. argenteus umbellatus erectus. *T.*

264 CAMPANULA foliis linearibus ſerratis floribus diſſitis longiſſimè petiolatis. *Hall.* Camp. Perſicæ folio. *Cluſ.* colitur flore pleno albo in hortis.

B. *FRUTICOSÆ ET SUBFRUTICOSÆ FOLIIS SUBLANCEOLATIS.*

265 LYCIUM foliis cuneiformibus. *Linn.* Rhamnus ſpinis oblongis cortice albo *Monſpel. C. B.* folia lineari-lanceolata ſæpè obtuſa, & inflexa.
Lyc. foliis linearibus. *Linn.* Lic. Africanum Jaſmini aculeati facie. *Niſſole.*

266 OSYRIS. *Linn.* Caſia Poetica. *Lobel.* caules anguloſi, folia oblongo-linearia.

267 DAPHNE foliis lanceolatis baſi auguſtioribus, racemo nudo terminali. Thymælea linifolio. *C. B.* folia acuminata. *Garou. Cante-Perdrix.*

268 Daph. . . floribus retrandis ſecundùm caules ſimpliſſimos. Thymel. foliis Poligalæ

glabris

glabris *C. B. A la taillade de Gignac.* flores ſparſi non racemoſi, caules palmares indiviſi ex uno ſtipite plurimi. Flores albolutei.

269. DAPHNE floribus ex ſummis ramis eminentibus, folio levi peranguſto *Hall.* flores purpurei odoratiſſimi.

270 Daph. . . humifuſa foliis oblongis, flores ſeſſiles terminales, ſubcingentibus. Cneorum Mathioli. *A l'Eſperou.*

271 Daph. . . floribus ramoſis lateralibus foliis lanceolatis integris (firmis) *Linn.* Thimelæa Laurifolio ſemper virens *T. Laureole male.*

272 Daph. . . floribus ſeſſilibus interfolia ellipſtico-lanceolata, (mollia). *Linn. Laureole femelle. A l'Eſperou.* flores ſpicati.

273 Daph. . . floribus interfolia, folio utrinque hirſuto. *Haller.*

274 AZALÆA maculis ferrugineis ſubtus adſperſa floribus decandris. *Lemonier.* Chamœrhododendros alpina glabra. *T. Aux Pirenées.*

275 ANDROMEDA foliis alternis, lanceolatis, margine reflexis. *Linn.* Ledum paluſtre noſtras Arbuti flore. *Raii.*

276 MYRICA foliis lanceolatis fructu ſicco. *Linn.* Gale frutex odoratus ſeptemtrionalium. *J. B.*

277 SALIX foliis lanceolato-linearis crenulatis ſubtus incanis. Sal. oblongo, incano, anguſto folio, *C. B.*

278 Sal. ramis villoſis foliis lineari-lanceolatis ſubtus tomentoſis. *Royen.* Sal. anguſtis & longiſſimis foliis criſpis ſubtus albicantibus. *J. B.*

279 Sal. . . foliis lanceolato-linearibus ſuperne

rugoſis, inferne incanis. Sal. fragilis *C. B.* caules rubent.

280 SALIX foliis lanceolato-linearibus, ſubtus incanis Sericeis, ſupernè glabris.
Sal. ablongo incano folio. *C. B.* caules rubent.

281 Sal. . . lento vimine & ſquamâ florali flavis, foliis, elliptico-lanceolatis. *Haller.*
Sal. ſativa lutea folio crenato. *C. B.*
Ozier. Amarinier.

282 Sal. . . foliis integris, utrinque hirſutis lanceolatis. *Linn.* Sal. alpina pyrenaica *C. B.*

283 ELEAGNUS foliis lanceolatis. *Royen.* Olea ſylveſtris folio molli incano. *C. B.*

284 OLEA foliis lanceolatis ramis teretiuſculis. *Linn. L'Olivier.* Cujus varietates ſunt ratione coloris & magnitudinis fructûs. Pichouline. Courniau. Amellau. Empoulau. Bouteillan. Mourau. Salierno. Pigale. Verdale. Blancau. Argentale, &c.

285 SOLANUM caule inermi-fruticoſo foliis ovato-lanceolatis integerrimis, floribus ſolitariis. *Linn.* Solan. fruticoſum bacciferum. *C. B.*

286 AMYGDALUS foliorum ſerraturis omnibus acutis. *Linn. Perſica.* Cæſalpin. *Pecher.* variat ratione fructûs unde *Pêché. Pavie. Auberge, Brugnon, &c.*

287 Amygd. . . foliis petiolatis ſerraturis infimis glanduloſis. *Linn.* Amygdalus offic. *Amandier.* variat putamine molli & duro, ſapore dulci & amaro, &c.

288 Amygd. . . foliis petiolatis baſi attenuatis. *Linn.* Amygdal. nana. *T.*

289 SPIRÆA foliis obtuſè lanceolatis ſerratis, floribus duplicatò racemoſis. *Linn.* Spiræa Salicis folio. *T.*

290. MESPILUS aculeata foliis lanceolatis glabris ſerratis. *Pyrachanta. J. B.* Meſp. aculeata Amygdali folio. *T. Buiſſon ardent.* folia ſubovalia Autumno, Vere anguſtiora, baccæ rubræ ex uno pedunculo plures.

291 FAGUS foliis lanceolatis acutè ſerratis. *Linn. Caſtanea.* Cæſalp. *Châteigner* cujus varietates 25. numeravi.

292 DIOSPYROS foliis utimque bicoloribus. *Linn.* Guayacana. *Cluſ. au Labyrinthe du Jardin Royal.*

293 RHAMNUS floribus digynis, aculeis geminatis rectis, foliis ovato-oblongis. *Linn.* Ziziphus. *Dodon. Jujubier. Guindoulier.* folia ferè ovalia ut Paliuro.

294 PUNICA. *Linn. Grenadier. Miougranier.* variat ſtaturâ nanâ & altâ, pulpâ dulci & acidâ, corollâ ſimplici & plenâ.

295 LAURUS foliis lanceolatis venoſis perennantibus, corollis quadrifidis. *L. B. N.* mas. fœmina. Laurus vulgaris. *Cluſ. Laurier commun.*

296 RUSCUS foliis ſupine floriferis ſub folioſo. *Linn.* maſ & fœmina. *Biſlingua Bonifacia. Laurier Alexandrin.*

297 Ruſc. racemo terminatrici. Hermaphroditus. *Linn.* Ruſcoides. *D. Dejuſſieu.*

298 ARBUTUS caule erecto foliis glabris ſerratis. *Linn. Arbouſier.*

299 PADUS glandulis duabus dorſo foliorum innatis. *Linn. Laurocerаſus. T. Laurier-ceriſe.* Laurier-romain. Pro glandulis ſunt ſæpè foveolæ.

300 Pad. . . glandulis duabus baſi foliorum ſubjectis. *Linn.* Padus. Theophraſti. *Dalech.*

Ceraſus racemoſa ſylveſtris fructu non eduli. *T.*

301 PADUS foliis glandulâ deſtitutis. *Linn.* Laurocefarus Luſitanica. *T. Aſarero.*

302 CITRUS petiolis linearibus. *Linn. Le Citronier.* ou *Limonier.* variat ratione fructûs qui ſi ovatus cortice tenui dicitur *Limon* , ſi cortice craſſo , tuberoſus , conoidæus dicitur *Citron.*

303 Citrus petiolis alatis. *Linn.* Aurantium. *T. Oranger.* variat medullâ , acri , dulciâ alter Sinenſis , alter Olyſſiponenſis , corniculatus , ſtriatus , virgatus , &c.

304 CELTIS foliis ovato-lanceolatis ſerratis. *Linn. Micocoulier.*

305 HIBISCUS foliis ovato-lanceolatis ſupernè inciſo-ſerratis. *Linn.*
Ketmia Syrorum quibuſdam *T. Roſe tremiere. Roſe de Cayene.*

306 HERMANNIA fruteſcens foliis lanceolatis obtuſis apice ſerratis. *Linn.*

307 WALTHERIA foliis lanceolatis ſerratis. *Linn.*

308 BUPLEURUM foliis obveſè ovatis in petiolum attenuatis. *Linn.*
Bupl. arboreſcens Salicis folio. *T. Au bord de Lherau à la barque de Gignac.*

309 SPARTIUM ramis oppoſitis , teretibus , apice floriferis , foliis lanceolatis. *Linn.*
Spartium Offic. Geniſta juncea. *J. B.*

310 Spart. . . ramis angulatis racemis lateralibus , foliis lanceolatis. *Royen.*
Spart. alterum monoſpermon ſemine reni ſimili. *C. B.*

311 GENISTA foliis lanceolatis , ramis teretibus ſtriatis. *Linn.* Gen. tinctoria Germa-

nica. C. B. flores ſeſſiles ſpicati, caules erecti. *à Lattes.*

312 GENISTA foliis ovato-lanceolatis, ſpinis in ramis ſeneſcentibus ramoſis. *Haller.* Geniſta-ſpartium minus Anglicum. *T.*

313 Gen... foliis lanceolatis, ſpinis nudis ramoſis multifloris. An à priori diverſum? Geniſta-ſpartium majus ramoſum flore luteo. *T.*

314 Gen... caule nudo ſpinis ramoſis caulinis ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Linn.* Geniſtella ſpinoſa. Rivin. *à l'Eſperou.*

315 CROTALARIA foliis lanceolatis, petiolis ſeſſilibus, caule ſtriato *Linn.*

316 HEDYSARUM foliis ſimplicibus lanceolatis, caule ſpinoſo. *Linn.* Alhagi Maurorum. Rauvolf. unde ſpecies Mannæ effluit.

317 SCORPIURUS. *Linn.* Scorpiodes Bupleuri folio. *T.* herbacea eſt.

C. *HERBACEÆ FOLIIS SUBLANCEOLATIS, FLORIBUS MONOPETALIS.*

318 ECHIUM foliis lingulatis hiſpidis ex ſingulis alis ſpicatum. *Haller. La Viperine.* Ech. vulgare. *C.* B.

319 Ech. caule erecto aſperrimum flore minore. *Haller.* Ech. majus & aſperius flore albo. *C.* B. flore dilute-purpureo *Raii.* flos fermè regularis eſt.

320 Ech... Sylveſtre hirſutum maculatum. *C.* B. caulis erectus rubris nigriſque punctis notatus.

321 Ech... caule ſimplici, foliis caulinis li-

nearibus, floribus ſpicatis lateralibus. *Linn.* Ech. Creticum anguſtifolium rubrum. *C.* B.

322 SYMPHYTUM foliis ligulatis hiſpidis, flore palis deſtituto. *Haller.* Symphyt. Echii folio ampliori, radice rubrâ, flore luteo. *T. à l'Eſperou près du Cabaret.*

323 Symph. foliis ovato-lanceolatis caule alato. *Haller. Grande Conſoude.* Symphytum majus. Offic. variat flore rubello, luteo, radice tuberoſâ, &c.

324 PULMONARIA foliis radicalibus linguiformibus. *Haller.* Pulm. foliis Echii. L*obel.*

325 LYCOPSIS foliis lingulatis ſinuatis cœruleo flore. *Haller.* Bugloſſum ſylveſtre minus. *T.* calyces florum erecti.

326 Lycops. folis lanceolatis, calycibus florum pendulis. L*inn.* Echioides flore pullo. Riv. Pulmonaria orientalis calyce veſicario, foliis Echii, &c. *T.* inveni, à Gignac, & circa Monſpelium, flore ex albo flaveſcente, menſe Majo.

327 LITHOSPERMUM ſeminibus rugoſis, corollis vix calycem ſuperantibus. *Linn.* Lithoſp. arvenſe radice rubrà. *C. B.* flores albi.

328 Lithoſp. foliis ſubtus nervoſis, floribus in alis foliorum exeuntibus. *Haller.* Lithoſp. majus erectum. *C.* B. *Grémil.* ſemine lævi.

329 Lirhoſp. flore magno caule ex apice radices agente. *Haller.* Lith. ſeminibus lævibus corollis calycem multoties ſuperantibus. *Linn.* flores cerulæi. Lithoſp. minus repens latifolium. C. B. *Herbe aux Perles.*

330 Lithoſp. ſeminibus lævibus, corollis vix

calycem ſuperantibus, foliis linearibus. *Roy.* Bugloſſum luteum annuum minimum. *T.* *à Gramont.*

331 LITHOSPERMUM fruticoſum foliis ligulatis. Bugloſſ. fruticoſum Roriſmarini folio. *T.*

332 Lithoſp. procumbens ſeminibus rugoſis foliis hiſpidis radice rubrâ. *Orcanete.* Bugloſſum radice rubrâ, ſeu Anchuſa vugatior. C. B. *à la Font Pompignane.*

333 MYOSOTIS foliis lanceolatis glabris mollibus. Lithoſp. paluſtre minus. *T.* flores cæruleo & flavo mixti.

34 Myoſ. foliorum apicibus calloſis. *Linn.*

335 Myoſ. ſeminum aculeis triglochidibus. *Linn.* Lithoſp. ſeminibus echinatis *H. Cliff.* Cynogloſſum medium. *C.* B. *à St. Martin de Londres près le Caſtel.*

36 ANCHUSA foliis lanceolatis, ſpicis imbricatis ſecundis. *Linn.* Bugloſſum anguſtifolium majus flore cæruleo *C.* B. *Bugloſe.*

37 CERINTHE foliis amplexicaulibus dentibus floris revolutis breviſſimis. *Haller.* Cerinthe quorumdam. *Cluſ.* flos eſt flaveſcens, folia ovali-cordata.

38 Cerinth. foliis amplexicaulibus, floribus profunde quinquefidis *Hall.* Glaſtum montanum *Dalech.*

39 PLUMBAGO foliis amplexi - caulibus. *Linn.* *Malherbe.* Dentellaria. *Rondelet.* Folia obverſe-ovata, glabra, ciliato-ſerrata, calyces hiſpidi.

o CYNOGLOSSUM foliis lanceolatis, corollis calycem æquantibus. *Linn.* Cynogloſſ. vulgare. *T.* *Cynogloſſe.* Flos atropurpureus unicolor. Deeſt Monſpelii.

341 CYNOGLOSSUM folio molli incano, flore cæruleo ſtriis rubris variegato. *Moriſſon.* *Lengue-Cane*. Cyn. creticum latifolium fœtidum. *C.* B. Cyn. vulgare. B. *M.* corolla calyce longior. ſed pauxillum.

342 Cynogl. ſtaminibus corollam æquantibus. *Linn.* Cynogl. montanum marimum. *Coj. à l'Éſperou* , flos unicolor ruber, folia ad baſim anguſta non ſericea.

343 Cynogl. foliis lanceolatis, corollis calyce duplò longioribus. *Royen.*

Cynogl. creticum anguſto argenteo folio. *C.* B. flores diverſi coloris.

344 Cynogl. foliis lineari-lanceolatis glabris. *Linn. H. Upſ.* Omphalodes Luſitanica Linifolio. *T.*

345 ASPERUGO. *Linn.* Aſperugo vulgaris. *T.* folia lanceolata, erecta, crenulata ſæpè quaterna, caule procumbente.

346 JASIONE foliis lanceolato-linearibus obſoletè ſerratis. *Linn.* Rapunculus Scabioſæ capitulo. *C.* B.

347 CAMPANULA foliis & ſpicâ longiſſimis floribus ſeſſilibus in alis congeſtis. H*aller.* Trachelium altiſſimum foliis aſperis anguſtis-floribus parvis. *J.* B.

348 Camp. foliis obtuſis ſerratis hiſpidis-floribus in fauce lanuginoſis. H*aller.* Camp. foliis Echii floribus villoſis. *C.* B. *Aux Capouladous.*

349 Camp. foliis ferè integris, longè lingulatis hiſpidis floribus nutantibus in fauce lanuginoſis. H*aller.* Trachelium montanum. *Lugdun.*

350 Camp. foliis hiſpidis caule unifloro. H*aller.* Camp. ſaxatilis Echii folio flore magno. *T.*

CAMPANULA

351 CAMPANULA floribus lanuginoſis in denſiſſimam ſpicam conicam congeſtis. *Hall.* Echium montanum. *Dalech.*

352 Camp. . . foliis linearibus integerrimis floribus terminantibus, caule erecto, ſimplici. Camp. alpina linifolia cœrulea. B. *C.*

353 Camp. . . calycibus lamellis à tergo quinque notatiſ. *Linn.* Viola mariana. *Dod.*

353 Camp. . . foliis radicalibus lanceolato ovalibus, caulibus reflexis. Camp. radice eſculenta. *C. B.*

354 CONVOLVULUS foliis lanceolatis obtuſis ſericeis. *Linn.*
Convolv. argenteus umbellatus erectus. *T.* & procumbens.

355 Convol. . . Luſitanicus flore cyanæo. Broſſæi. folia ima ſpatulata, cætera anguſta.

356 SAMOLUS. *Linn.* Valerandi. *T. Panſourmen.*

357 VERBASCUM foliis utrimque tomentoſis decurrentibus ſpicâ indiviſâ.
Verb. mas latifolium luteum. *C. B. Boüillon blanc.* Thapſus batbatus. Offic.

358 Verb. . . foliis utrimque tomentoſis decurrentibus ſpicis ramoſis.
Verb. candidum fæmina. *Fuchſii.*

359 Verb. . . foliis decurrentibus ſubtus incanis appendiculatis, pedunculis lateralibus unifloris. Verb. folio ſubrotundo flore Blattariæ. *C. B. A Clermont Lodeve*, folia baſi laciniata, crenata.

360 Verb. . . foliis ovatis crenatis ſubtus tomentoſis, caule angulato. *Linn.*
Verb. nigrum flore ex luteo purpuraſcente. *C. B. à Valene.* Folia omnia petiolata,

duplicatò crenata, caules rubri.

361 VERBASCUM foliis lanceolatis criſpis crenatis incanis, racemo terminatrici.
Verb. pulverulentum flore luteo parvo. *J. B. à Salenove. à St. Loup.*
Verb. foliis cuneiformi-oblongis. *H. Ups.*

362 DIGITALIS foliis calycinis ovatis acuminatis. *Royen.* Digitalis purpurea. *T.* La Gantelée. *à l'Eſperou.* petioli parùm decurrunt; corollæ obtuſæ labio ſuperiori integro. *H. Ups.*

363 Digit. . . foliolis calycinis lanceolatis, corollis acutis, labio ſuperiori bifido. H. *Upſal.* Digit. major lutea vel pallida parvo flore. *C.* B flos luteus non maculoſus. *à l'Eſperou.*

364 Digit. . . foliolis calycinis linearibus acutis, flore venoſo maculoſo. *Haller.*
Digit. lutea magno flore. *C.* B.

365 BISTORTA foliis ovato-oblongis acuminatis. *Linn.* Biſt. major radice minus intortâ. *C.* B. *Biſtorte. à l'Eſperou.* folia ima appendiculata, ſemina triquetrâ. *Hall.*

366 Biſt. . . foliis lanceolatis. *Linn.* Biſt. foliis ad oram nervoſis, imis ovalibus ſummis linearibus, ſemine gigartino, *Haller.* Biſt. minor. *Cluſ.* Gigartum eſt ſemen uvæ viniferæ.

367 PERSICARIA floribus hexandris ſemidigynis. *Linn.* F. Suec. *Hydropiper. Poivre d'eau.* Perſic. âcris ſpicis longis ſtrigoſioribus, vaginis non ciliatis. *Haller.* ſunt vaginæ tenues ad petiola foliorum caulem amplexantes.

368 Perſ. . . florum ſtaminibus quinis, corollam ſuperantibus, ſtylo bifido. *Linn.*

PERSICARIA foliis ſerrâtis ſpicâdenſâ cylindricâ. H*all.* Potamogeon Salicis folio. *C. B.*

369 Perſ. . . floribus hexandris digynis. *Linn.* Perſ. foliis non ſerratis, pene glabris, vaginis florum ciliaribus ſpicis denſioribus. H*aller.* Perſ. mitis non maculoſa flore rubro. Boerhaav.

370 ANTIRRHINUM calicum foliolis brevibus ovatis floribus ſpicatis, calcare deſtitutis H*aller.* corollæ ſunt mammoſæ.

371 Antirrhin. . . foliis linearibus corollis mammâ & calcare deſtitutis. Hanc ſpeciem invenit, ſemel in luco Gramont D. Chaptal Medicinæ Doctor inclytus; quam hybridam non ſecus ac peloriam Linnæi judico.

372 Antirh. . . foliis imis ſpatulatis, ſummis digitatis. Linaria bellidis folio. *T.* *à l'Eſperou.*

373 EUPHORBIA inermis foliis lanceolatis obtuſis, ad umbellam ovalibus ſenis circiter, bracteis connatis. Tithymalus ſylvaticus toto anno folia retinens. *C. B.*

374 Euph. inermis foliis ligulatis lateſcentibus villoſis, ad umbellam quinis ovatis, bracteis lanceolatis obtuſis. Tithym. incanus hirſutus. *B. M.*

375 Euph. . . inermis foliis lanceolatis, ad umbellam obverſè ovatis, ſæpè ſexdecim bracteis connatis. Tith. characias rubens peregrinus. *C. B* Tithym. characias amygdaloides. *C. B.* cum caules non rubent.

376 Euph. . . inermis foliis ligulato-ovalibus, ad umbellam fere denis ellipticis cum acumine, bracteis trigonis obtuſis. Tithym.

myrſinites latifolius. *C. B.* fructus glabri
377 EUPHORBIA inermis foliis ligulatis acutis, ad umbellam octonis obverſe ovatis acuminatis, bracteis ſemicircularibus. Tithym. characias rubens Germanicus. *C. B.* folia glauca, caulis ruber, bracteæ luteæ.
378 Euph. . inermis, foliis lanceolatis, umbellâ univerſali, partialiumque primâ quinquefidis, reliquis bifidis. *C. B.* Tithym. arvenſis latifolius Germanicus. *C. B. à Lattes.* folia caulina amplexi-caulia, ſubſerrata.
379 Euph. . . inermis foliis ſerratis linearibus & ovatis, ad umbellam ternis vel quaternis cordatis, ad umbellulas binis. Tithym. foliis ſerratis. *C.* B.
380 Euph. . . inermis foliis elliptico-ligulatis imbricatis, ad umbellam ſenis cordatis, ad umbellulas binis concavis. Tith. maritimus. *C. B.*
381 Euph. . . fruticoſa foliis ovato-oblongis ad umbellas quaternis vel ternis, ad umbellulas unifloras binis. Tithym. maritimus ſpinoſus. *C.* B.
382 Euph. . . inermis foliis ovali-lanceolatis, ad umbellam quinis cum acceſſorio, ad flores binis. Tithym. myrſinites fructu verrucæ ſimili. *C.* B.
383 Euph. . . inermis foliis caulinis lanceolatis, floralibus latioribus, umbellâ univerſali multifida, partialibus diphyllis dichotomis. *Linn.* Tithim. annuus, erectus, folio oblongo acuminato. *C.* B.
384 Euph. . . inermis foliis lanceolato-linearibus ad umbellam quinis ovato-acutis bracteis ſemi-orbiculatis. Tithymal. amy-

gdaloides anguſtifolius. Tabern. Eſula minor *Dalech.* Tithym. maritimo affinis linariæ folio. *C. B. à l'Eſperou.*

385 STELLERA foliis linearibus corollâ quadrifidâ. *Linn.* Nov. Gen. Paſſerina. Trag. Sanamunda annua Linariæ folio. *B. M.*

D. *HERBACEÆ FOLIIS OBLONGIS FLORIBUS APETALIS.*

386 RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis planis foliis cordato-lanceolatis. *F. S.* Lapath. aquaticum folio cubitali. *C. B. aux foſſés de Manguio vers le Nord.* folia cubito altiora lanceolata, baſi cordata. Radix craſſiſſima tuberoſa.

387 Rum. floribus hermaphroditis, foliis imis elipticis, valvulis integerrimis granulo incumbente auctis. Lapathum androgynum obtuſifolium ſpicâ confertiſſimâ. *Haller.* Lapath. alpinum folio ſubrotundo. *Boerhaav. Rhubarbe des Moines.* Folia ſumma lanceolata, ima ſubcordata, obtuſa. *A Valerogue vers l'Eſperou.* Radix eſt vere lutea.

388 Rum. . . floribus hermaphroditis foliis lanceolatis valvulis dentatis, granulo incumbente auctis. *Linn.* Lapath. folio acuto plano. *C.* B. Oxylapathum. *J. B. Patience, Renebre.* Lapath. folio acuto rubente. *C.* B. & Lapath. pratenſe capite comoſiore. B. *M.*

389 Rum. . . floribus hermaphroditis, valvulis dentatis, foliis ſupra petiolum emarginatis. Lapath. pulchrum Bononienſe ſinuatum. *C.* B. ſpeciem diſtinctam putat. *D. Haller.*

390 RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis dentatis, foliis obtuſis, criſpis. (Haller.) Lapath. vulgare folio obtuſo. *J. B.*

391 Rumen floribus dioicis foliis linearibus haſtatis. Acetoſa lanceolata anguſtifolia *C. B.* hamis maxime divergentibus, ſapore acido, floribus ſpicatis. *A Gramont.*

392 Rum. . . floribus dioicis foliis lanceolato-haſtatis. *Linn.* Acetoſa arvenſis lanceolata *C. B.* folia haſtata, hami divergentes priori affinis eſt. *A l'Eſperou.*

393 Rum. floribus dioicis foliis oblongo-ſagittatis. *Linn.* hami foliorum convergunt & breves ſunt. Acetoſa pratenſis *C. B. Ozeille des Près.*

E. *ANGUSTIFOLIÆ CRUCIFORMES SEU FLORIBUS TETRAPETALIS, TETRADYNAMIS FRUCTIBUS SILICULOSIS.*

394 ALYSSON ramis ſenilibus ſpiniformibus nudis. *Linn.* Alyſſ. fruticoſum aculeatum. *T. A Gange, A St. Guillen entre les Rochers.*

395 Al. foliis lanceolato-linearibus acutis integerrimis caulibus procumbentibus, perennantibus. *Linn. Al.* halimi folio ſempervirens. *T.*

396 Al. . . procumbens annuum foliis lineari-lanceolatis ſubtomentoſis.
Al. halimi anguſto argenteo folio. *T.* in horto creſcit, flores albi ſunt, rami mutant.

397 Al. . . foliis lanceolatis obtuſis incanis caulibus procumbentibus radice perenni. *Linn.* Al. perenne montanum luteum. *T.*

398 ALYSSON caule erecto foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymboſis. *Linn.* Al. fruticoſum incanum. *T.*

399 Al. foliis lanceolatis integris, radicibus caulefcentibus diffuſis, caulibus paniculatis. *Linn.* Alyſſ. Leucoii folio incano flore luteo. *T.*

400 Al. . . incanum Serpilli folio fructu nudo. T. denticuli in ſtaminibus, ſiliculæ orbiculatæ nudæ diſpermæ.

401 THLASPI ſiliculis ellipticis foliis lanceolato-lineâribus integerrimis.
Thl. . . parvum ſexatile flore rubente. *T.* *aux Capouladous, à S. Guillen.*

402 Thl. . . ſiliculis verticaliter cordatis. *Linn.* Burſa Paſtoris major folio non ſinuato. *T.*

403 CLYPEOLA ſiliculis unilocularibus monoſpermis. *Linn.*
Jonthlaſpi minimum ſpicatum lunatum. Col. *annuel.*

404 Clyp. . . perennis ſiliculis bilocularibus ovatis diſpermis. Alyſſ. maritimum. *T.* albi flores.

405 Clyp. annua ſiliculis bilocularibus diſpermis calyce perſiſtente.
Alyſſ. incanum ſerpilli folio minus. *T.* flores lutei, folia lineari-lanceolata.

406 Clyp. . . ſiliculis bilocularibus tetraspermiſ. *Linn.* Alyſſ. incanum Serpilli folio majus. *T.* folia lanceolata.

407 IBERIS foliis linearibus acutis integerrimis. *Linn.* Thlaſpi montanum ſempervirens. *T.*

408 Iber. . . foliis linearibus ſuperne dilatatis

ſerratis. *Linn.* Thlaſpi umbellatum Creticum flore albo odoro minus. *T.* Thlaſpi de Candie. Thl. amarum. Tab. ic.

.409 IBERIS foliis linearibus indiviſis, umbellis hemisphœricis.
Th. Creticum foliis indiviſis ſeu lini amarum. *J. B.* *A Alais*, *A Fleurs violetes.*

410 Iber. . . foliis cuneiformibus obtuſis integerrimis. *Linn.*
Thlaſpidium fruticoſum Leucoii-folio ſemper florens. *T.* Thlaſpi *ou* Taraſpi.

.411 Iber. . . foliis lanceolatis, acutis ſubdentatis floribus racemoſis. *Linn.* Thl. amarum *J. B.*

.412 LEPIDIUM foliis infimis lanceolatis ſerratis, ſummis linearibus integerrimis. *Linn.*
Lepid. gramineo folio. *T.* radicalia folia ſunt ſæpè obtuſa, & pinnulata. *Paſſerage.*

413 COCHLEARIA foliis radicalibus ſubrotundis, caulinis oblongis ſinuatis. *Linn.* Cochl. folio ſubrotundo. *C. B.*

414 Cochl. . . folio cubitali. *T.* Cochl. foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. *Linn.* folia ima ſunt pinnatifida ſed caduca. Raphanus ruſticanus. Armoracia. Offic.

415 ANASTATICA *Linn.* Thlaſp. Roſa Hiericontica dictum. *T.* Roſe de Jericho.

.416 BISCUTELLA ſiliculis orbiculato-didymis à ſtylo dehiſcentibus. *Linn.*
Thlaſpidium Monſpelienſe hieracii folio hirſuto. T. folia aſpera dentata. *La Lunetiere.*

F. *ANGUSTIFOLIÆ FLORIBUS TETRAPETALIS CRUCIFORMIBUS, FRUCTIBUS SILIQUOSIS.*

. 417 CHEIRANTHUS foliis lanceolaris acutis glabris. *Linn.*
Leucoium luteum vulgare. *C. B. Violier, Giroſlier janne.* Keiri Offic.

418 Cheir. . . foliis lanceolatis integerrimis obtuſis incanis. *Linn.*
Leucoium incano folio hortenſe 1-7. *C.* B. *Giroſlier des Jardins.*

. 419 ARABIS foliis lanceolatis petiolatis integerrimis. *Linn.* Turritis vulgaris. Ramoſa. *T.*
Arab. foliis ovatis vix dentatis ſcabris, ad terram confeſtis. H*aller.*

. 420 TURRITIS caule ſimplici, foliis lanceolatis ſubdentatis. glabris.
Turritis. *obel.* folia caulina iſocelia.

421 Turr. . . foliis omnibus dentatis hiſpidis, caulinis amplanicarilibus. *Linn.* Barbarea muralis. *J.* B.

422 SISYMBRIUM foliis lanceolatis dentato-ſerratis. *Linn.*
Heſperis lutea ſiliquis ſtrictiſſimis. *T.*

. 423 Siſymb. . . foliis lanceolatis integris ſerratis. *Linn.* Eruca ſylveſtris minor lutea Burſæ Paſtoris folio. *T.* Folia ſinuata.

. 424 Siſymbr. . . foliis ſimplicibus dentatis ſerratis. *Linn.* Syſimbr. aquaticum raphani folio ſiliquâ breviori. *Tourn.* folia ejuſdem Plantæ mirè variant quotannis.

. 425 Syſimbr. . . foliis imis pinnatifidis, ſummis lineari lanceolatis integris.

Eruca tenuifolia perennis flore luteo. *J. B. Roquette ſauvage.* Folia variant ſecundum tempeſtates.

426 ERYSIMUM ſiliquis in alis foliorum ſeſſilibus. *Linn.* Eriſ. polyceratium. *C. B.* variat foliis ſinuatis. Siliquæ extrorſum recurvæ ſunt.

427 HESPERIS caule ramoſiſſimo foliis lanceolatis ſæpiùs dentatis. *Linn.*
Heſp. ſylveſtris parvo flore. T. flores rebelli. *Derriere le Peirou.* An Cheiranthus ?

428 Heſp. . . caule ſimplici foliis ovato-lanceolatis denticulatis. *Linn. La Juliene, Caſſolette.*
Heſp. hortenſis flore purpureo (albo) *C. B.*

429 Heſp. . . ramoſa procumbens foliis tomentoſis crenatis amplexicaulibus.
Heſperidi alpinæ ſimilis ſuttecta & magna. *J.* B. *A l'Eſperou.*

G. *ANGUSTIFOLIÆ FLORIBUS* TETR*APETALIS, FRUCTIBUS SILIQUOSIS.*

430 ŒNOTHERA foliis lineari-lanceolatis undulatis. *Linn.* Onagra anguſtifolio caule rubro flore minore. *T.*

431 Oen. . . foliis ovato lanceolatis planis. *Linn.* Onagra latifolia. *Tourn. A la Plage, à la montagne près le Vigan.*

432 EPILOBIUM floribus difformibus piſtillo declinato. *Linn.* foliorum nervo eminente orâ leviter ſerratâ. *Haller.* Chamænerium latifolium vulgare. *T. A Sumene.*

433 Epil. . . foliis lanceolatis ſerratis. *Linn.* Chamæn. villoſum magno flore purpuraſcente. *T.*

434 EPILOBIUM foliis lanceolatis petalis biſi-dis. *Linn.* Chamæn. anguſtifolium glabrum. *T.*

435 Epil. foliis ovato oblongis integerrimis. *Linn.* Folia elliptica lævia, obtuſè lanceolata ſuperiora attenuata.

436 Epil. . . foliis lanceolato linearibus denticulatis, imis oppoſitis.
Chamæn. glabrum minus. *T.* caules quadragoni.

437 Epil. ſpicatum, foliis integerrimis linearibus faſciculatis. *Linn.*
Chamæn. Anguſtifolium alpinum flore purpureo. *T.* *A Sumenes.*

438 POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis undulatis. *Linn.*
Potam. ſeu fontinalis criſpa. *J.* B.

439 Potam. . . foliis lanceolatis in petiolos deſinentibus. *Linn.* Id eſt baſi anguſtioribus. *Haller.*

440 Potam. . . foliis oblongo-ovatis petiolatis. *Linn.* Potamog. rotundifolium. *C.* B. folia ovalia natantia.

441 Potam. . . foliis linearibus obtuſis caule compreſſo. *Linn.* folia alterna.
Potam. . . caule compreſſo, folio graminis canini. *Raii.*

442 Potam. . . foliis lineari lanceolatis alternis ſeſſilibus, ſtipulâ latioribus. *Linn.*
Potam. gramineum latifolium. Lœſel. ſſ. Pruſſ.

H. *ANGUSTIFOLIÆ FOLIIS OBLONGIS FLORIBUS ROSACEIS POLIPETALIS.*

443 RANUNCULUS foliis lanceolato-linearibus ſeſſilibus, caule erecto. *Linn.* Ran.

Montanus gramineo folio. *T.*

444 Ranunc. foliis lanceolatis caule erecto. *Linn.*

Ran. longifolius paluſtris major. *C. B.*

445 RANUNCULUS foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Linn.*

Ran. longifolius paluſtris minor. *C.* B.

La Douve, vers la ſource du Lès.

446 Ran. . . foliis ovatis acuminatis amplexicaulibus. *Linn.*

Ran montanus folio plantaginis. *C.* B. *A la Serane, en May.*

447 BUPLEUVRUM. foliis lanceolatis rigidis, radicalibus obtuſis, caulinis acutis. *Linn.* Bupl. folio rigido. T.

448 ERINGIUM foliis radicalibus oblongis inciſis, caule dichotomo, floripus ſeſſilibus. *Linn.*

Eryng. planum minus. *C.* B.

449 SEMPERVIVUM caule inferne nudo lævi ramoſo. *Linn.*

Sedum majus arboreſcens. *J.* B.

450 SEDUM foliis planis caule & pedunculo ramoſis, floribus lateralibus. *Linn.*

Sedum cepæra dictum. T. *Entre Ganges & le Vigan aux Fontaines.*

451 LINUM foliis imis ſpatulatis floribus luteis.

Linum ſylveſtro luteum foliis ſubrotundis. T.

452 SEDUM foliis planiuſculis patentibus ſerratis corymbo terminatrici. *Linn.*

Anacampſeros purpurea. T.

453 Sed. . . foliis ovalibus ſerratis, umbellis ex alis foliorum. *Haller.*

Anacamps. maxima. *J.* B.

454 SEDUM foliis ſpatulatis indiviſis umbellâ terminatrice.
Anacamps. minor rotundiore folio ſemper virens. T.

455 POSTULACA foliis cuneiformibus ſeſſilibus. *Linn.* Poſtulaca ſativa, & ſylveſtris Le *Pourpier.*

456 RHODIOLA *Linn.* Rhodia radix offic.

457 SAGITTARIA foliis ſagittatis (ligulatis.) *Linn.* Sagitta aquatica minor anguſtifolia. *C. B.*

458 PAPAVER foliis ſimplicibus glabris inciſis. *Linn. Pavot des Jardins, Paſſeroſe.*
Papav. hortenſe ſemine albo-Boesh. ſemine nigro, &c.

459 IMPATIENS pedunculis ſolitariis multifloris. *Linn.* Imp. foliis ovatis geniculis caulinis tumentibus. Flax ſuec. *Balſamine jaune.*

460 Impat. . . pedunculis confeſtis unifloris. *Linn. Balſamine ordinaire. Bollomi* Italis.

I. *ANGUSTIFOLIÆ FLORIBUS* *Tetrapetalis cruciformibus, foliis amplexicaulibus*, vel *ſagittatis vulgò* Glaſtifoliæ.

461 MYAGRUM ſiliculis obverſè cordatis ſubſelibus *Linn.*
Myagr. monoſpermum. J-B. Foliis amplexicaulibbus, ſiliculis trilocularibus.

462 Myagr. ſiliculis obverſè ovatis pedunculatis. *Linn.* Alyſſon ſegetum. *T.* Folia ſcabra, ſagittata, leviter dentata *La Cameline.*

463 Myagr. ſiliculis globoſis compreſſis ſcabris. *Linn.*
Myagro ſimilis ſiliquâ rotundâ. *C. B.* ſo-

lia ſagittata, integerrima, incana. Rapiſtrum arvenſe folio auriculato acuto. *T.*

464 COCHLEARIA foliis caulinis cordato-ſagittatis amplexicaulibus. *Linn.* Lepidium annuum *Dalech.* Lepidium glaſtifolium. *C. B.*

465 Cochl... foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. *Linn.* Folia caulina ſeſſilia ſunt. Raphanus ruſticanus. *C.* B. Armoracia.

466 LEPIDIUM foliis lanceolatis amplexicaulibus incanis. *Linn.* Lepid. humile incanum arvenſe. *T.*

467 HESPERIS procumbens ramoſa foliis tomentoſis dentatis amplexi-caulibus. An Heſperidi alpinæ ſimilis ſurrecta & alba. *J. B. à l'Éſperou.*

468 ARABIS foliis amplexicaulibus dentatis caule diffuſo ramoſo. *Royen.* Draba alba ſiliquoſa. *C. B.* An à priori diverſa ſiliquis longis propendentibus.

469 Ar... foliis amplexicaulibus dentatis caule erecto ſimpliciſſimo. *Royen.* Leucoium vernum perenne album majus. *T. A l'Eſperou.*

470 ISATIS. *Linn.* Paſtel. Guéde.

471 THLASPI ſiliculis ſubrotundis, foliis ſagittatis dentatis. *Linn.* Thlaſpi vaccariæ incano-folio majus. *C.* B.

K. *ANGUSTIFOLIÆ FLORIBUS COMPOSITIS FLOSCULOSIS, FOLIIS LATIUSCULIS.*

472 CENTAUREA calycibus ſerratis foliis lanceolatis integerrimis, decurrentibus.

Linn. Cyanus montanus latifolius. *C. B.*

473 CENTAUREA calycibus palmato-ſpinoſis foliis decurrentibus ſpinuloſis emarginato-crenatis. *Linn.* Carduus maritimus caneſcens alato-caule. *T.*

474 Cent... calycibus duplicato-ſpinoſis foliis decurrentibus integris. *Linn.*
Carduus Luſitanicus caneſcens alato caule, capite lanuginoſo. *T.*

475 Cent... calycibus ſquamoſis foliis integerrimis decurrentibus. *Linn.* Orientalis eſt.

476 Cent... calycibus ſpinoſis foliis lanceolatis dentatis. *Linn.*
Carduus jaceæ folio capitulis minoribus, cum ſquammis tricuſpidibus. *C.* B. Variat foliis laciniatis.

477 Cent... calycibus ſquamoſis, foliis lanceolatis, radicalibus ſinuato-dentatis ramis angulatis. *Linn.* Jacea nigra pratenſis latifolia. *C.* B. Rami pentagoni jacea nigra anguſtifolia. *C.* B. Variat foliis ligulatis trinerviis.

478 CARDUUS foliis lanceolatis glabris, integris, ciliatis, decurrentibus, calycibus inermibus. Cirſium foliis non hirſutis floribus compactis. *T.*

479 Card... radice repente, foliis lanceolatis dentatis, margine aculeatis. *Linn.*
Card. vinearum repens ſonchi folio. *C.* B. Vide laciniatas.

480 Card... foliis rigidis, lanceolatis, decurrentibus, molliter ſpinoſis, ſcapo longo paucifloro. *Haller.* Cyrſium ſingularibus capitulis parvis. *T.* Folia ſerrata, virore braſſicæ, caulis prælongus.

481 ONOPORDUM calycibus imbricatis. *Linn.*

Carduus tomentoſus acanthi folio altiſſimus Luſitanicus. *T.*

482 ONOPORDUM foliis tomentoſis, obitc laciniatis, caule alato, brachiato. *Haller.* Onopordum. *Athenei.* Card. tomentoſu acanthi folio vulgaris. *T.* Squamæ calyci ſunt patulæ, in priori verò non, und differt. Variat foliis laciniatis.

483 CARTHAMUS foliis ovatis integris margine aculeatis. *Linn. Safran bâtard.* Carthamus officin. folia radicalia lanceolata.

484 CHRYSANTHEMUM floſculis omnibus hermaphroditis uniformibus. *Linn.* Santolina ſpinoſa foliis agerati. *T.* folia ſpatulata, fere latifoliis accenſenda, acutè crenata. Flores floſculoſi.

. 485 SANTOLINA tomentoſa foliis oblongis integerrimis obtuſis, corymbo terminatrici ramoſo. *Linn.* Gnaphalium maritimum. *C. B. Sur la Plage vers Cette.*

486 Santol. . . caule ſimpliciſſimo foliis ſuperioribus majoribus. *Linn.* Gnaph. roſeum. *C. B.* Filago maritima capite folioſo. *T.*

. 487 GNAPHALIUM ſexubus totâ plantâ diſtinctis. *Haller.* Pes Cati *Le Pié de Chat.* Helichryſum montanum folio rotundiori *T.* Hiſpidula. Variat foliis ſpatulatis longis. Sæpius ad latifolias attinet. *A l'Eſperou*

. 488 CONYZA foliis ovato-lanceolatis floribus lanè umbellatis. *Haller. L'Herbe aux Puces.* Conyza major vulgaris. *C. B.* folia tomentoſa, ſparſa, integerrima.

489 Con. . . foliis ovato-oblongis amplexicaulibus. *Linn.* Conyra latifolia viſcoſa ſuaveolens flore aureo

aureo e Gallo-provinciâ. *T.*

490 ERIGERON foliis undulatis amplexicaulibus. Faun Suecic.
Aſter paluſtris parvo flore globoſo. *T.* Aſter caule ramoſiſſimo, foliis criſpis floribus luteis ſæpe nudis. *Haller.* flores alternatim ſiti ſunt, folia ligulato-lanceolata tomentoſa.

491 CNICUS caule diffuſo foliis dentato ſinuatis *Linn.* Carduus benedictus offic. *Chardon beni.*

492 KLEINIA foliis carnoſis planis ovato-oblongis. *Linn.* Antieuphorbium. *Dodon.* folia alterna obtuſa, tribus lineis glabris exorta, caulis carnoſus. *Antieuphorbe.*

493 TANACETUM foliis ovatis integris ſerratis. *Linn. Mente. Le Coq.*
Tanacetum hortenſe foliis & odore menthæ. *T.*

L. *ANGUSTIFOLIÆ FLORIBUS COMPOSITIS SEMIFLOSCULOSIS.*

494 SONCHUS foliis lanceolato-oblongis, dentatis, floribus glabris fere ſolitariis pedunculis attenuatis. *Linn.* Sonchus anguſtifolius maritimus. *C. B. A la Plage.*

495 Sonch. . . pedunculis calycibuſque hiſpidis, floribus congeſtis. *H. Upſal.*
Sonchus repens, multis Hieracium majus. *J. B.* folia oblonga lanceolata, dentata.

496 CREPIS folio leviter dentato *Vaillant.* Crepis. *Dalech. Terrecrepie.*
Crep. foliis radicalibus ovato-oblongis denticulatis, caulinis lanceolatis amplexicaulibus, pedunculis unifloris ſquamoſis. *Royen.*

497 CREPIS foliis lanceolatis haſtatis ſeſſilibus, inferioribus dentatis. *H. Upſal.*
Hieracium majus Dioſcorid. *Tabern.* 180.

498 PICRIS calycibus imbricatis. *Linn.*
Hieracium aſperum majori flore e limitibus agrorum. *J. B.*
folia mirè ludunt. unde dicta. Picris. calycibus nudis foliis amplexicaulibus ovalibus. *Haller.* caules octogoni hiſpidi.

499 Picr. . . Perianthiis iuvolucro magno cinctis. *H. Upſ.*
Hieracium echioides capitulis cardui benedicti. *T.*
folia hiſpida ima longè lanceolata, ramifera ovata acuta, ſeſſilia.

500 TRAGOPOGON calycibus corollâ brevioribus hiſpidis, foliis integris, caulinis oblongis. Sonchus aſper ſubrotundo folio. *C. B*

501 Trag. . . calycibus florem luteum æquantibus, foliis gramineis.
Tragopog. pratenſe luteum majus. *C. B.*

502 Trag. calycibus florem purpuro-cæruleum ſuperantibus foliis gramineis.
Trapog. purpureo-cæruleum perri folio quod *Artifi* vulgo. *C. B. Sarſifi.*

503 SCORZONERA caule ramoſo foliis amplexicaulibus undulatis. *Linn.* *Scorſonere*
Scorz. latifolia ſinuata. *C. B.*

504 PRÆNANTHES floſculis quinis foliis lanceolatis denticulatis. *Linn.*
Lactuca lævior pannoica purpureo flore. 4 *Cluſ. Hiſt.*

505 LAPSANA calycibus fructûs undique radiis ſubulatis patentibus, foiiis lanceolatis indiviſis. *Linn. H. Upſ.* Rhagadiolus alter. *Cæſalp.* Hieracium ſiliquâ falcata. *C. B.*

506 LAPSANA calycibus pyramidatis, ſeminibus pappoſis, foliis oblongis ſubdentatis, ſcabris. *Linn.* Chondrilla hieracii folio annua. *T.* Hieracioides annua glutinoſa floribus parvis. *vallis* Crepis foliis denticulatis, imis petiolatis obtuſis, ſummis amplexicaulibus obtuſis &c.

507 Lapſ. . . capitulis fructûs ſubgloboſis glabris, ſeminibus diſci calyculato-pappoſis. *Linn.* Hedypnois annua. *T.* folia oblonga dentata, ſuperiora integerrima.

508 HIERACIUM calycibus ſetis longiſſimis diſtantibus patentibus, obvallatis. *Linn.* Hierac. proliferum falcatum. *C. B.* flores ſunt focani ut Impiæ *Dodon.* caules fere nudi. *à Gramont.*

509 Hierac foliis lanceolatolinearibus obſoletè denticulatis ſparſis. *Linn.*
Hierac. caule alto multifolio, multifloro, foliis firmis anguſtis plerumque dentatis. *Hall.* Hierac. fruticoſum anguſtifolium majus. *C. B.*

510 Hier. . . piloſellæ folio erectum majus *C. B.* Piloſella major altera. *Tab.* 17. 197.

511 HYPOCHÆRIS calycibus æqualibus hyſpidis. *Linn.* Achyrophonis fere glaber bellidis glauco dentatoque folio Vaillant.

512 LACTUCA romana longa dulcis. *T. Laitue Romaine.* vide latifolias.

513 ANDRYALA foliis integris. Guettard. Hieracium villoſum Sonchus lanatus. *Dalech.*

I. *ANGUSTIFOLIÆ FLORIBUS COMPOSITIS RADIATIS.*

514 VERBESINA foliis decurrentibus undu-

latis obtuſis *Linn.*
Bidens Indica hieracii folio alato caule. *H. R. M.*
515 DORONICUM foliis lanceolatis denticularis ſubtus tomentoſis caule unifloro. *Linn.* Doron. Helveticum iucanum *C. B* Senecio foliis elliptico-lanceolatis denticulatis ſubtus tomentoſis, caule paucifloro. *Hall.* ex Pyrenæis miſſum videtur Doronicum.
516 Doron. . . foliis lanceolatis alternis dentatis, caulinis amplexicaulibus, caule ramoſo. *Royen.* Jacobæa integro & craſſo hieracii folio *T. A l'Eſperou.* Dor. foliis oblongo lanceolatis ſerratis. *Lemonier.*
517 SOLIDAGO caule obliquo, pedunculis erectis, folioſis ramoſis, foliis lanceolatis integerrimis *Linn.* Virga aurea Maxicana. *C. B.*
518 Solid. . . caule erecto, racemis alternis erectis *Linn. Verge dorée.*
Virga aurea latifolia ſerrata. *C. B. au. Capouladous.*
519 Solid. . . paniculato-corymboſa, racemis reflexis, floribus confertis adſcendentibus, foliis trinerviis ſubſerrato-ſcabris. *Linn.*
Virga aurea anguſtifolia paniculâ ſpecioſâ, Canadenſis, *Pluk.*
520 Solid. . . floribus in ſummitate congeſtis *Haller.*
Virga aurea longo molli & lanceolato folio *T.*
521 Solid. . . caule angulato foliis lanceolatis ſerratis decurrentibus. *Lemonier.*
Conyza montana foliis longioribus ſerratis flore ſulphureo albicante *Ac.* P. R. 1725.

522 SENECIO foliis lanceolatis ſerratis, floralibus ad pedunculum minimis *Linn.* Doria Narbonenſium. *Lobel.* Jacobæa pratenſis altiſſima limonii folio. *T.*

523 Senec... foliis longè ellipticis acutè ſerratis, floribus umbellatis. *Haller.* Jacobæa alpina foliis longioribus ſerratis. *T.* Solidago Sarracenica. *Dod.* *Conſoude Saraſine.*

524 Senec... foliis longiſſime mucronatis ſerratis, ſubtus incanis, floribus umbellatis. *Haller.* Jacobæa paluſtris altiſſima foliis ſerratis. T.

525 Senec... foliis ovato-lanceolatis, ſubtus hirſutis, floribus umbellatis *Haller.* Conſolida Sarracenica major. *Lugdun.*

526 ERIGERON caule ſæpe unifloro calyce ſubhirſuto. *Haller.* Aſter atticus cæruleus major *T.*

527 Eriger... pedunculis alternis unifloris. *Linn.* Aſter arvenſis cæruleus acris T. *Vers Fontfroide en Automne.* Conyza cærulea æcris. *C. B.* Herbacea eſt. foliis ligulatis mollibus, ſubhirſutis integerrimis.

528 Eriger... Pedunculis unifloris lateralibus, calycibus ſquamoſis. *H. Upſ.* Aſter foliis lanceolatis ſerratis, pedunculis ſimplicibus lateralibus unifloris, longitudine folii folioſis *H. Cliff.* Virga aurea major foliis glutinoſis, & graveolentibus. T.

529 INULA foliis (caulinis) ovatis rugoſis, ſubtus tomentoſis. *Linn. Nova Gen.* Aſter omnium maximus Helenium dictus T. *Enula Campana.* offic. folia radicalia longe lanceolata.

530 Inula foliis oblongis caule hirſuto pani-

culato, ſquamis calycinis ſetaceis. *Linn. N. G.* Conyza media aſteris flore luteo vel 3 Dioſc. *C. B.* Aſter pratenſis autumnalis conyzæ folio T.

531 INULA foliis lanceolatis recurvis (obtuſis) ſerrato-ciliatis, floribus ſolitariis *Linn.* N. *G.* Aſter montanus luteus ſalicis glabro folio. *C. B.* Bubonium luteum T*abern.*

532 ASTER foliis lanceolato-linearibus alternis integerrimis, ſemiamplexicaulibus floribus capitatis terminantibus. L*inn. Aſtre de la nouvelle Angleterre* flores ampli purpuroviolacei, caulis hirſutus.

533 Aſt. . . foliis ſemiamplexicaulibus, lanceolatis, ſerratis, ſcabris pedunculis alternis ſæpius unifloris, calycibus diſcum ſuperantibus. L*inn.* Aſter ſerotinus ramoſus alter floribus purpuraſcentibus. *H. R. P Aſtre d'Amerique.*

534 Aſt. . . foliis lanceolato-linearibus medio ſerratis, pedunculis folioſis, caule ramoſo radice perenni. L*inn.* Aſter ſerotinus procerior bellidis ſylveſtris flore. *H. R. P. Aſtre de Virginie.*

535 Aſt. . . foliis ſcabris ellipticis integris, floribus in ſummo caule umbellatis, cæruleis. *Hall.* Aſt. atticus cæruleus vulgaris. *C. B.* calyces laxi, ſquamæ lanceolatæ, folia obtuſa, diſcus luteus, radius cæruleus *aux Capouladous.*

535 Aſt. . . foliis lanceolatis glabris, ramis inæquatis, floribus corymboſis. *Royen. Tripolium.* Aſter maritimus paluſtris ſalicis folio flore cæruleo. T. *à la Mer.*

537 Aſt. . . foliis lanceolatis ſeſſilibus villoſis, caule ſæpius unifloro *Royen.*

Aſter luteus ſive Oculus Chriſti minor *Lug. aux Capouladous.*

538 ASTERcaule supernè ramoſo ampliato, foliis amplexi-caulibus confertis, integris, calycibus laxis terminatis. *Linn.* Aſter Pannonicus lanuginoſus luteus. T.

539 Aſt. . . incanus verbaſci folio villoſo. T. Conyza helenitis mellita incana. *Lobel. vers Caunelles.*

540 BUPHTALMUM calycibus acutè folioſis ramis alternis, foliis lanceolatis amplexicaulibus *Linn.* Aſteriſcus annuus foliis ad florem rigidis. T.

541 Bupht. . . calycibus obtuſè folioſis, ſeſſilibus, in alis ramorum, foliis oblongis obtuſis. *Linn.* Aſter annuus attico luteo ſimilis, foliis ad florem mollibus. *B. M. A Grabels.*

542 Bupht. . . foliis lineari-lanceolatis ſerratis, villoſis, calycibus nudis. *Linn.* Aſter luteus major foliis ſucciſæ. *C. B. A Lattes.*

543 Bupht. . . foliis lineari - lanceolatis integerrimis glabris, calycibus nudis. *Linn.* Aſteroides alpina ſalicis folio. T. *Cor.*

554 CHRYSANTHEMUM foliis imis ſpatulato-lanceolatis, ſerratis, ſummis ligulatis. Bellis montana minor. *J. B. A l'Eſperou.*

545 Chryſ. . . foliis amplexicaulibus oblongis, ſuperne ſerratis, inferne dantatis. *Linn.* Leucanthemum vulgare *C.* B. Bellis montana folio obtuſè crenato C. *B.* varietas eſt.

46 Chriſ. . . foliis ligulatis ſæpius integerrimis Bellis montana gramineo folio. H. *R. M.* Apex ſæpe inciſus. *A l'Eſperou.*

47 Chriſ. . . foliis amplexicaulibus oblongis

dentatis, pedunculis ſubnudis. Chryſanth. ſegetum. *Lobel.* in arvis ſemel inveni juxta Hort. Regium.

548 ACHILLÆA foliis integris minutiſſime ſerratis. *Vaillant.*
Ptarmica vulgaris folio longo ſerrato flore albo. *T. A l'Eſperou.*

549 Ach. . . foliis lanceolatis dentato-ſerratis, denticulis munitiſſime ſerratis. *Linn.*
Ptarmica alpina foliis profundiſſime inciſis. *T.*

550 Ach. . . foliis lanceolatis obtuſis acutè ſerratis. *Linn.*
Ptarmica lutea ſuaveolens. *T.* Ageratum foliis ſerratis. *C. B.*

551 CALENDULA ſeminibus radii cymbiformibus, echinatis, diſci bicornibus. *Linn.*
Calendula *Dod.* Caltha ſylveſtris & hortenſis. *C. B. Le Soucy.*

552 Cal. . . foliis dentatis lanceolatis, pedunculis filiformibus. *H. Upſal.*
Caltha africana flore intus albo, extus violaceo. *T.*

553 OTHONNA foliis lanceolatis integerrimis. *Linn.* folia glauca obtuſa.
Jacobæa africana fruteſcens craſſis & ſucculentis foliis. *Commel.*

554 HELENIA foliis decurrentibus. *Linn.*
Corona ſolis ſalicis folio alato. caule. *T.*

555 XERANTHEMUM receptaculis paleaceis, ſeminum pappo quinqueſeto. *Linn.*
Xer. flore ſimplici purpureo majori. *T.*
Carlinas & Carduos *Vide* inter laciniatas.

CLASSIS

CLASSS IV.

PLANTÆ LATIFOLIÆ FOLIIS SIMPLICIBUS SPARSIS SINE ORDINE.

HUC pertinent omnes plantæ quarum folia ſimplicia ſunt & ſine ordine certo ſecundum caulem & ramos ſparſa, ſive ſejuncta, ſive in faſciculos congeſta, ſive denſe aggeſta, ſed ita lata ut longitudo eorum diſci non excedat triplum latitudinis maximæ, unde ab anguſtifoliis diſcrepant.

ORDO PRIMUS.

Plantæ latifoliæ muſcoſæ, foliis figurâ variis, minimis.

1 HYPNUM repens triangularibus foliis anguſtioribus. *Dillen.*

2 Hiſpn. . . repens triangularibus majoribus foliis. *Dillen. Catal. Jen. p.* 219.

3 Hypn. . . repens triangularibus reflexis foliis. *Dillen.*

4 Hypn. . . repens ſaxatile triangularibus anguſtis foliis prælongum, ramulis ſparſis. *Dillen.*

5 Hypn. . . paluſtre erectum ramulis teretibus foliis ſubrotundis albo virentibus cinctis. *Dillen.*

6 HYPNUM Saxatile erectum, ramulis teretibus, foliis ſubrotundis, ſaturatè virentibus. *Dillen.*

7 Hypn. . . arboreum erectum, fruticuli ſpecie, ramulis compreſſis. *Dillen.*

8 POLYTRICHUM minus foliis mollibus & pellucidis. *Dillen.*

9 Polytrich. . . capſulis ſubrotundis pediculis breviſſimis inſidentibus calyptrâ ſtriatâ.

10 BRIUM erectis longis & acutis, falcatis capitulis, calyptrâ ſubfuſcâ, foliis ſerpilli pellucidis. *Dillen.*

11 Bryum erectis longis & obtuſis capitulis, calyptrâ laxâ conicâ, foliis ſerpilli pellucidis latioribus. *Dillen.*

12 Bryum exiguum erectis parvis ſubrotundis majuſculis capitulis, foliis ſerpilli pellucidis. *Dillen.*

13 Bryum parvum erectis piriformibus majuſculis capitulis foliis ſerpilli pellucidis. *Dillen.*

14 Bryum erectis falcatis capitulis, trichodes, foliolis latiuſculis extantibus, in pilum caneſcentem deſinentibus. *Dillen.*

15 Bryum nitidum foliis ſerpilli pellucidis ob*l*ongis, capitulis cernuis majuſculis è cauliculis novis egredientibus. *Dillen.* Muſcus pal. maj. ſerpilli folio. *T.*

16 Bryum nitidum foliis ſerpilli pellucidis rotundis, capitulis, cernuis majuſculis è cauliculis veteribus, egredientibus. *Dillen.*

17 SPHAGNUM cauliferum & ramoſum paluſtre molle candicans, reflexis ramulis foliolis latioribus. *Dillen.* Muſcus vulgatiſſ. *C. B.*

18 Sphagn. . . cauliferum & ramoſum, ſa-

xatile, hirſutum, vireſcens, capitulis obſcu·e rubris. *Dill.*

19 Sphag. . . acaulon foliis in bulbi formam congeſtis. *Dillen.*

20 MNIUM minus non ramoſum anguſtioribus & pellucidis foliis. *Dill. ſyn.*

21 JUNGERMANIA major altera foliis ſubrotundis tenuiſſime denticulatis *Michel.*

22 Junger. . . ſylvatica minor nigricans. Ruppii.

23 Junger. . . repens foliis bifidis. Muſcus denticulatus minor. *C.* B.

24 FONTINALIS capitulis lateralibus. L*inn.* Fontalis minor lucens. *J. B.*

25 Fontinal. capitulis terminantibus.

26 CENTUNCULUS foliis alternis ovatis. L*inn.* anagallidaſtrum exiguum foliis lanceolatis alternis flore albo fugaci & vix conſpicnuo. *Michel.*Centumculus Ephem.N. Cur.

27 LEMNA foliis lanceolatis, extremis decuſſatis. Lenticula aquatica triſulca. *C. B.* Hederula aquatica. *Lobel.* Icou. 36 Lemna fol. petiolatis. L*inn.* *à* Luuel.

28 LAURENTIA *Michel.* Rapunculus aquaticus repens flore cæruleo inaperto *Raij.* folia lanceolata ſparſa.

ORDO II.

Latifoliæ ſub-lanceolatis vel apice & baſi anguſtioribus foliis.

A FOLIIS PARVIS.

29 GENISTA foliis ovato-lanceolatis ſpinis, in ramis ſeneſcentibus, ramoſis *Haller.* Geniſtella aculeata. *Lobel. ico.* caulis fere nudus.

30 Geniſta foliis confertis ovatis, infernè piloſis, floribus ſeſſilibus ſparſis. *Hall.* Chamægeniſta prima *Cluſ.* Gen. fol. lanceolato obtuſis caule tuberculato. *Royen.* folia ſæpius verticillata. *A Gramont.*

31 Geniſta ramis trianguli-ancipitibus, petiolis decurrentibus, foliis ovato-lanceolatis. *Linn.* Geniſtella herbacea. *T.*

32 EMPETRUM procumbens. *Linn.* Erica folio Corios XI. Cluſ. baccifera.

33 POLYGONUM *Linn.* Haller. Renoüée. variat foliis longioribus.

34 CRESSA. *Linn.* Anthyllis. P. Alpin. *dans les Foſſès de Perauls.* Quamoclit minima humifuſa paluſtris herniariæ folio. *T.*

35 PASSERINA *Lobel.* variat foliis imis lanceolatis cæteris anguſtiſſimis. Stellera foliis linearibus corollis quadrifidis. *Linn.*

36 LINUM ſilveſtre cæruleum folio acuto. *C.B.* variat foliis imis lanceolatis acuminatis.

37 ANTIRRHINUM ſaxatile ſerpilli folio. *C. B.*

38 DRABA caule ramoſo folioſo foliis dentatis. *Linn.* Alyſſon alpinum. Polygoni folioincano. *T. aux Capouladous.* folia viridia glabra.

39 CLYPEOLA foliis lineari-lanceolatis calyce perſiſtente ſiliculis diſpermis bilocularibus. Alyſſum Incanum ſerpilli folio minus. *C. B.* Folia linearia.

40 Clypeola annua ſiliculâ orbiculari emarginatâ, ſtylo brevi. *Hall.*
Clyp. ſilicul. bilocularibus tetraſpermis. *Linn.* Alyſſum incanum luteum ſerpilli folio majus. *T.* folia caulina lanceolata.

41 CAMPANULA foliis imis cordatis, proximis lanceolatis caulinis linearibus.
Camp. vulg. minor foliis imis rotundioribus &c. *Moriſſon. à l'Eſperou.*

42 LEPIDIUM foliis inferioribus lanceolatis (ovatis auriculatis ſerratis ſuperioribus linearibus integerrimis. *Linn.* Lep. gramineo folio *T.*

B *FOLIIS MEDIOCRIBUS FRUTICOSÆ.*

43 SPARTIUM ramis angulatis, racemis lateralibus, foliis lanceolatis. *Royen.*
Spartium alterum monoſpermum ſemine reni ſimili. *C. B.* ſæpius aphyllum.

44 Spart. ramis oppoſitis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis *Linn.* Geniſta juncea. *J. B. A Gramont.*

45 Spart. . . aphyllum fruticoſum, junceis aculeis, lanatis capitulis. *Lobel.*

46 GENISTA ſive Spartium purgans. *J. B.* 1. 404. *Au Cap de Coſte au deſſus du Vigan.* Ramis rigidis tantùm pungit, folia rara

pubeſcentia ut ſiliquæ.

47 GENISTA caule nudo, ſpinis ramoſis caulinis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Royen.* Gen. folio ovato-lanceol. ſpinis in ramis ſeneſcentibus ramoſis. H*all.* Geniſtella. ſpinoſa *Rivini.* foliola lineari aminima aliis intermixta. *à l'Eſperou.*

48 Geniſta foliis lanceolatis, ſpinis nudis multifloris ramoſis.
Geniſta, ſpartium majus ſpinoſum flore luteo. *C.* B. *Argealas. Il ſe trouve partout.*

49 Geniſta foliis lanceolatis, ramis teretibus ſtriatis. *Linn.* G. foliis confertis ovalibus acutis, floribus ſeſſilibus ſpicatis. H*aller.* Geniſta tinctoria Germanica. *C.* B. *à Lattes. La feüille eſt plus étroite.*

50 MYRTUS floribus ſolitariis, calyce fructûs diphyllo. *Linn.* Myrtus communis. Mirte. *Meurtre* Variat foliis quadruplo minoribus.

51 RUSCUS foliis nudis ſupinè floriferis. L*inn.* mas. fæmina Houx frelon verbouiſſet. Bruſcus offic.

52 Ruſcus foliis nudis prone floriferis *Linn.* mas. fæmina. *Laurier alexandrin.*

53 Ruſcus foliis ſupine floriferis ſub foliolo. *Linn.* Hyppogloſſum Biſlingua.

54 PRUNUS inermis foliis lanceolato-ovatis. *Linn. Prunier.* variat fructu nigro, carne dura. P*erdrigon.*
Fructuo vatomagno rubente. *Imperiale rouge.*
Fructu cerei coloris. *Prune de ſainte Catherine.*
Fructu dulci atrocæruleo. *Damas.*
Fructu ovato magno flaveſcente *Imperiale.*
Fructu amygdalino *Rognon de Cocq.*
Fructu oblongo cæruleo. *Prunedatte.*

53 PRUNUS ſpinoſa foliis lanceolatis. *Linn.* *Prunellier.* Acacia noſtras.

54 RHAMNUS ſpinis terminatricibus, floribus quadrifidis. *Linn.*
Fæmina hermaphrod. *Nerprun. Spina cervina.* Folia ovata acuminata, ſerrata, cum ſtipulis filiformibus ſpinæ ramos terminant. *Il eſt tantot Buiſſon tantot Arbriſſeau.*

55 Rhamnus inermis, floribus dioicis, ſtygmate triplici. *Linn.* maſ. hermaphr. *Alaternus.* Cluſ. *Alader.* folia ovalia acuta, vix ſerrata, alterna, trinervia. baccæ rubræ

56 Rhamnus floribus digynis aculeis geminatis rectis, foliis ovato--oblongis. *Linn.* *Ziziphus* offic. *Jujubier. Guindoulier.*

58 VACCINIUM caule angulato foliis ſerratis annuis. *Linn.*
Myrtille. Vitis Idæa. fol oblongis crenatis fructu nigricante. B. *C. Airadſeh. à l'Eſperou. à la Louzere.*

59 Vaccin. . . foliis ovalibus integerrimis deciduis. *Linn.*

60 MESPILUS foliis ovatis integerrimis. *Linn.* meſpil. folio ſubrotundo fructu rubro. *C. B.*

61 Meſpilus foliis lanceolatis integerrimis ſubtus tomentoſis calycibus (fructus) acuminatis. *Linn.* Meſpil. folio laurino non ſerrato *C. B.*

62 Meſpilus ſpinoſa foliis lanceolato-ovatis crenatis, calycibus fructus obtuſis. *Linn.* meſp. ſpinoſa pyrifolio *Boerh.*

63 Meſpilus inermis foliis ovatis ſerraris acutis. *Linn.* fructus niger ſubdulcis. *Amelanchier. Lobel. en Provence.*

64 Meſpilus inermis foliis ovalibus ſuperr crenatis.
Meſp. folio laurino major. *C. B.*

65 QUERCUS foliis oblongo-ovatis intege rimis. *Royen.* Ilex. folio anguſto non ſe rato. *C. B. Yeuſe. Chêne vert.*

66 Querc. . . foliis oblongo-ovatis ſinuat ſpinoſis ſubtus tomentoſis, glandibus p dunculatis. Ilex arbor luci Gramonti *B. M.*

67 Querc. . . foliis ovatis, dentato-ſpinoſis glandibus ſeſſilibus : Ilex aculeata cocc glandifera. *C. B. Avauſſes. l'Inſecte apel Kermes ou Vermillon, s'y attache.* folia utrim que glabra ſunt.

68 Querc. foliis ovato oblongis, indivi ſerraris cortice integro. *Linn.* Ilex oblo go ſerrato folio. *C. B.*

69 Querc. . . foliis ovato-oblongis indivi ſerratis, cortice rimoſo (fungoſo). *Lin* Suber. *J. B. le Liege près de Gramont.*

70 AZALEA ramis diffuſis procumbentibu *Linn.*

71 ARBUTUS caulibus procumbentibus f liis rugoſis ſerratis. *Linn.* Vitis Idæa. Cl 1. ſtuctu nigro. *J. B.* Pilis ex denticu foliorum exeuntibus, bacca atro-c rulæa.

72 Arbutus caulibus procumbentibus fol integerrimis. *Linn.* vulgò *Buxerole.* Uva u Cluſ. *T.* folia Buxi, ſparſa ſæpe obver ovata. Lithontripticum. *à l'Eſperou* bacca bta, intus farinoſa.

73 Arbutus caule erecto, foliis glâbris ſer tis. *Linn. Arbouſier* baccæ granis aſperæ rub

73 CERASU

73 CERASUS foliis ovato-lanceolatis. *Linn.* *Ceriſier.*

Variat fructu rotundo, rubro, acido. *Ceriſier.*

. . . majori. . . . . *Griottier*

magno cordato . . . . . *Bigarrotier.*

Ceraſus foliis ovatis. *Linn. Macaleb.* Geſn. *Mahaleb. Commun dans nos hayes* vulgò *Amarel.*

74 PADUS glandulis duabus baſi foliorum ſubjectis. *Linn. Bois de ſainte Lucie.* Ceraſus racemoſa ſilveſtris. *T.*

75 PYRUS foliis ſerratis pomis baſi concavis. *Linn.* Malus. *T. Pommier.* variat.

Fructu rotundo ex viridi pallaſcente acido-dulci. *Renette.*

Maculis vitreis foris & intus notato. *P. glacée.*

Orbiculato odorato. *P. roſe.*

Magno dilutè rubentè & inodoro. *Calville.*

Splendidè purpureo *P. Dapi.*

Candido, arbore pumilâ. *P. de Paradis.*

Seſſili ſeu ſine pediculo. *Capendu.*

76 Pyrus foliis ſerratis pomis baſi productis. *Linn. Poirier.* variat fructu æſtivo parvo racemoſo, odorato. *Muſcates.*

Parvo è viridi-albo *P. de St. Jean.*

Majori albido *Blanchette.*

Oblongo partim rubro & albido. *Bon chrêtien d'Eté.*

Longo acerbiſſimo. *Etranguillon.*

Fructu autumnali ſeſſili ſaccharato, liqueſcente, *Bergamotte.*

Suavi in ore liqueſcente. *Beurrée.*

Fructu brumali longo è viridi flavo ſaccharato. *Virgouleuse.*

Magno oblongo ferrugineo. *Poire de livre.*

77 Salix foliis ovatis rugoſis , ſubtus tomentoſis , ſupernè dentatis *Royen.* Salix latifolia rotunda. *C.* B.

78 SALIX foliis obſcurè crenatis utrinque villoſis , ovato oblongis *Linn.* Salix latifolia infernè hirſuta. *C.* B.

79 ULMUS fructu membranaceo. *Linn. Ormeau , Orme.*

80 CARPINUS ſquammis ſtrobylorum planis *Linn. Charme Charmille.*

81 FAGUS foliis ovatis undulatis , ſerratis *Linn. Hêtre Fau , à l'Eſperou.*

82 MYXA *Linn.* Sebeſten. *Les Sebeſtes.*

83 EUPHORBIA aculeata triangulatis , ſubnudatis articulata ramis patentibus *Linn.* Angulis inſident duo aculei oppoſiti , & ſupra h os foliolum ovato-lanceolatum , deciduum. Euphorbium verum *Commelin.*

84 EUPHORBIA inermis , foliis breviſſimis ovatis , ad umbellam cordatis quinis , ad flores cordatis binis. Caulis ſimpliſſimus , umbella unica terminatrix , folia ima breviter ligulata , anguſtiora. Floret juxta Aleſiam paſſim an Tithym. amigdaloid. anguſtif. *Tab.*

ORDO III.

Latifoliæ foliis ovatis ſub-triangularibus.

A. *FOLIIS INCISIS VEL CRENATIS.*

85 ALTHÆA foliis ſimplicibus tomentoſis. *Linn.* Althæa. Offic. *la Guimauve à Lattes.*

86 MALOPE foliis ovatis crenatis glabris. *Linn.* Malacoides. *T.*

87 MALVA caule erecto foliis ovatis ſerratis. Malvinda ulmi folia flore luteo. *Dillen.*

88 HIBISCUS foliis ovato-lanceolatis (Rhomboideis) ſupernè inciſo-ſerratis. *Linn.* Ketmia Syrorum. *T. Roſe de Cayene.*

89 POPULUS foliis deltoidibus (ovato triangulis) acuminatis ſerratis. *Linn.* Populus nigra. *C. B. Peuplier noir. Pivoû.*

90 CHENOPODIUM erectum ramoſiſſimum foliis triangulari-dentatis racemis ramoſis caulem ſuperantibus. *Linn.* Chen. pes anſerinus 2. *Tab.* folia leviſſimè ſinuata cordato-triangularia.

91 Chenop. . . foliis ſubtus farinoſis rhomboideis, multis & minoribus dentibus ſerratis. *Hall.* Chen. pes anſerinus 1. Tab. Chen. opuli folio. *Vaill.* folia baſi producta unde à præcedente ut & inciſuris altioribus diſcrepat. racemi conferti caulem ſuperant ; & ſubnudi ſunt.

92 Chenopod. . . foliis inferioribus ovatis

acutis antrorſum dentatis, ſummis lineari-lanceolatis. *Haller.* Attriplex ſilveſtris. *Fuchſ.* Chen. folio ſinuato candicante. *T.* Folia poſticè integra, antrorſum eroſa, racemi erecti.

[·93 ATTRIPLEX caule erecto annuo foliis triangularibus. *Linn.* Attriplex Hortenſis. *C. B. Arroche* Bonne-*Dame. Armol.* folia ſæpè adverſa leviter crenata, unde à Bono Henrico differt.

94 HEDERA foliis lobatis & ovatis. *Linn. Lierre.* vide Palmatas.

95 NICOTIANA foliis ovatis. *Linn.* Nicot. minor. *C. B. Priapeia.* Rondeletii.

96 HYOSCYAMUS foliis amplexicalibus. *Linn.* Hyoſ. vulgaris & niger. *C. B.* folia ſinuato-dentata.

97 Hyoſc. . . foliis petiolatis, floribus ſeſſilibus. *Linn.* Hyoſ. albus major *C.* B.

98 DATURA pericarpiis erectis ovatis *Linn.* Stramonium fructu ſpinoſo oblongo flore albo. *T. Endormie morſie.*

99 Datura pericarpiis nutantibus globoſis. *Linn.* Stram. fr. ſpinoſo rotundo. *C. B.*

100 HIERACIUM caule ramoſo, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulino minore. *Linn.* Hierac. murorum folio piloſiſſimo. *C. B.*

B. *FOLIIS NON INCISIS.*

101 CHENOPODIUM foliis triangulari ſagittatis integerrimis. *Linn.*

102 Chen. . . folio triangulo. *T.* Bonus Henricus. *J. B. Au Cap de Coſte au deſſus du Vigan.*

103 CONVOLVULUS foliis ſagittatis pedunculis unifloris. *Linn.* Conv. minor arvenſis. *C.* B. folia ſunt poſtice haſtata.

104 ANTIRRHINUM foliis alternis haſtatis caule flaccido. *Linn. La Velvote.*.

105 Antirrhinum foliis alternis ovatis, caule flaccido. *Linn. Autre Velvote. Mais les feüilſont ſouvent oppoſées.*

106 RUMEX floribus hermaphroditis geminatis, valvularum alis, maximis reflexis membranaceis. *Linn.* Acetoſa Americana foliis longis pediculis donatis. *C.* B. folia poſtice reſecta, apicè ovalia.

107 Rumex floribus androginis calycibus fructûs uncinatis, foliis ovatis. *Linn.* Beta Cretica ſemine áculeato. *C. B. J.* B.

108 VERONICA foliis alternis ovatis glabris, caule repente ſcapis ſpicatis. Veronica mas repens pyrenaicå folio longiore. *T.* folia vix crenata, flores denſi cærulei.

109 MESENTRYANTHEMUM foliis alternis ovàtis obtuſis undulatis. *Linn.* Meſentr. cryſtallinum plantaginis folio undulato *Dillen. La Glaciale.* noſtra eſt foliis oppoſitis.

C. *FOLIIS IMIS OVATO LANCEOLATIS, ſummis anguſtis.*

110 LAVATERA foliis ovato-lanceolatis inferne augulatis, pedunculis unifloris caule herbaceo. *Linn.* Malva folio vario. *C.* B.

111 ALPERUGO *Linn.* folia erecta ſæpè terna, crenulata.

112 ANCHUSA Scapis diphyllis *Linn.* Bugloſſum latifolium ſempervirens. *C.* B. flores azurei.

113 TOURNEFORTIA foliis ovato-lanceolatis. *Linn.*

114 PULMONARIA foliis radicalibus ovato cordatis. *Linn.* Pulmona. vulgaris macu-

loſo. folio. Cluſ. ſunt ovato-lanceolata folia

115 COCHLEARIA foliis radicalibus lanceolatis, caulinis linearibus. Cochler. perennis ſaxatilis minima. H. R. *M.* inter rupes *aux Capouladous.*

116 ANTIRHINUM foliis lanceolatis obtuſis alternis caule diffuſo ramoſiſſimo. *Linn.* Antirhin. arvenſe miuus. *T.* nectarium breve tenue ut linariæ, folia viſcida.

117 THELIGONUM. *Linn.* Cynocrambe *T. à Frontignan.*

D. *FOLIIS MEDIOCRIBUS HERBACEÆ.*

Folia-lanceolata ovata, fructus in alis ſeſſiles.

118 PARIETARIA foliis lanceolato - ovatis. *Linn. Parietaire.*
Herbe de Notre Dame. variat foliis oppoſitis.

118 CHENOPODIUM foliis triangulari-ovatis. *Linn.* Vulvaria *Tabern.* fœditum eſt foliis farinoſis, glaucis, obtuſè rhomboidæis.

119 Chenopod. . . foliis ovatis integerrimis caule decumbente. *Linn.* Chenop. betæ folio *T.* fol. integra, obtuſè acuminata, racemis per caulem nudis ramoſis. ſtamina elaſtica. caulis quoque erigitur.

120 AMARANTHUS foliis ovatis emarginatis *Linn.* Blittum album majus. Bot. M. Blittum rubrum minus. *Vaillant. & Haller.*

121 Amaranthus capitulis ovato-oblongis lateralibus, foliis ovatis caule erecto. *Linn.* Blittum album majus. *C.* B.

122 Amaranthus floribus triandris, capitulis lareralibus brevibus, foliis lanceolatis longé petiolatis. Blittum rubrum minus *Vaillant.* Bot. Paris. caulis erectus pentagonus.

123 CELOSIA foliis lanceolato - ovatis. *Linn.*

Amaranthus paniculâ ſpecioſâ criſtatâ. *C. B.*

124 AMARANTHUS racemis cylindraceis pendulis longiſſimis. *Linn.*

Amar. maximus *C.* B. variat ſpicis paniculatis, rubris, luteis.

125 Amar. . . inermis racemis cylindraceis erectis. L*inn.* Amar. maximus novæ Angliæ totus viridis. *T.* Variat ſpicis purpureis carneis.

126 Amaranthus capitulis ſubrotundis lateralibus, foliis lanceolatis acuminatis. *Linn.* Amar. tricolor. L*obel.* Tricolor. Symphonia. Plin. Pſitacus. H*eiſter.*

127 Amaranthus racemis cylindraceis erectis, alis ſpinoſis. L*inn.* ſpicâ herbaceâ, vel rubrâ.

127 Amaranthus inermis floribus lateralibus ſeſſilibus confertis foliis ovatis. *Royen.*

128 SOLANUM caule inermi herbaceo foliis ovatis angulatis. L*inn.* folia undulata, caulis lævis quadrangularis. Solanum offic. acinis nigricantibus. variat foliis minus undoſis, baccis rubris, & foliis magis undulatis hirſutis, baccis luteis.

129 Solanum caule inermi perenni flexuoſo foliis ſuperioribus haſtatis. L*inn.* potius appendiculatis, trifidis, cæteris ſimplicibus. Solan ſcandens vel Dulamara. *C. B.* L*a* L*oque.*

130 Solanum foliis ovatis inregerrimis villoſis calycibus aculeatis. L*inn.* Melongena. *T.* Mayene, *Aubergine.* variat fructu oblongo, fructu pyriformi.

131 CAPSICUM caule herbaceo. *Royen. Poivre d'Inde, Corail des Jardins.* variat corniculis rubris, flavis, recurvis, cordiformibus, &c.

132 CAPSICUM caule fruticoſo. *Royen.*

133 PHYSALIS radice perenni foliis lanceolato-cordatis. *Linn.* Alkekengi offic. *T.* Halicacabum. fructus intra veſicam.

134 Phyſalis caule fruticoſo tereti, foliis ovatis integerrimis, floribus confertis. *Royen.* Solanum ſomniferum. *Cluſ.*

135 ATROPA. *Linn.* Belladona. *T.* Solanum. maniacum. *J. B. à l'Orient du Puy de ſaint Loup.* variat foliis adverſis.

136 BOERHAAVIA foliis ovatis. *Linn.*

137 BISTORTA foliis ovato-oblongis acuminatis. *Linn.* Biſt. major radice minus intorta. *C. B.*

138 HESPERIS caule hiſpido ramoſo procumbente. *Linn.* Heſp. montana pallida odoratiſſima. *C. B.* folia lanceolata integerrima, apice anguſtiora.

139 Heſperis caule ſimplici foliis ovato-lanceolatis denticulatis. *Linn.* Heſper. hortenſis flore purpureo (albo) *C. B. La Juliene.*

140 Heſperis caule ramoſiſſimo (procumbente) foliis lanceolatis ſæpius dentatis. *Linn.* Heſp. ſilveſtris parvo flore (rubro.) *C. B. derriere le Peyrou.*

141 CHEIRANTHUS ſiliquarum apicibus tridentatis. *Linn.*

Heſperis maritima latifolia ſiliquâ tricuſpide. *T.*

142 HYOSCYAMUS foliis lanceolatis. *Linn. Juſquiame d'Amerique.*

143 TRICOTIANA foliis lanceolatis. *Linn. Tabac Petun.*

Nicot. major latifolia. *C. B.*

144 VERBASCUM foliis ovatis crenatis ſubtus tomentoſis, caule angulato. *Linn.* Verb.

Nigrum

nigrum flore ex luteo purpurante. *C. B.* ſolia omnia petiolata, bis crenata, caules rubri. *à Valene.*

145 VERBASCUM foliis ovato acutis ſubtus villoſis crenatis, ſpicis laxis lateralibus & terminatricibus. *Linn.* Verb. flore albo parvo. *J. B.*

146 Verbaſ. . . foliis lanceolatis, criſpis, incanis. crenatis, racemo terminatrici. Verbaſc. pulverulentum flore luteo parvo. *J. B.*

147 Verbaſc. . . foliis ſerratis, ſupernè rugoſis pedunculis ramoſis. *Haller.* Verbaſcum. album. 11. Tabern. folia ſupernè nigricant, & flores albi vel pallidè lutei, unde differt à præcedente. atque etiam ſpicæ ſunt ramoſæ.

148 Verbaſc. . . foliis utrimque tomentoſis, obtuſe crenatis, petiolatis, imis baſi pinnatifidis. *à Clermont de Lodeve.* folia lanceolata caneſcentia, flores non vidi.
Vide verbaſcum foliis caulinis decurrentibus inter anguſtifolias.

149 Verbaſc. . . foliis glabris ſerrato-dentatis, radicalibus ſinuatis. *Royen.* Blattaria. *T.* Variat floribus albis & luteis.

150 VIOLA foliis ovato-lanceolatis, caule recto, erecto, ſtipulis dentatis. *Linn.* Viola martia arboreſcens purpurea. *C. B.*

151 CONVOLVULUS foliis ovatis acutis, floribus duplici bracteâ ſuccinctis. *Royen.* *Lizeron de Sicile.*

152 Convol. . . foliis lanceolato-ovatis glabris, caule declinato, floribus ſolitariis. *Linn.* Conv. peregrinus cæruleus folio oblongo. *C. B.* flores medio albi, limbo azurei.

153 CAMPANULA foliis rhomboideis ſerratis, ſpicâ unilaterali, penè nudâ. *Haller.* Campanula drabæ minoris foliis *T.* Symphytum Campanula petroſa 1. *Tab.*

154 Campanula caule angulato, floribus ſeſſilibus, capitulis terminatricibus. *Linn.* Camp. prat. flore conglomerato. *C.* B.

155 Campan. . . foliis cordato-lanceolatis, caule ſimpliciſſimo, floribus ſecundis ſparſis. *Linn.* Camp. maxima floribus latiſſimis. *C. B.*

156 Companula foliis ovatis glabris obſoletè ſerratis, ramis cauli recto appreſſis. *Linn.* Campanula major lacteſcens. *Lob. Pyramidale.*

157 Campanula foliis cordato-lanceolatis, caule ramoſo, floribus ſecundis ſparſis. *Linn.* Camp. hort. rapunculi radice repentè *Boc.* differt à Campanula radice eſculentâ. *T.*

158 ARABIS foliis lanceolatis petiolatis integerrimis. *Linn.*
Turritis vulgaris ramoſa. *T.* folia caulina lineari-lanceolata hirſuta.

159 EPILOBIUM foliis ovatis dentatis. *Linn.* Chamænerium glabrum majus. *T.* folia ovato-lanceolata, leviter hirſuta.

160 Epilobium foliis lanceolatis ſerratis. *Linn.* Chamænerium villoſum magno flore purpureo. *T.* folia ſæpiùs adverſa.

161 Epilobium foliis ovato-oblongis integerrimis. *Linn.* Epil. foliis ellipticis obtuſè lanceolatis, totum læve. *Haller.*

162 ŒNOTHERA foliis ovato-lanceolatis planis. *Linn.* Onagra latifolia. *T.* Virginianam dicit Bauhinus eam tamen inve-

ni juxta mare & juxta urbem *Vigan.* ſolia denticulata, flores lutei.

E. *FOLIIS NERVOSIS GLABRIS.*

163 OPYOGLOSSUM fronde ovatâ. *Linn.* Ophyogloſſ. vulgare *T.* folium unicum.
164 SERAPIAS caule multifolio multifloro. *Linn.* Helleborine latifolia montana *C. B.*
145 CYPRIPEDIUM foliis ovato-lanceolatis. *Linn.* Calceolus T. Petioli amplexi caules.
166 VERATRUM *Linn. Hellebore blanc. Varaire à Louzere.* folia alterna, cæterum Gentianæ luteæ ſimilia. huc pertinent plures *Orchides*, ac *Cypripedia* caule foliis vaginato.
167 SAPONARIA concava Anglica. *T.* variat foliis alternis, flor. monop.
168 CONVALLARIA foliis alternis floribus ex alis. *Linn.* Polygonatum. latifolium vulgare. *C.* B. *Sceau de Salomon, herbe de la Rupture.*

F. *Foliis non Nervoſis Raroglabris.*

169 DORONICUM foliis lanceolatis denticulatis ſubtus tomentoſis caule unifloro *Royen.* Senecio foliis elliptico-lanceolatis denticulatis ſubtus tomentoſis, caule paucifloro *Haller.* Doron Helveticum incanum. *C.* B.
170 Doron. . . foliis ovatis acutis obſoletè dentatis, ramis alternis. *Linn.* Doronic. plantaginis folio. *C. B.*
171 Doron. . . foliis lanceolatis alternis dentatis, caulinis amplexicaulibus caule ramoſo. *Royen.* Senecio foliis petiolatis ellipticis hirſutis, non ſerratis caule unifloro. *Hall.* Jacobæa integro craſſo hieracii folio. *T*

172 INULA foliis ovatis rugoſis ſubtus tomentoſis. *Linn. Enula Campana.* Inula. Plinii. Aſter omnium maximus *Helenium* dictus *T.* caulina folia amplexicaulia.

173 ASTER foliis lanceolatis ſcabris ſemiamplexicaulibus parum ſerratis calycibus laxis ſquamis lanceolatis. *Linn.* Aſter atticus cæruleus vulgaris. *C. B.*

174 Aſter foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſubtus incanis floribus luteis. *Haller.* Aſter luteus hirſuto ſalicis folio. *T.*

175 Aſter incanus verbaſci folio villoſo. *T.* Coniza helenitis mellita incana. *Lobel.* folia ima longè lanceolata, caulina iſocelia ſeſſilia.

176 Aſter foliis lanceolatis, calycibus tomentoſis, floribus luteis vix radiatis ſocaneis. Aſter paluſtris parvo flore globoſo. *T.* Folia lanceolata obtuſa. Coniza minima. *Lobel.* Erigeron foliis undulatis amplexicaulibus. *Linn.*

177 Aſter foliis lanceolatis ſeſſilibus villoſis, caule ſæpius unifloro. *Roy.* Aſter luteus (radio cæruleo) ſive Oculus Chriſti minor. *Lugdun.*

178 Aſter caule ſupernè ramoſo ampliato, foliis amplexicaulibus confertis, integris, calycibus laxis terminatricibus. *Linn.* Aſter Pannonicus lanuginoſus luteus. *T.* folia ima lanceolata petiolata mollia incana hirſuta, flores ampli.

179 GOMPHRENA caule erecto foliis ovato-lanceolatis, capitulis ſolitariis pedunculis aphyllis. *Linn.* Amaranthoides lychnidis folio capitulis purpureis. (aut argenteis). *T.*

180 BOERHAAVIA foliis lanceolatis. *Linn.* ad anguſtifolias.

181 SYSIMBRYUM foliis lanceolatis dentato ſerrrtis. *Linn.*
Heſperis lutea ſiliquis ſtrictiſſimis. *T.* folia omnia uniformia hirſuta. ad anguſtifolias melius attinet ut ſequens.

182 Syſimbrium foliis lanceolatis integris ſerratis. *Linn.* Eruca ſilveſtris minor lutea burſæ paſtoris folio *T. aux Environs.*

183 ERYSIMUM foliis ſerratis, lanceolatis. *Royen.* Heſperis leuncoii folio ſerrato ſiliquâ quadrangulâ. *T.* Ad anguſtifolias.

184 HIERACIUM foliis hirſutis imis lanceolatis dentatis, ramiferis ovatis acutis ſeſſilibus integerrimis. Hierac. villoſum. V. Cluſ. *à l'Eſperou.* Caulis erectus, calycis ſquamæ hirſutæ, imæ patulæ.

185 Hierac. . . foliis radicalibus oblongis hirſutis, ramiferis lanceolato ſeſſilibus raris. Hierac. phlomoides. Taber. Hier. 1. latifol. Cluſ. *aux Capouladous.* Priori valde affinis eſt ſed caulis eſt fere nudus iſti.

186 CARTHAMUS foliis (caulinis) ovatis integris, margine aculeatis. *Linn. Safran bâtard.* folia ima lanceolata.
Carth. foliis lanceolatis acuminatè ſerratis. *Linn.* Cnicus cæruleus aſperior. *T.*

187 LAPSANA calycibus fructûs undique radiis ſubulatis patentibus foliis lanceolatis indiviſis. H. *Upſ.* Rhagadiolus alter Cæſalp.

188 PRÆNANTHES floſculis quinis foliis lanceolatis denticulatis. *Linn.* Lactuca montana purpuro-cærulea minor. *C. B.*

ORDO IV.

Latifoliæ foliis ſubcordatis vel cordato-ſubrotundis.

A. *FRUTICOSÆ.*

• 189 CORYLUS ſtipulis ovatis obtuſis. *Linn.* Corylus ſilveſtris *C.* B. *Coudrier*, *Noiſettier Avellanier.*

190 TILIA. Cœſalp. *Le Tilleul*, *ou Tillau.* Variat folio majore & minore.

• 191 PRUNUS foliis ovato-cordatis. *Linn.* Armeniaca *T.* *Abricotier.* variat fructu Avellanæ magnitudine. fructu Pomi magnitudine atque nucleo dulci, vel amaro.

• 192 PYRUS foliis integerrimis. *Linn.* Cydonia. *T.* *Coignaſſier.* variat fructu pyriformi, & pomiformi, eduli, non eduli. mala cotonea. offic.

• 193 CERCIS foliis cordato-orbiculatis glabris. *Linn.* Arbor Judæ *Raii.* Siliquaſtrum. *T.* *L'Arbre de Judas*, *à la Mauſſon.*

B. *HERBACEÆ.*

194 CONVOLVULUS foliis reniformibus. *Linn.* Convol. maritimus noſtras rotundi folius. *Moriſ.* folia floralia duo oblonga. *à la Plage*

195 CALTHA. *Linn.* Populago. *Tabern.* *A Louzere*,

196 SOLDANELLA. *Linn.* Sold. alpina rotundifolia. *C. B.* folia reniformia ſeptem-nervia.

197 RANUNCULUS foliis cordatis dentatis petiolatis. *Linn.* Chelidonium minus. *Dod.* Ranunc. vernus rotundifolius minor. *T.*

198 RANCULUS foliis radicalibus reniformibus crenatis, caulinis digitatis ſeſſilibus. L*inn.* Ran. nemoroſus folio ſubrotundo. *C.*B.

199 RUMEX folio pedali cordato radicè repente. L*emonnier.* Act. Ac. Lapathum folio rotundo alpinum *J. B. Rhapontic du Mont d'Or.* Lapath. obtuſifolium andogynum ſpicâ confertiſſimâ. H*aller.* folia ima cordato-elliptica, ſumma lanceolata. *à Valrogue.*

200 ARISTOLOCHIA caule infirmo ramoſo foliis cordatis integerrimis longe petiolatis floribus ſolitariis flavis. Ariſtol. longa *Dodon.* Radix napiformis. *à Sette, & ici au Cros d'au* Bi*au.*

201 Ariſtol. . . caule infirmo ramoſo, foliis cordatis integerrimis, floribus ſolitariis erectis. *Linn.* Ariſtolochia rotunda. *J.* B. Flos ex purpura niger, radix ſubgloboſa, caules quadragoni, floris ligulare flexa vulgò *Fauterne.*

202 Ariſtolochia caulibus infirmis, foliis cordato-oblongis undulatis floribus recurvis, ſolitariis, pendulis. L*inn.* Ariiſt. Piſtolochia altera. *J. B.*

203 Ariſtol. . . caule infirmo ramoſo foliis cordatis obſoletè dentatis, floribus ſolitariis erectis. L*inn.* Folia vix petiolata margine pellucide denticulato, radices fibroſæ. Ariſt. piſtolochia dicta. *C. B.*

204 Ariſt. . . caule erecto ſimpliciſſimo, foliis cordatis petiolatis, floribus lateralibus confertis. L*inn.* Ariſt. Clematitis erecta. C B.

205 VIOLA caulibus floriferis adſcendentibus, foliis cordatis. *Linn. Violette* Viola martia inodora ſylveſtris. *C. B.*

206 RUMEX floribus hermaphroditis, caule arboreo foliis ſubcordatis. L*inn.* Acetoſa

arboreſcens ex Inſulis Fortunatis. Plukneti

C. *FOLIIS CORDATO-SUBROTUNDIS E*
Anguloſis.

207 CUCURBITA ſeminibus obſoletè bicornibus. *Linn.*
Cucurbita lagenaria. *T.* foliis cordatis integerrimis variat fructu pyriformi (*Gourde Bouteille*) vel biventri, turbinato luteo vel variegato, vel fructu ovato-oblongo.
Cucurbita longa folio molli flore albo *J. B.* folia cordata ſerrata. fructus cylindricus rectus vel incurvus odor Moſchi in foliis. *Courge longue, Calebaſſe, Trompette.*

208 CUCURBITA ſeminum margine integro tumido *Linn.* Pepo vulgaris. *Raii.* Folia aſpera, cordata, inciſo ſerrata, fructus ovoidæus verrucoſus. *Courge de ſaint Jean.*

209 MELOPEPO compreſſus. *C. B. Potiron.* Sphæra polis compreſſis, meridianis ſulcatis. Sarmentis repit.

210 Melopepo clypeiformis. *C. B. Bonnet d'Electeur, Paſtiſſon.* Non flagella emittit, folia quinque-loba.

211 Melopepo verrucoſus. *T.* fructus Melopeponis compreſſi ſed verrucis exaſperatus, folia venis argenteis notata, integra aſpera. *Barbareſque.*

212 CUCUMIS foliorum angulis rectis. *Linn.* Cuc. ſativus *T. Concombre.* Folia ſeptem nervia, octangularia.

213 Cucumis foliorum angulis rotundatis. *Linn.* Melo vulgaris. *C. B.* folia novem-nervia.

214 ELATERIUM. Officin. Boerhaave. *Concombre ſauvage.* Momordica pomis ovalibus hiſpidis, foliis cordatis integris plicato-dentatis.

dentatis. *Linn.* Cucumis aſininus. *Moriſſ.* Folia ſeptem-nervia ſubtus ſcaberrima. fructus elaſticus.

217 MENISPERMUM foliis peltatis auguloſis. *Linn.*

218 SYCIOS foliis angulatis. *Linn.* Sycioides americana. *T.*

219 LAVATERA foliis ſubcordatis obtuſis, angulatis ſerratis, cauleherbaceo. *Linn.* Lavatera altheæ folio & facie. *T.*

220 ALCEA foliis ſinuato-anguloſis. *Linn.* *Mauve-Roſe. Paſſeroſe.* Malva roſea folio ſubrotundo. *C. B.*

221 TUSSILAGO caule ramoſo. *Linn.* Cacalia foliis cutaneis acutioribus & glabris *T.* latifoliæ foliis cordatis.

222 LUNARIA foliis cordatis. *Linn.* Lunaria major ſiliquâ rotundâ. *C. B.*

223 ERYSIMUM foliis cordatis. *Linn.* *Alliaria. Mathiol.*

224 SIDA foliis ſubrotundo-cordatis acuminatis crenatis. *Linn.* Abutilon. *Dodon.*

225 BORRAGO calicibus tubo corollæ brevioribus. *Linn.* Borrago Conſtantinopolitana flore reflexo cæruleo calyce veſicario. *T.*

226 CERINTHE foliis cordatis ſeſſilibus. *Linn.*
Cerinthe minor flavo flore. T. *à l'Eſperou.*

227 TAMNUS foliis cordatis. *Linn.* Mas & fœmina. folia 5. vel 7. nervia.

228 SMILAX caule anguloſo aculeato, foliis cordato oblongis acutis. *Linn.* mas. Smilax aſpera. T.

229 CONVALLARIA foliis cordatis. *Linn.* Unifolium *Dod.* Smilax unifolia humilli-

ma. T. *A l'Eſperou vers Banahu.* corolla quadrifida, folium caulinum unum vel alterum.

230 PARNASSIA. *Linn.* Gramen Parnaſſi. *C. B.* Parnaſſia paluſtris & vulgaris. T. folium caulinum unicum fere, radicalia plura. *aux Prairies de Banahu à l'Eſperou.*

231 HELXINE caulo volubili. *Linn.* Fagopyrum vulgare ſcandens. T.

232 Helxine caule erecto inermi folis cordato ſagittatis. *Linn.* Fagopyrum erectum. T. *Bled noir. Millet noir.*

233 IPOMŒA foliis cordatis integerimis, limbo floris quinque fido. Quamoclit Americana folio hederæ flore coccineo. *Commêlin.*

234 IPOMÆA foliis cordatis integerrimis, floribus confertis. *Campanette.* Quamoclit Americ. foliis ampliſſimis cordiformibus. *Plumer.* limbus floris integer color violaceus.

235 VERONICA foliis alternis cordatis quinquelobis, floribus ſolitariis. *Linn.* Ver. cymbalariæ folio verna. *T.*

236 Veron. . . foliis cordatis crenatis floribus ſolitariis pedunculatis. *Royen.* Veron. floſculis oblongis pediculis inſidentibus chamædryos folio. *Boerh.*

ORDO VI.

Latifoliæ foliis obversè ovatis vel brevibus ſpatulatis.

237 EUPHORBIA inermis foliis ad caulem ſubhirſutis ellipticis brevibus, ſub floribus binis, cordatis, capſularum mediâ parte verrucoſâ. *Haller.* Tithymalus montanus non acris. *C. B.*

238 Euph. . . inermis fermè acaulis foliis ad caulem ſpatulatis, ad umbellas & ramos dichotomos binis ovatis acuminatis. Peplis minor. *J. B.* rami patuli humifuſi.

239 Euph. . . inermis foliis obverſè ovatis integerrimis, umbellâ univerſali trifidâ, triphyllâ, partialibus dichotomis diphyllis. *Linn.* Tithymalus rotundis foliis non crenatis. *T.*

240 Euph. . . inermis foliis obverſè ovatis crenatis, ad umbellam quinis, ad umbellulas ternis. Tithymalus helioſcopius. *C. B.*

241 SEDUM foliis planiuſculis patentibus ſerratis, corymbo terminatrici. *Linn.* Folia apice elliptica, ſerrata, umbellâ denſiſſimâ. Anacampſeros vulgò Faba craſſa. *T. Orpin.*

242 Sedum foliis planis caule & pedunculo ramoſis, floribus lateralibus, *Linn.* Cepæa. *Cluſ. Au Vigan.*

243 SEDUM foliis ovalibus ſerratis, umbel-
lis ex alis foliorum. *Haller.* Anacampſe-
ros maxima. *J. B.*

244 RHODIOLA. *Linn.* Rhodia radix
Offic.
Anacampſeros radice roſam ſpirante. T
Folia tamen ſublanceolata apice ſer-
rata.

245 BUPLEUVRUM foliis obverſè ovatis
in petiolum attenuatis. *Linn.*
Bupleuv. arboreſcens ſalicis folio. T
Près Gignac.

246 Bupl. foliis lanceolatis rigidis, radica-
libus obtuſis, caulinis acutis. *Linn.* Bu-
pl. folio rigido. *C. B.*

247 GNAPHALIUM ſexubus totâ plant-
diſtinctis. *Haller.* Helycriſum montanum
folio rotundiori flore purpuraſcente. T
Pes Cati. *Pied de Chat. à l'Eſperou.*

Telephium, Chamæſyce Nummulari-
ad pinnatas ſpectant, Mollugo & Por-
tulaea ad verticillatas; Statice ſeu Li-
monia ad ceſpititias.

248 ERINUS *Linn.* Ageratum purpureum
Dalech. folia humifuſa ſpatulata crenu-
lata, caulina anguſtiora, flores rubri
laciniæ petali tres latiores, duæ anguſ-
tiores. *à l'Eſperou, fleurit en Avril.*

249 SAXIFRAGA foliorum orâ cartilagineâ
crenatâ, florum ſpicâ parvâ & albâ
Haller. Sedum ſerratum. *J. B.*

250 AIZOON folis obverſè ovatis. *Linn.* Fi-
coidæa procumbens portulacæ folio Niſ-
ſole.

251 SCROPHULARIA foliis cordatis alter-
nis, pedunculis lateralibus bifloris *Linn.*

Scroph. annua folio urticæ. Boerhaavii.

E *FRUTICOSÆ FOLIIS CORDATIS.*

252 MORUS foliis cordatis hiſpidis. *Linn.* Androgyna. fæmina. Morus fructu nigro *C. B. Meurier noir.*

353 Morus foliis oblique cordatis lævibus. *Linn.* Androgyna. *Linn.* Morus fructu albo. *C. B. Meurier blanc.*

254 Morus foliis cordatis lævibus. Androgyna.
Morus fructu nigro majori. *C. B. Mûrier des Dames.*

255 FICUS foliis cordatis ſubrotundis integerrimis. *Royen.* Ficus nimpheæ folio, vulgò.

F. *FOLIIS CORDATIS SÆPE SESSILIBUS HERBACEÆ.*

256 ASTER foliis amplexicaulibus criſpis ſubtus incanis, luteo flore radiato. *Haller.* Coniza media aſteris flore luteo vel tertia Dioſcor. B. *M.* Aſter pratenſis autumnalis conizæ folio. *T.*

257 BRASSICA campeſtris perfoliata flore luteo *Loes.* Folia non perfoliata ſed amplexicaulia.

258 BUPLEUVRUM foliis ovatis perfoliatis. *Linn. Perceſeüille.*
Perfoliata vulgatiſſima ſive arvenſis *C. B.* folia vere perfoliata, involucro univerſali caret.

259 Bupleuvrum foliis imis petiolatis, ſummis ovatis perfoliatis. *Haller.* Perfoliata

longifolia, *Dalech.* Folia verè caule tranſ-foſſa.

260 LEPIDIUM foliis caulinis pinnato-multifidis ramiferis cordatis amplexicaulibus integerrimis. *Linn.* *Thlaſpi orientale. &c. T.*

261 DRABA caule ramoſiſſimo (ramoſo) foliis cordatis amplexicaulibus dentatis. *Royen.* Alyſſon veronicæ folio. *T.* Siliculæ obliquæ ſtamina quatuor tantùm.

262 CYNOGLOSSUM foliis radicalibus cordatis. *Linn.* Omphalodes pumilata verna ſymphyti folio. *T.*

263 ARCTIUM capitulis & foliorum facie inferiori tomentoſis. H. Lappa minor montana capitulis tomentoſis. *T.*

264 Arctium capitulis glabris minimis. *Haller.* Lappa vulgaris capitulo minore. *C. B.*

265 Arct. . . capitulis glabris majoribus. *Haller.* Lappa major arctium Dioſcor. *T.* *Bardane.*

266 XANTHIUM caule inermi. *Linn.* Xanthium. *Dod. T.*

267 RHEUM foliis glabris. *Linn.* Folia radicalia cordata glabra, nervoſa caulina (quæ nondum vidi) orbiculata vide. ſuprà Rumicem qui Lapathum folio rotundo alpitum. *J. B.* *Rhubarbe des Moines, ou Rhapontic du Mont d'or. A Valerogue.*

268 CAMPANULA caule ſimpliſſimo foliis amplexicaulibus. *Linn.*
Campanula pentagonia perfoliata. *Moriſſon.* Folia cordato-orbiculata.

269 Campanula urticæ foliis oblongis minus aſperis. *C. B.* Campanula caule tereti foliis imis cordatis, ſummis ovatis acutis. flores ſparſi, limbo ciliato.

270 DORONICUM foliis cordatis obtuſis, imis longè petiolatis, ſummis amplexicaulibus. *Haller.* Doronic. radice ſcorpii C. B. *Lugd.* Aconitum pardelianches. *Dod.* Folia tribus nervis eminentioribus donata, radicis ſapor acer. *à l'Eſperou.*

271 Doronicum foliis cordatis denticulatis caule ramoſo. L*inn.*
Doron... maximum foliis caulem amplexantibus. *C.* B. Petioli membranacei, caulem ambiunt, apex folii oblique cordatus. *à l'Eſperou.*

272 CRAMBE foliis cauleque glabris. L*inn.* Folia cordata, criſpa, carnoſa. Kakile maritima ampliori folio *T.* Crambo maritima folio braſſicæ. T.

273 Crambe foliis ſubcordatis crenatis ſcabris. L*inn.* Rapiſtrum maximum rotundifolium monoſpermum. T.

274 SCROPHULARIA foliis cordatis oppoſitis, pedunculis lateralibus ſolitariis multifloris. L*inn.* Folia ſumma alterna, flores lutei.

ORDO V.

Latifoliæ foliis haſtatis vel ſagittatis, quæ ad baſim angulosâ, ſunt non ſub rotunda, unde à cordatis diſcrepant.

275 COCHLEARIA foliis caulinis cordato-ſagittatis amplexicaulibus. *Linn.* Cochl. altiſſima glaſti folio T.

.276 LEPIDIUM foliis ſemi-amplexicaulibus ovatis dentatis. *Linn.* Lep. arvenſe humile incanum. *T.* Radici hærent Gallæ

.277 THLASPI foliis imis petiolatis, reliquis amplexicaulibus cordatis. Thlaſpi arvenſe perfoliatum majus. *C. B.* Siliculis obverſe cordatis.

. 278 Thlaſpi ſiliculis ſubrotundis piloſis, foliis (caulinis) ſagittatis hirſutis *Royen.* Thlaſpi capſulis hirſutis. *J. B.* Capſulis ovalibus.

279 Thlaſpi ſiliculis ſubrotundis, foliis ſagittatis dentatis incanis. *Linn.* Thlaſpi vulgatius. T.

280 ISATIS. *Linn.* Iſatis ſylveſtris. *Dalech.* Le *Paſtel. Glaſtum.* Folia ima oblonga caulina ſagittata. Vide Myagrum inter anguſtifolias ordine. IX.

281 ARABIS foliis caulinis ſeſſilibus ſagittatis integris, imis petiolatis. Turritis. *Lobel.*

Folia

Folia caulina iſocelia, glabra, ima longè lanceolata.

283 TURRITIS foliis omnibus dentatis hiſpidis, caulinis amplexicaulibus, *Linn.* Barbarea muralis. *J.* B.

284 Turritis foliis omnibus glabris ovatis. *Haller.* Turr. foliis caulem ambientibus polyceration. *Boccon.*

285 ANTIRRHINUM foliis alternis haſtatis. *Linn.* *Velvote femelle.* Linaria ſegetum nummulariæ folio aurito & villoſo. *T.*

286 THLASPI ſiliculis obverſè cordatis, foliis imis ſpatulatis, ſummis amplexicaulibus ſagittatis. Burſa Paſtoris montana globulariæ folio. T.

287 CONVOLVULUS foliis ſagittatis poſticè truncatis pedunculis ſimplicibus unifloris. *Linn.* Conv. vulgaris major albus T. *Grand Liſeron.* Bracteæ cordatæ.

288 RUMEX floribus dioicis foliis lanceolato-haſtatis. *Linn.* Mas & fæmina. Acetoſa arvenſis lanceolata. *C.* B. Vide anguſtifolias.

289 Rumex floribus hermaphrodytis foliis ovato-haſtatis. *Linn.* folia ſagittata ramis divergentibus. Acetoſa rotundifolia hortenſis. *C. B. l'Ozeille.*

290 ARUM acaule foliis haſtatis integerrimis, ſpadice clavato *Linn.* Arum foliis ſagittatis cucullo recto. *Haller.* Arum vulgare. *C.* B. *Pié de Veau.* Variat foliis maculatis, & non maculatis.

191 Arum acaule foliis peltatis, baſi ſemibifidis margine integerrimis *Linn.* *Colocaſia* vulgò.

CLASIS V.

Plantæ adverſifoliæ.

FOlia dicuntur adverſa ſi in caule & ramis ſingula ſingulis è diametro ſint oppoſita ; Boerhaavio *Conjugatæ* vocantur. Plantis adverſi foliis accenſemus eas omnes quarum folia non ſolùm ſibi ſunt è diametro oppoſita, ſed etiam ſimplicia, ſeu petiolo indiviſo adhærentia.

Plantæ foliis pinnatis gaudent quidem foliolis ſæpè oppoſitis ſed hæc foliola petiolo diviſo ſeu ramoſo adhærent quocum delabuntur, atque omnia foliola ut plurimum in eodem plano ſunt poſita. In plantis verò adverſifoliis folia tantùm duo combinata ſunt in eodem plano, diverſa verò foliorum paria in diverſis planis ſcilicet altioribus vel depreſſioribus, niſi rami procumbant & ſint humifuſi ut in Nummularia ; adde quod, in erectis, foliorum oppoſitorum paria ſe mutuò decuſſare videantur, ſi deſuper adſpicias.

Adverſifoliæ humifuſæ diſtinguuntur ā pinnatis petioli flexura, ramis aliis erectis & lapſu foliorum ſine ramis ; pinnatæ non foliola ſeorſim ſed cum ſuis petiolis ramoſis ſimul amittunt.

ORDO PRIMUS.

Adverſifoliæ floribus incompletis ſæpiùs apetalis.

1. INCOMPLETI dicuntur flores qui nullam corollam obtinent, niſi calyx coloratus pro corollâ habeatur in quo caſu nullus calyx, vel qui corollam marcidam vix conſpicuam obtinent ut Plantago Euphorbium quas idcircò apetalis plures adſcripſerunt.

A. *INCOMPLETÆ FOLIIS ANGUSTIS.*

2 CORISPERMUM foliis oppoſitis (ſpatulatis). *Linn.* Stellaria aquatica. *Lobel.* Alſine aquis innatans, foliis (caulinis) longiuſculis. *C. B.* Folia emerſa ſubrotunda, immerſa linearia, omnia ſpatulata.

3 Coriſp. . . foliis oppoſitis (capillaceis.) *Dans les Eaux du Gàrdon.* Stellaria foliis omnibus anguſtis apice reſecto. *Haller.*

4 MŒRINGIA pedunculis unifloris. *H. Upſ.*
Alſine tenuifolia muſcoſa. *C.* B. *à Gramont.*

5 Mœring. . . ſcapis bifloris. Fl. Suec.
Alſine verna glabra. *Bot. M.* Eſt tetranthera, ſæpè triſtyla apetala, capſula uni-

locularis ovata. *A Gramont.* primo vere.
. 6 ZANICHELLIA. *Linn. L'Alguette.*
Potamogetum capillaceum capitulis ac
alas trifidis. *C.* B. *Dans les eaux à Sali-
cates.* Folia capillacea, ſumma oppoſita
axillæ floriferæ.
7 NAYAS. *Linn. La Nayade.*
Fluvialis Piſana foliis denticulatis. *J. B*
à Salicate dans le Lez. variat foliis ver-
ticillatis.
8 POTAMOGETON foliis lanceolatis op
poſitis acuminatis. *Royen.* Potam. folii
criſpis conjugatis. *Boerhaav.* Folia ſunt li
gulata, caules erecti in aquis nitidis. Lac
tuca ranarum. C. B. Variat foliis al
ternis.
9 Potamog. . . minus denſis foliis mucro
natis non ſerratis. *B. M.* Fontalis medi
lucens. *J.* B. *à Lattes.* An diverſa?
10 Potamog. . . foliis ſeſſilibus enſiformibu
planis. Potamoget. ramoſum anguſtifolium
J. B.
11 Potamoget. . . foliis ſetaceis parallelis ap
proximatis diſtychis. *Fl. Suec.* Potam
gramineum ramoſum. *C. B. Au ruiſſea
de la Mauſſon.* folia tamen non ſunt acura
tè oppoſita.
12 SCLERANTHUS. calycibus fructûs pa
tulis. *Fl. Suec.* Polycarpum Lugdun. *Da
lech.* I. 373. *A la Sales en Cevenes.* Al
chimilla ſupina gramineo folio minori flor
T. Folia capillacea, ſtamina inter du
& quinque, ſemen unicum.
13 TETRAGONIA foliis linearibus. *Linn*
Tetragonocarpos Africana procumbens hy
ſopifolia. *Niſſole.*

14 SALIX foliis lanceolato - ligulatis oppoſitis ſubtus incanis.
Saule. Salix humilis capitulo ſquammoſo. *C. B.*

15 CUPRESSUS foliis imbricatis erectis (ramis patulis. *Linn.*) Cupreſſ. ramos extra ſe ſpargens. quæ mas. *T.*

16 Cupr. . . foliis imbricatis (& ramis erectis. *Linn.*
Cupr. metâ in faſtigium convoluta, quæ fæmina. *T.*

17 JUNIPERUS foliis infernè adnatis ovatis pungentibus, oppoſitionibus concatenatis *Linn.* Sabina. *Boerhaav.* *Le Savinier. La Sabine.* Folia in caule terna verticillata, in ramulis bina oppoſita, ſubulata.

18 ERICA foliis quadrifariam imbricatis triquetris glabris, erectis, corollis inæqualibus, calyce brevioribus. *Linn.* Erica vulgaris glabra. *C.* B. *Bruyere. Bruſſes.* Corollam habet quidem ſed non labilem.

19 EPHEDRA petiolis oppoſitis amentis geminis. *Linn.*
Ephedra maritima minor. *T. Raiſins de Mer. A la Plage & à Creſſel près Milhau en Rouergue.*

20 VISCUM. *Linn. Le Gui.* Folia ſpatulata anguſta, oppoſita, caules plures bifidi. innaſcitur pyris, quercubus.

21. ATTRIPLEX caule erecto annuo foliis omnibus linearibus integerrimis. *Roy.* Attriplex anguſtiſſimo & longiſſimo folio. *Herm.*

22 Attriplex caule herbaceo valvulis fæmineis ſeminum diſco dentatis. *Fl. Suec.* Attripl. anguſto oblongo folio. *C.* B. folia ſupe-

riora integra, ima in ſolo pingui ſagittata.

23 ATTRIPLEX erecta annua involucris ſeminum haſtatis foliis lanceolato-linearibus. Attr. Monſpeſſulana cum pulchris involucris. *J. B.* folia ſæpius integerrima, fructus ex alis foliorum. mirè ludunt folia atriplicis unde ſpecies diſtinctu difficiles.

24 EUPHORBIA inermis foliis enſiformibus oppoſitis, ad umbellam quaternis. *Catapucia* Officin. *Catapuce. Peberous.* An ſata & exotica ?

25 PLANTAGO caule ramoſo foliis dentatis ſpicis nudis. *H. Upſal.* Pſyllium Dioſcorid. vel Indicum foliis crenatis. *C. B. En Provence.*

26 Plant. . . caule ramoſo foliis integerrimis, ſpicis folioſis. *H. Upſal.* Pſyll. majus erectum. *C. B.* annuum eſt & foliis latioribus ſed ſpicæ noſtris nudæ ſunt.

27 Pſyll. . . majus ſupinum. *C. B.* folia anguſtiora habet & vivax eſt.

28 THESIUM floribus ſparſis. *Herbe aux Puces.*
Alchimilla linariæ folio calyce floris albo. *T.* Sanamunda linariæ folio. *Magnol.*

B. *INCOMPLETÆ FOLIIS LATIS.*

29 ILLECEBRUM caulibus procumbentibus. *Royen.*
Paronychia ſerpillifolia paluſtris. *Vaillant.* folia ovali-lanceolata, oppoſita, calycis laciniæ colore carneo, ſetâ terminatæ

erectæ, & in quina cornicula convolutæ. *En Cevenes.* invenit Frater meus, cum ſequenti.

30 MONTIA. L*inn.* Alſinoides annua verna. *Vaillant.*

Folia lanceolata oppoſita, flores longè pedunculati.

31 PEPLIS. L*inn.* Glaux paluſtris flore ſtriato clauſo portulacæ folio. *T.* Folia obverſè ovata oppoſita, caules erecti ſtriati, antheræ numero variant ſæpè octo, corolla vix conſpicua.

32 CORISPERMUM foliis oppoſitis (ſpatulatis). *Linn.* Aquis innatat & folia emerſa ſubrotunda verticillata videntur. varietas. I.

33 TRIANTHEMA Poſtulacaſtrum. D. *Dejuſſieu.*

Cal. perianthium pentaphyllum foliolis ovalibus, intus coloratis.

Cor. nulla niſi calycem dicas.

Stam. filamenta quinque, calyce breviora, interſtitiis ſegmentorum calycis reſpondentia. Antheræ ſubrotundæ.

Piſt. Germen tuberoſum, ſtyli duo inflexi acuminati, quorum apices, ſunt ſtygmata.

Peric. capſula bifida, tetragona, quadrifariam dehiſcens, unilocularis, Sem. rugoſa, ſubrotunda, plura.

Folia ovalia oppoſita, caules dichotomi patuli, flores ſeſſiles ad axillas terni, unde nomen Trianthema. ſemen accepi à *D. Lemonier.* Medico Paris. Botanico eggregio.

34 ATTRIPLEX caule erecto annuo foliis

triangularibus. *Linn.*
Attriplex hortenſis alba ſive pallide virens. *C. B. Arroche. Armol.*

37 ATTRIPLEX. caule fruticoſo foliis lanceolatis obtuſis. *Linn.*
Attripl. maritima anguſtiſſimo folio. *Moriſſ. A la Plage.*

38 Attripl. . . caule annuo foliis deltoideo-lanceolatis, obtuſè dentatis, ſubtus farinaceis. *Linn.* Attr. maritima laciniata. *C.* B. Folia deltoidea apud Veteres audiunt rhomboidea.

39 Attripl. . . caule fruticoſo foliis rhomboideis integris. *Linn.*
Attr. latifolius ſive halimus fruticoſus latifolius. *Moriſſ.* Folia Attriplicum ſitu variant, ſæpiùs tamen oppoſita.

40 MERCURIALIS caule fruticoſo foliis tomentoſis. L*inn.* Mas & fæmina. Mercur. fruticoſa incana. *C. B.* Spicata ſeu mas & teſticulata ſeu fœmina.

41 Mercur. . . caule ſimpliſſimo, foliis ſcabris. *Linn.* Mas. Merc. montana ſpicata. *C. B. aux Capouladous.*

42 Mercur. caule brachiato foliis glabris. L*inn.* Mas Fœmina, Mercur. annua glabra vulgaris. *Raii. Mercuriale*, *Foirole.*

43 BUXUS *Linn.* Et autor. *Boüis.* Nunc ſubfrutex, nunc arbor. *A Valene.*

45 OPHRYS. L*inn. Double feüille A la Fon* P*ompiniane :* Duo folia tantum, ovalia, oppoſita.

46 CHRYSOSPLENIUM foliis oppoſitis *Linn.*
Saxifraga aurea. *Dodon.* folia ſemiorbiculata crenata flores lutei incompleti, axil-
læ

læ uniſloræ. *à l'Eſperou.*

47 TILLÆA erecta. *Linn.* Sedum minimum ſtellatum rubrum. *C. B. A Gramont.*

48 Tillæ. procumbens. *Linn.* Polygonum muſcoſum minimum. *P. Bocone*, *à Gramont. à l'entrée du Bois ſur le Chemin.*

Tillæa procumbens folia ſetacea primo aſpectu verticillata gerit, Tillæa erecta folia gerit carnoſa obtuſa ſitu variantia, calyes ſtellatos duros rubros.

49 HERNIARIA calycibus bracteâ nudis. *Linn.*

Herniaria glabra. *C. B.* Et Herniaria hirſuta. C. *B.* Folia lanceolata ſæpius oppoſita, ramis humifuſis.

50 Herniar. fruticoſa viticulis lignoſis. *C. F.* Differt ā priori foliis longè majoribus & radice craſſà lignoſà.

51 Herniar. . . ſquamis nitidis flores ſuperantibus. *Linn.*

Paronychia Hiſpanica. *Cluſ.* Squamæ lanceolatæ patulæ, forem non occultantes, caules humifuſi. *Près le Vigan à la Côte de Navous.*

52 Herniaria erecta, ſquamis nitidis flores occultantibus.

Paronychia Narbonenſis erecta. *T.* Folia lanceolata, oppoſita, ſquamæ breves, ſetoſæ, ovatæ ſurrectæ, caules erecti. *Vers Cauneles.*

53 THELIGONUM. *Linn.*

Cynocrambe. *T. Dans les fentes des murs arrivant à Frontignan.* Folia lanceolata ſucculenta, appoſita, flores ſeſſiles ad genicula.

54 EUPHORBIA inermis foliis oppoſitis oblique cordatis ſerratis uniformibus ramis

alternis axillis unifloris. *Linn. Chamæſice.*

ORDO II.

Plantæ adverſifoliæ floribus monopetalis regularibus.

A. FOLIIS ANGUSTIS.

. 55 PHILLIRÆA foliis lanceolatis integerrimis. Linn.
Philiræa anguſtifolia. 1. *C. B. Filaria.*

. 56 Phil. . . foliis lanceolatis vix crenanis. *Linn.*
Phil. folio liguſtri. *C. B.*

. 57 LIGUSTRUM *J. B. Troëne.*

58 SYRINGA foliis lanceolatis integris. *Linn.*
Syringa liguſtri folio. *Rupp.*

59 LYSIMACHIA foliis lanceolatis, racemo compoſito terminata. *Linn.* Lyſimachia lutea. *J.* B. *Corneille.* Variat foliis verticillatis.

. 60 Lyſ. . . calycibus corollam ſuperantibus caule herbaceo ramoſiſſimo. *Royen.* Linum minimum ſtellatum. Bot. Monſp. folia conſtanter oppoſita. *à Boutonet à Gramont en Avril.*

61 VALERIANA caule dichotomo, foliis lanceolatis, ſerratis, fructu inflato. *Linn.* Valerianella cretica fructu veſicario. *T.*

. 62 Valer. . . foliis dentato ſerratis, pedunculis conicis, ſeminibus tridentatis. Valerianella cornu copioides echinata. Columnæ.

. 63 VALERIANA foliis imis dentatis, ſummis

linearibus multifidis, caule dichotomo. Valerianella ſemine umbilicato nudo rotundo. *Moriſſon.*

64 VALERIANA foliis linearibus integris ſeminis apice cochleato, caule dichotomo. Valerianella ſemine umbilicato nudo oblongo. *Moriſſon.*

65 Valer. . caule dichotomo foliis lanceolatis integris, fructu ſimplici. *Linn.* Valerianella arvenſis præcox humilis ſemine compreſſo. *Moriſſ.* vulgò *l achuguette.*

66 Valer. caule dichotomo foliis lanceolatis dentatis, fructu ſexdentato *Linn.* Valerianella ſemine ſtellato. *Moriſſon.*

In valerianellis fibræ foliorum ſunt coſtis parallelæ, in epilobio divergentes.

67 Valer. . . foliis lanceolatis integerrimis floribus caudatis monandris. *Linn.*

Valeriana rubra anguſtifolia. *J. B. Au Puy de ſaint* Loup, *aux Capouladous.*

68 VERONICA foliis oppoſitis enſiformibus, floribus laxe ſpicatis lateralibus. Veron. aquatica folio oblongo. *C.* B. Caules teretes *Beccabunga.*

69 Veron. . . foliis oppoſitis (lanceolatis) caule ſpicâ terminato. *Linn.*

Veron. ſpicata minor. *C.* B. Varietas foliis lineari-lanceolatis ſerratis, eſt veronica ſpicata anguſtifolia. *C.* B.

70 Veronica fruteſcens, foliis oppoſitis lanceolatis ſerrulatis. ſolitariis terminantibus.

Veron. Alpina fruteſcens. *C.* B.

71 ASCLEPIAS caule erecto perenni, foliis lineari-lanceolatis, floribus umbellatis, fructibus inflatis piloſis. *Linn.*

Apocynum erectum africanum villoſo fructu, ſalicis folio lato, glabro. *T.*

72 ASCLEPIAS caule erecto ſimplici herbaceo foliis ovato-oblongis, ſubtus tomentoſis, umbella nutante. *Linn.* Apocynum erectum latifolium incanum Syriacum floribus parvis obſoletè purpuraſcentibus. *T.*

73 DIOSPYROS foliis utrimque bicoloribus. *Royen.* Guajacana. *J. B.* Arbor in Labyrintho Horti Regii.

74 GENTIANA foliis anguſtis, floribus in alis caulis ſeſſilibus. *Haller.*
Gen. anguſtifolia autumnalis major. *C. P.*

75 Gent. . . corollis hypocrateriformibus collo barbatis. *Linn.*
Gen. pratenſis flore lanuginoſo. *C. B.* Folia elliptico linearia.

76 Gen. . . corollis hypocrateriformibus laciniis margine barbatis. *Linn. à l'Eſperou.*
Gent. . . cærulea oris piloſis. *C. B.* Folia amplexicaulia, flos quadrifidus.

77 Gent. . . corollis infundibuliformibus quadrifidis, pedunculis ternis, foliis linearibus. Centaurium minimum purpureum ramoſum. *Bot. M.* flores non ſunt umbellati. *à Gramont.*

78 Gent. . . corollis infundibuliformibus quinquefidis laxe ſpicatis, foliis lanceolatis. centaurium minus ſpicatum album. *C. B.* Variat flore purpureo *Vers Perauls & à la Garigue de la Colombiere.*

79 Gent. . . foliis trinerviis ovatis, floribus umbellatis, tubo ſtrictiſſimo. *Haller.*
Centaurium minus. Offic. *petite Centaurée.* Corollæ quinquefidæ caules dichotomi, folia caulis lineari-lanceolata.

80 GENTIANA quæ centaurium luteum non perfoliatum *C.* B. nondùm vidi. *Au bois de la Tour près de Perauls.*

B. *FOLIIS LATIS.*

81 CYNANCHUM caule erecto divariato, foliis cordatis glabris. *Linn.*

82 Cynanch caule volubili, foliis reniformi-cordatis acutis. *Linn.* Periploca Monſpeliaca foliis rotundioribus. *T. A la Plage.* Cynanch. . . caule volubili foliis cordato-lanceolatis glabris. *Linn.* Periploca Monſpeliaca foliis acutioribus. *T. A la Plage.*

83 PERIPLOCA foliis lanceolato ovatis. *Linn.* Periploca foliis oblongis. *T.*

84 ASCLEPIAS caule volubili herbaceo foliis ovato-lanceolatis, floribus confertis patentiſſimis. *Royen.* Aſclepias nigro flore. *T. à Gramont.*

85 Aſcl. . . caule erecto ſimpliſſimo herbaceo foliis cordato-lanceolatis racemis conglomeratis alrernis. *Fl. Suec.* Aſclepias flore albo. *T.*

86 APOCYNUM caule erecto annuo foliis ovatis. *Royen.*
Apocyn. indicum foliis androſæmi majoris flore lilio convallium ſuaverubuntis. *T.*

87 Apocyn. . caule erecto annuo foliis ovato-lanceolatis. *Royen.*
Apocin. maritimum venetum ſalicis folio, flore purpureo. *T.*

88 VINCA foliis ovatis. *Linn. Pervanche.*
Pervinca vulgaris anguſtifolia flore cæruleo. *T.*

89 MESEMBRYANTHEMUM foliis obverſe-ovatis oppoſitis ?

Ficoides africana fruteſcens portulacæ folio caule rubente. *Juſſieu.* flores nondum vidi.

90 COTYLEDON foliis ſubrotundis planis integerrimis. *Linn.*
Cotyl. africana fruteſcens foliis orbiculatis. *T.* variat limbo purpureo.

91 MIRABILIS. *Linn. Belle de nuit.*
Folia cordata acuta.

92 VALERIANA foliis cordatis ſerratis petiolatis. *Linn.*
Valer pyrenaica cacaliæ folio. *T.*

93 Valer foliis radicalibus cordatis eroſis, caulinis ſæpè ternatis floribus triantheris.
Valer alpina prima. *Cluſ. à l'Eſperou.*

94 Valer. . . foliis omnibus integris ovato-acuminatis leviter dentatis. *Haller.*
Valer. alpina ſcrophulariæ folio. *C.* B.

95 Valer. . . foliis ovatis obtuſis minimè dentatis. *Haller.*
Valer. celtica. *T.*

96 VERONICA foliis oppoſitis ovalibus petiolatis, floribus laxe ſpicatis lateralibus. Veron. aquatica folio ſubrotundo. C. B. *Beccabunga Creſſon de fontaine au mas de Chaulet.*

97 Veron caule repentè, ramis ſpicatis, foliis tis ſerratis, ſtrigoſis. *Linn.* Veron. Mas ovaſupina & vulgatiſſima. *Thé de l'Europe. Veronique. A Valene.*

98 Veron. foliis imis oppoſitis ovatis, ſummis alrernis lanceolatis, floribus ſolitariis. *Linn.* Veron. pratenſis ſerpillifolia. C. B. *à l'Eſperou.*

99 Veron. . . foliis ovalibus ſerratis ſeſſilibus oppoſitis, ſpicis laxis ad alas ſuperiores oppoſitis. Chamædrys vulgaris mas. Fuchſii. Ic.

100 VERONICA foliis oppoſitis plicatis dentatis, pedunculis ex alis ſuperioribus laxe ſpicatis. *Linn.* Veron. maxima folio quercus. *Boerhaav.*

101 Veron. . . ſoliis cordatis, ſummis majoribus acutioribus ex alis racemoſa. *Hall.* Veron. minor foliis imis rotundioribus. *Boerh.* Pedunculi ſpicati ex alis infimis. *à l'Eſperou.*

102 Veron. . . foliis oppoſitis cordatis crenatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Linn.* Foliolis calycinis æqualibus. Veron. floſculis cauliculis adhærentibus *Boerhaav.* Folia avenia, fructus pedunculati, non ita compreſſi ac ſequenti.

103 Veron. . . foliis oppoſitis ovatis crenatis, floribus ſubſeſſilibus, foliolis calycinis inæqualibus. *Cor amoris.* Obſervavit. *D. Lombard. M D.*

104 Veron. . . foliis oppoſitis vex crenatis glabris, aliis ovalibus trinerviis. Veron. nummulariæ folio pyrenaica. T. *Elle rampe, le fruit eſt ovale, les fleurs au haut de la tige.*

105 LYSIMACHIA foliis ſubrotundis, floribus ſolitariis (luteis) caule repentè. *Linn.* nummularia lutea. *J. B. Herbe aux Ecus. à Lattes.* Folia concava.

106 Lyſim. . . foliis orbiculatis planis, floribus ſolitariis, rubellis, caule repentè. Nummularia purpurea. C. B. folia videntur pinnata quia humifuſa. *Le long du Lez àCaſtelnau.*

107 ANAGALLIS foliis indiviſis. *Royen.* Ana-Agall. Phæniceo floro C. *B.* Et Anagallis cæruleo flore. C. B. *Mouron.*

108 GENTIANA caule uniflore flore campanulato caule longitudine excedente. *Linn.*

Gent. Alpin. magno flore J. B.

109 GENTIANA floribus rotatis verticillatis *Haller.* Folia ovata quinque nervia.
Gent. major lutea. *C. B. à l'Eſperou.*

110 Gent. . . caule dichotomo, foliis connatis, corollis octofidis. *Linn.* Centaurium luteum perfoliatum. *C. B.*

C. *FOLIIS LATIS FRUTICOSÆ.*

111 PHILADELPHUS. Athenei. *T. Linn. Le Syringa.*
Folia ovata quinque nervia ciliato-ſerrata.

112 SYRINGA foliis lanceolato-cordatis. *Linn.*
Lilac. Mathioli *Le Lilac.* Folia cordata.

113 LONICERA pedunculis bifloris, bacceis diſtinctis, floribus infundibuliformibus, ramis divaricatis. *Royen.*
Xyloſteum pyrenaicum. Folia lanceolato-elliptica.

114 VIBURNUM foliis cordatis acutè crenatis, venoſis, ſubtus tomentoſis. *Linn.* Viburnum. *T.* Lantana. *Dod. Viorne, à Valene.*

115 Viburn. . . foliis ovatis integerrimis. *Linn.* Tinus. 1. 2. 3. *Cluſ. Laurier-tin, Favelon. A Valene, à Sete.*

116 PHILIRÆA foliis cordato-ovatis ſerratis. *Linn.*
Philirea latifolia. C. B. *Filaria, à Valene.*

117 DIERVILLA. *Linn.*
Diervilla acadienſis fruticoſa flore luteo. *T.*

118 LINNÆA floribus geminatis. *Gronov.*
Campanula ſerpillifolia. C. *B. à Meyrueis.*

119 NYCTANTHES caule volubili foliis ſubovatis acutis. *Linn.* Jaſminum Arabicum foliis limonii conjugatis *Boerhaav.* Caulis apûd Nos non eſt volubilis. *Jaſmin d'Arabie.*

120 COFFEA. *Linn. Le Caffé.*
Jaſminum Arabicum lauri folio cujus fructus apud nos Caffé dicitur. *Juſſieu.*

ORDO III.

Adverſifoliæ flore monopetalo anomalo angioſpermæ.

His omnibus corollæ non circinnata ſed ringens & inæqualis, fructus bilocularis folia ſimplicia ex adverſo poſita.

A. *FOLIIS ANGUSTIS.*

121 GRATIOLA *Linn. La Gratiole.*
Digitalis minima Gratiola dicta. *T. A Gramont dans le pré.*

122 Digitalis foliis oppoſitis.
Digitalis flore albo Accepi *a D. Lemonier.* Medico Pariſino meritiſſimo.

123 SESAMUM foliis ovato oblongis integris. *Linn.*
Digitalis orientalis Seſamum dicta. *T.*

124 EUPHRASIA foliis linearibus. Pedicularis ſerotina lutea. *T.* Autumnalis eſt. Euphraſia pratenſis lutea. *C.* B. *A Gramont, Salenove.*

125 RHINANTHUS corollarum labio ſuperiori breviori. *Linn.* Pedicularis pratenſis lutea vel criſta galli. *C. B.* folia gladiata, ſerrata.

126 MELAMPYRUM foliis lanceolatis florum paribus remotis. *Linn.* Melamp. luteum latifolium *C.* B. *A Banahu près l'Eſperou.*

B. FOLIIS LATIS

127 RUELLIA pedunculis multifloris dichotomis folio longioribus. *Linn.* Miſit clariſſ. *Van. Royen*, folia oppoſita, ovata, integerrima.

128 VALERIANA foliis integris ovato lanceolatis, flore calcari donato. *Haller.* Valeriana rubra. B. *C. A l'Eſperou.*

129 SCROPHULARIA foliis cordatis oppoſitis, racemis terminatricibus. *Linn.* Scrophul. nodoſa fœdita. *C.* B. *Aux Capouladous.*

130 Scrophul. . . foliis oppoſitis ex elliptico decreſcentibus, caule & ramo paniculatis nudiſque ſpicis terminatis. *Haller. Herbe du Siege.* Scroph. aquatica major. *C. B.* petiolis foliorum una vel altera pinnula adnaſcitur.

131 Scrophul. . . foliis oblongo-cordatis, oppoſitis, inæqualiter ſerratis, racemo compoſito. *Linn.* Scrophul. meliſſæ folio. *T.*

132 ANTIRRHINUM foliis oppoſitis cordatis crenatis. *Linn.*
Azarina. *Lobel. Entre l'Eſperou & Meyrueis.*

133 Antirrh. . . foliis imis oppoſitis, ſummis alternis ad baſim hamatis. *Haller.* Linaria ſegetum nummulariæ folio acuto & villoſo. T. *Velvote.*

134 Antirrh. . . foliis imis conjugatis (oppoſitis) ſummis alternis ovalibus. *Haller.* Elatine folio ſubrotundo. *C. B.* caulis flaccidus ut priori. *Autre Velvote.*

135 Antirrh. Hiſpanicum villoſum origan. folio. T. Miſit *D. Barnades. D. M.* Ex civitate *Urgel.*

136 Antirrh. foliis alternis cordatis quinque lobis caule flaccido. H. *Upſal.* Cimbalaria *C.* B. folia multa in eâdem plantâ ſunt oppoſita. in Horto Regio facta indigena.

137 EUPHRASIA foliis lanceolatis. *Linn.*
Pedicularis ſerotina purpuraſcente flore. T.

138 Euphr. . . foliis ovatis acutè dentatis, floribus ſparſis. *Linn.*
Euphraſia. Offic. L'*Eufraiſe. A l'Eſperou.*

139 Eupr. . . foliis ovatis floribus ſpicatis.
Euphraſ. purpurea minor. *Bot.* Monſpel.
Vers St. Jordi.

C. *FOLIIS LATIS FRUTICOSÆ.*

140 LONICERA floribus capitatis terminantibus, foliis omnibus diſtinctis *Linn.* Caprifolium Germanicum. T. Folia ovata. *Chevrefeuil.*

141 Lonic. . . floribus verticillatis terminantibus, foliis floralibus connatis. *Linn.* Ca-

prifolium Italicum. *C. B. Chevrefeuil Pentecôte.*

142 LONICERA pedunculis bifloris, baccis diſtinctis, foliolis ſerratis. *Royen.*
Chamæceraſus alpina fructu nigro gemino. *C. B.*

143 Lonic. . . pedunculis bifloris, baccis diſtinctis, floribus bilabiatis, foliis integerrimis. *Royen.* foliis ovatis lanuginoſis. Chamæceraſus dumetorum fructu gemino rubro. *C.* B. *A Meyrueis.*

144 Lonic. . · baccis bifloris concretis, floribus bilabiatis. *Royen.*
Chamæceſarus alpina fructu gemino rubro duobus punctis notato. *C. B.* Folia laurina lanceolata.

145 Lonic. . . pedunculis bifloris bilabiatis, baccâ ſolitariâ globoſa integerrimâ. *Royen.*
Chamæceraſus montana fructu ſingulari cæruleo. *C. B.*
Folia longè elliptica nervoſa.

ORDO IV.

Adverſifoliæ monopetalæ labiatæ ſeu gymnotetraſpermæ. Differunt à prioribus quod ſemina nuda quaterna in fundo calycis recondant.

A. *FOLIIS ANGUSTIS.*

146 TEUCRIUM foliis lanceolatis integerrimis petiolatis ſpicis laxis ſubrotundis *Linn.* Polium laverdulæ folio *C. B.* Folia ſubtus incana. *A Valene.*

147 Teucr. . . foliis oblongis obtuſis crenatis ſeſſilibus, ſpicis ſubrotundis, pedunculatis. *Linn.* Polium montanum luteum. *C.* B. Pol. maritimum montanum. *Lobel.*

148 Teucr. foliis lanceolatis obtuſis dentatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Royen.* Chamæpythis moſchata foliis ſerratis *C. B.*

149 Teucr. . . fruteſcens foliis linearibus integerrimis.
Teucr. roriſmarini folio & facie. *D. Granger.* Ægyptiacum eſt.

150 ROSMARINUS *Linn. Le Romarin dans toutes les Garigues.*

152 LEONURUS foliis lanceolatis obtuſè ſerratis. *Linn.* Africanus eſt.

151 BRUNELLA foliis lanceolato-linearibus ciliatis.
Brunella hyſſopi-folia. *C. B. A Gramont.*

152 Brun. foliis integris vix dentatis, ſpic foliis majori. *Haller.*
Brun. cæruleo magnoflore *T.*

153 Brun. foliis dentatis, ſpica foliis minori *Haller.*
Brun. major folio non diſſecto. *C.* B *Brunelle.*

154 STACHYS foliis lanceolatis ſeſſilibus, baſi attenuatis. *Linn.* *A Lunel.* Sideritis vulgaris hirſuta erecta. *C.* B. Sid. arv. latifolia glabra. *C.* *B.* Betonica arvenſis annua flore ex albo flaveſcente. *T.* Folia inter verticillos diſſitos, longiora elliptica ſerrata. *Haller.*

155 Stach. . . foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus, baſi emarginatis. *Linn.* Galeopſis paluſtris betonicæ folio flore veriegato. *T.* *A Lates.* Verticilli ſex-flori; Stachys paluſtris fœdita. *C. B.*

156 SIDERITIS foliis lanceolato-linearibus ſeſſilibus. *Linn.*
Sider. alpina hyſſopifolia. *T.*

157 SATUREIA pedunculis bifloris. *Linn.* *Sariete.*
Satur. hortenſis. *C.* B.

158 Satur. . . pedunculis dichotomis. *Virid. Cliff.* *Vers ſaint Loup.*
Calamintha fruteſcens ſaturejæ folio facie & odore. *T.*

159 Satureja floribus verticillatis, foliis lanceolatis. *Royen.*
Satureja ſpicata. *C. B.* Thymbra ſancti Juliani. *T.*

160 MENTHA ſpicis ſolitariis interruptis, foliis lanceolatis ſerratis ſeſſilibus. *Linn.*
Mentha anguſtifolia ſpicata. *C. B.*

61 MENTHA floribus verticillatis foliis linearibus. *Linn. Pouliot.*
Folia oblonga anguſta ad verticillos latiora. Pulegium anguſtifolium. *C. B.*

62 Menth. . . floribus ſpicatis, foliis oblongis ſerrratis. *H. Upſ.*
Menth. ſylveſtris folio longiore. *C.* B. Folia elliptico-lanceolata.

63 HYSSOPUS ſpicis ſecundis. *Linn. Hyſope.* Hyſſopus offic.

64 LAVANDULA foliis lanceolatis integris, ſpicis nudis. *Linn. Lavande. Spic.*
Lavandula anguſtifolia. *C. B.* L. latifolia. *C.* B.

65 Lavand. . foliis lanceolato-linearibus ſpicâ ramoſâ. *Linn.*
Stæchas purpurea *C. B.* Caules quadranguli. *A Gramont.*

66 GALEOPSIS ramis ſummis pubeſcentibus. *Linn.*
Folia longe elliptica ſubhirſuta. mihi videntur lineari-lanceolata, rami patentes prælongi. Galeopſis patula ſegetum. *T.*

67 Gal. . . ramis ſummis ſtrigoſis. *Linn.* Cannabina flore purpuraſcente. *T.*

68 PHLOMIS foliis ligulatis utrimque tomentoſis, radiis involucri ſetaceis villoſis. Phlomis lychnitis. *Cluſ.*

B. *FOLIIS MINUS ANGUSTIS.*

69 SALVIA foliis lanceolato - ovatis integris crenulatis, floribus ſpicatis, calycibus acutis. *Linn.* Salvia major *C.* B. *Vers Glabels. Gignac.*

70 Salv. . . foliis ovatis oblongis obtuſis æqua-

liter crenatis, corollæ galeâ ſemiorbicula-
ta. H. *Upſ.* Horminum comâ viridi. *T.*

161 TEUCRIUM foliis ovato lanceolatis ſe-
ratis ſeſſilibus, floribus ſæpiùs binis. *Lin.*
Scordium offic. foliis ellipticis ſerrat-
mollibus verticillis inter folia pauciflori-
H*aller.* *A* L*attes.*

162 DRACOCEPHALUM floribus vertici-
latis, bracteis lanceolatis, ſerraturis ca-
pillaceis H. *Upſ.* Moldavica betonicæ fo-
lio flore cæruleo. *T.*

163 Dracoceph. floribus verticillatis, bracte-
oblongis, ſerraturis ſpinoſis, foliis tomen-
toſis. H. *Upſ.* Moldav. Orientalis betonic-
folio, flore magno violaceo. *T.*

164 BETONICA foliis inter verticillos i-
vertice congeſtos breviſſimis & integri-
H*all.* lacinulâ inter-media corollarum la-
bii inferioris emarginatâ. *Linn.* Betonic-
purpurea. C. B. *Betoine A Gramont.*

165 Betonica lacinulâ intermediâ corollaru-
labii inferioris integerrima *Linn.* Beto-
orientalis, &c. T.

166 Beton. . . foliis inter verticillos diſſit-
brevibus in ariſtam terminatis integri-
H*aller.* Sideritis vulgaris hirſuta. *J.* I-
An Stachys ſequens ?

167 Beton. . . foliis inter vertciillos diſſit-
longioribus ellipticis ſerratis. H*aller.* Side-
ritis vulg. hirſuta erecta. *C.* B. Quam Sta-
chydem ſupra diximus. Vide 154.

168 STACHYS foliis oblongis vix ſerrat-
ſcabris ſeſſilibus.
Siderit. hirſuta procumbens. *C.* B. Labiur-
ſuperius conchatum villoſum.

169 PRASIUM foliis ovato oblongis ſerratis. *Lin.*

Galeopſ-

Galeopſis hiſpanica fruteſcens teucrii folio. *T.*

170 CUNILA calycum laciniâ ſuperiore latiore ovato-trinervi. *Linn.* Marrubiaſtrum ſyderitidis folio calyculis aculeatis, flore candicante. *T.*

171 SIDERITIS folis ellipticis crenatis, verticillis dijunctis. *Haller.*

Sider. foliis hirſutis profundè crenatis. *C. B.* caulis erectus cubitalis villoſus, folia lanceolata raro ſerrata villoſa. *A Caſtelnau aux Fourches.*

172 VERBENA foliis lanceolatis ſpicâ carnoſâ nudâ. *Royen.*

Sherardia teucrii folio, flore coccineo. *Vaill.*

E. *FOLIIS LATIS.*

173 AJUGA tetragonopyramidalis. *Linn. Fol. Suec.* Bugle.

Bugula ſylveſtris villoſa flore cæruleo. *T. A Lates.*

Bug. foliis ovatis, inter flores ſtipatis, flagellis reptans. *Haller.*

174 TEUCRIUM foliis cordatis crenatis petiolatis, ſpicis laxis ſecundis. *Linn. T.* Scapis florigeris nudis ſpicatis longiſſimis. *Haller. A Alais, à l'Eſperou.* Chamædrys fruticoſa ſylveſtris meliſſæ folio. *T.* Scordium alterum. *C.* B.

175 Teucr. . . foliis ſubovatis crenatis, floribus laxe ſpicatis pedunculalis, caule fruticoſo. *Linn.* Chamædrys fruteſcens, Teucrium, vulgò. *T. A la Valete.*

176 Teucr. . . foliis ovatis inciſo-crenatis petiolatis, floribus laxè verticillatis. *Linn.* Chamæd. major repens. *T.* procumbens foliis ſolidis ovatis rotundè crenatis. *Hal-*

ler. Germandrée Petit Chêne.

177 SALVIA foliis cordato-ſagittatis, ſerratis, acutis. *Linn. A l'Eſperou.* Horminum luteum glunitoſum. *C.* B. *Sauge des montagnes.*

178 Salvia foliis oblongis ſinuato dentatis, floribus verticillos comprimentibus *Linn.* *Se*laræa vulgaris lanuginoſa ampliſſimo folio. *T.*

179 Sal. . . foliis cordato-ſagittatis dentatis. *Linn.* Spica verticillata nuda ſtylis corollæ labio inferiori inſidentibus.
Horminum ſylveſtre latifolium verticillatum. *C. B.*

180 Salv. . . foliis cordato-lanceolatis obtuſè ſerratis. *Linn.*
Gallitrichum glabrum folio ſalviæ flore purpureo. *J. B.*

181 Salv. . . foliis oblongo-cordatis ſerrato-crenatis, floribus calyce longioribus. L*inn.* *Sclarea.* Tabern. *Toute bonne. A Lates.*

182 Sal. . . foliis pinnatim inciſis glabris. *Linn.* Horminum ſylveſtre lavandulæ flore. *C.* B. *Prudhomme.*

183 Salv. . . foliis obtuſis crenatis, bracteis ſuperioribus flore majoribus coloratis. L*inn.* Horminum ſavivum. *C. B.* Comâ purpuro-violaceâ. *T.*

184 Sal. . . foliis ovatis inciſo crenatis, verticillis ſubnudis. L*inn.* Sclarea pratenſis foliis ſerratis, flore cæruleo. *T.*
folia ovato-lanceolata ſerrata, verticilli rari & diſſiti. *A Salenove, à* Lates.

185 SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis crenatis. *Linn.* Flores axillares ſeſſiles, folia cordata longe decreſcentia, ſerrata, flores gemelli. *Caſſida* Paluſtris vulgatior. *T. Tertianaria.* Offic.

186 Scutell. . . foliis ovatis ſerratis, ſpicâ interrupta. *Linn.*
Caſſida. Col. L*a Toque.*

187 LEONURUS foliis ovatis ſerratis acutis. *Linn. A ſaint Loup aux Capouladous.* Galeopſis ſive urtica iners flore luteo. *T.* Folia cordata acuta.

188 CLINOPODIUM foliis ovatis capitulis verticillatis. *Linn.*
Clinopod. Origano ſimile. *C. B. A Caſtelnau.*

189 Clin. . . verticillis paucifloris in ſpicam congeſtis. *Haller.*
Clinop. montanum. *C. B.*

190 OCYMUM foliis ovatis integerrimis *H. Upſ.* Ocymum minimum. *C.* B.
B*aſilic.* Folia incana.

191 Ocym. . . foliis ovatis glabris. *Linn.*
Ocym. Caryophyllatum. majus. *C. B.*

192 ORIGANUM foliis ovatis ſpicis laxis erectis confertis paniculatim digeſtis. *Linn.* ſpicæ folioſæ breviſſimæ, coloratæ, umbellatæ. H*all.* Origanum ſylveſtre cunila bubula. *Plin.*

193 Origan. . . foliis glabris ſpicis nutantibus. *Linn.*
Dictamnus montis ſipyli origani foliis B*oerh.*

194 Origan. . . foliis tomentoſis, ſpicis nutantibus. *Linn.*
Dictamnus Creticus. *C.* B. Et offic.

195 Origan. . . foliis ovatis acutis ſerratis, ſpicis compactis, umbellatim faſtigiatis. *Linn.* Majorana cretica origani folio villoſo, ſaturejæ odore, corymbis majoribus albis. *T. Marjolaine du Levant.*

196 Origan. . . foliis ovatis obtuſis, ſpicis confertis compactis pubeſcentibus. *Linn.*

Majorana vulgaris C. B. *Marjolaine.*

197 THYMUS verticillis in ſummis ramis congeſtis, foliis ovatis baſi ciliatis, flore majore. H*aller.* Serpillum vulgare flore majore purpureo. *T. A l'Eſperou.*

198 Thym. . . verticillis in ſummis ramis congeſtis, foliis ovalibus baſi ciliatis, flore minore. H*all.* Serpillum vulgare minus *C. F. Serpolet, Serpoul.*

199 Thym. . . erectus foliis margine reflexis ovatis, floribus verticillato-ſpicatis, L*inn.* Thymus vulgaris folio tenuiore. *C.* B. *Thym. Frigoule. Pote.*

200 Thym. . . floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis. *Fl. Suec.* Acinos multis. *J. B. Au Pont de Caſtelnau.*

201 MENTHA floribus ſpicatis, foliis cordatis dentatis undulatis ſeſſilibus. L*inn.* Mentha criſpa danica. B*oerh. Mente Danoiſe.*

202 Ment. . . foliis ovatis tomentoſis verticillis in ſpicam nudam continuatis. H*aller.* Ment. ſyveſtris rotundiore folio. *T. Mentaſtre.* Variat flore purpureo.

203 Ment. . . foliis ovato-lanceolatis verticillis paucis, ſupremo maximo. H*aller.* Ment. rotundifolia paluſtris ſeu aquatica major. *C.* B. B*aume.* Folia ovata ſerrata petiolata.

204 Ment. . . floribus verticillatis foliis ovatis acutè ſerratis. L*inn.* Ment. arvenſis verticillata hirſuta. *J.* B.

205 Menth. . . foliis ſubrotundis, verticillis nudis. *Haller.* foliis ovalibus obſoletè crenatis pluegium latifolium C. B. *Pouliot.*

206 LYCOPUS L*inn. Pié de Loup.* Lycop-

paluſtris glaber & hirſutus. *T.*

207 SIDERITIS foliis ovatis & lanceolatis inciſo ſerratis. *Linn.* Marrubiaſtrum folio cardiacæ. *T.*

208 Sider. . . foliis ellipticis crenatis verticillis disjunctis. *Haller.* Vide ſuprà.

208 Sider. . . ſalviæ folio noſtras. Parkinſon. folia ima cordato-ovata An ? Stachys 4. *Royen.* vel Stachys foliis hirſutis ſpicam diſtinguentibus obſcuri coloris, imis cordiformibus. *Haller.* *A Mauguio, à Alais dans les Prés.*

209 Sider. . . calycibus ſubinermibus hiſpidis. *Fl. Suec* ?

Marrubiaſtrum vulgare, T. Apud nos videtur cunila foliis cordato-ovalibus, calycibus amplis ſetâ terminatis, corolla labium ſuperiùs eſt ovatum emarginatum. Creſcit in Horto Regio.

210 MELISSA floribus ex alis ſuperioribus pedunculo communi confertis. *Linn.* Calamintha vulgaris & offic. C. B. Mel. foliis ovato-acuminatis caule erecto, paniculâ ſpicata terminato. *Haller.* *aux Capouladous. Calamant des Montagnes*, pedunculi repetito ramoſi.

111 Mel. . . ex alis ſuperioribus, pedunculo dichotomo, caule procumbente. *Linn.* Mel. foliis ovato-triangularibus obtuſis. Calamintha pulegii odore ſive nepeta. C. B.

112 Mel. . . floribus ex alis inferioribus ſubſeſſilibus. *Linn.* *Meliſſe Citronelle abeillane. aux Capouladous.*

113 GLECHOMA foliis reniformibus crenatis. *Linn.*

Chamæclema vulgare. *Boerhaav.* Hedera

terreſtris offic. *Lierre terreſtre.* Caulis repens folia cordato reniformia, repanda, petiolata. *A Jates.*

.114 LAMIUM foliis floralibus ſeſſilibus amplexicaulibus obtuſis. *Linn.*
Lamium folio caulem ambiente minus. C. B.

.115 Lam. . . foliis cordatis obtuſis petiolatis. *Linn.* in ſummo caule congeſtis. *Haller.* Lam. purpureum fœtidum folio ſubrotudo. C. B.

.116 Lam. . . foliis diſſitis cordatis acutis. *Haller.* Lamium album vulgare ſive Archangelica. Parkiſon. caules piloſi, calyces pungentes, folia ovata ſerrata, petiolata. ſtamina ſæpè duo. *A l'Eſperou.*

.217 MELITTIS. *Linn.* Meliſſophyllum. Tragi. *A l'Eſperou.*
Meliſſa humilis latifolia maximo flore purpuraſcente. *T.*

218 Molucella calycibus quinquedentatis denticulis æqualibus. *Royen.*
Molucca lævis. *Dod. Meliſſe des Iles Moluques.*

219 Mol. . . calycibus ſeptem dentatis. *Royen.* Molucca ſpinoſa. *Dod.*

220 MARRUBIUM foliis crenatis piloſis, crenis alternis majoribus, caule fruticoſo. *Linn.* Pſeudodictamus Africanus foliis ſubrotundis, ſubtus incanis. *Bocc.*

221 Marrub. . . denticulis calycinis ſetaceis uncinatis. *Linn. Marrube blanc.*
Marr. album vulgare. C. B.

222 Marrub. . . fruteſcens foliis cordatis crenatis, denticulis calycinis denis alterne minoribus. Pſeudodictamnus Hiſpanicus am-

pliſſimo folio nigricante & villoſo. *Boerhaav.* Crenæ foliorum æquales.

223 Marrub. . . fruteſcens foliis cordatis obtuſis (tomentoſis) non crenatis.
Pſeudodictamnus verticillatus inodorus. *C. B.*

224 Marrub. . . . denticulis calycinis ſetaceis rectis villoſis. *Linn.*
Marrub. Hiſpanicum ſupinum, foliis ſericeis argenteis. *T.* Erectum eſt.

225 Marrub. . , foliis cuneiformibus, verticillis involucro deſtitutis. *Linn.* Alyſſon Galeni.

226 BALLOTA foliis cordatis indiviſis ſerratis. *Fl. Suec.*
Ballote. Mathiol. *Marrube puant.*

227 NEPETE foliis cordatis petiolatis, verticillis ſpicatis. *Haller. A Lates.*
Cataria major vulgaris. *C. B. Herbe aux Chats.* Nepeta vulg. Tragi. flores interrupte ſpicati, pedunculati.

228 Nep. . . caule paniculato, pedunculis partialibus ramoſis multifloris. *Royen.* Cataria anguſtifolia major flore cæruleo purpuraſcente *Boerh.*

229 Nep. . . foliis ovatis petiolatis glabris, verticillis diſſitè ſpicatis.
Catar. Hiſpanica betonicæ folio anguſtiori. *T.*

230 Nep. . . caule acutè quadragono. *Linn.*

231 STACHYS verticillis ſex floris, foliis cordatis, petiolatis. *Flot. Suec.* Galeopſis procerior fœdita ſpicata. *T.* Lamium maximum ſylvaticum fœditum. *C.* B. *Près Gignac.*

232 Stach. . . verticillorum floſculis quadraginta, caule lanato. *H. Upſal.* Stach. major Germanica. *C. B.* Folia oblongo-cordata alba lanata, flores rubelli, ſtamina lutea.

233 STACHYS fruticoſa foliis cordato-oblongis crenatis petiolatis. *Linn.*
Stachys Canarienſis fruteſcens verbaſci folio. *T.*

234 Stach. . . foliis oblongis acutis amplexicaulibus ſerratis, floralibus cordatis, acutis integerrimis. *Royen.*
Sideritis Orientalis phlomidis folio. *T.* Flores luteo-albidi.

235 Stach. . . verticillorum floſculis triginta, calycibus pungentibus. H. *Upſ.* Stachys Cretica. *C. B.*

236 PHLOMIS foliis cordatis villoſis caule fruticoſo. H. *Upſ.*
Phl. fruticoſa ſalviæ folio latiore & rotundiore. *T.* Folia cordata oblonga, radii involucri lanceolati tomentoſi.

237 Phl. . . foliis lanceolato-ovatis radiis involucri lanceolatis tomentoſis.
Phl. fruticoſa ſalviæ folio longiore & anguſtiore. *T.*

238 Phl. . . foliis ovato oblongis ſcabris. H. *Upſ.*
Phl. Narbonenſis hormini folio, flore purpuraſcente. *Herba venti* Monſpelienſium. folia ovata ſubtus tomentoſa, radii ſetacei hiſpidi.

239 Phlom. . . radiis involucri ſetaceis trifidi foliis cordatis.
Phl. involucri radiis ſubulatis ſtrictis. *Linn.*
Phl. ſamia herbacea folio lunariæ. *T.*

ORDO VI

ORDO V.

Adverſifoliæ polypetalæ regulares.

A. *FOLIIS ANGUSTIS.*

238 BUFONIA. *Linn.* nov. gen.
Polygonum anguſtiſſimo gramineo folio erectum. B. *M.*
Plantula ſemipedalis, foliis oppoſitis linearibus marcidis, ſeu ſiccis, flore tetrapetalo dianthero, &c. Dicata Illuſtriſſimo Horti Regii Pariſienſis Præfecto & Acad. Regiæ ſcient Pariſ. ſodali D. De Buffon.

239 ARENARIA foliis linearibus longitudine internodiorum. *Linn.*
Alſine ſpergulæ facie media. *C. B.* Spergula ſemine foliaceo ſubfuſco. B. *M.* folia ſucculenta craſſa.

240 Aren. . . foliis vaginantibus internodio longioribus, ſeminibus nudis.
Alſine ſpergulæ facie ſive ſpergula minor floſculo ſubcæruleo. *C. P. A l'Eſplanade.* Arenaria vaginulis ad foliorum ortum ſquallentibus. *Haller.*

241 Aren. . . foliis capillaceis baſi latioribus petalis integris. *Haller.*
Alſine tenuifolia *J.* B.

242 SPERGULA foliis ſubulatis, ſeminibus marginatis? An Arenaria.
Alſine ſpergulæ folio minima B. *M.* Spergula ſemine foliaceo nigro. H. R. *B.*

243 MŒRINGIA pedunculis unifloris. H. *Upſal.* Huc attinet quoniam flos ſæpius eſt petalodes.

244 SAGINA ramis procumbentibus. An Alſine littoralis graminea. Bot. Monſp. Alſine muſcoſa Lugd. ſed noſtra eſt dyſtyla, non tetraſtyla. *Près de Sete.*

244 CHERLERIA. *Haller.* Folia linearia oppoſita, radicalia ceſpitoſa. Sedum montanum perpuſillum luteum. *Moriſſ.*

245 ALSINE foliis lanceolatis. *Linn.* Alſ. pratenſis gramineo folio ampliori. *T.* petala ſemibifida, folia graminea aſpera.

246 Alſ. . . tenuifolia pedunculis longiſſimis. *Vaillant.* Decanthera, pentaſtyla, pentapetala, petalis integris.

247 Alſin. . . foliis linearibus. L*inn.* Alſine pratenſis gramineo folio anguſtiore. *T.*

248 CERASTIUM foliis lanceolato-linearibus ſubhirſutis, corollâ calycem ſuperante. Caryophyllus holoſtius tomentoſus anguſtifolius. *C. B. Aux Capouladous.*

249 Ceraſt. . . caule perenni procumbente, foliis lanceolatis tomentoſis. *Royen.* Myoſotis incana repens. *T.*

250 Ceraſt. . . foliis calycibuſque hirſutis. *Linn.* Pentantherum eſt. Myoſ. arvenſis hirſuta flore majore. *T.* Folia oblonga obtuſa, flos calycem excedit.

250 Ceraſt. . . foliis connatis. L*inn.* Myoſotis Orientalis perfoliata lychnidis folio. *T.*

251 Ceraſt. . . foliis lanceolatis caule dichotomo ramoſiſſimo. *Royen.*

Myoſ. Hiſpanica ſegetum. *T.*

251 CERASTIUM caule hirſuto, foliis linearibus glabris, corollâ calycem excedente. *Haller.* Caryophyllus holoſtius alpinus gramineus. *C.* B.

252 LYTHRUM foliis oppoſitis. *Linn.* Salicaria vulgaris purpurea. *T.* Folia ſeſſilia venis reticulatis, caules quadrati, flores ſpicati.

253 EPILOBIUM foliis lanceolatis ſerratis. *Linn.* Chamœnerium villoſum magno flore purpuraſcente. *T.* folia oppoſita villoſa, axillæ folioſæ ramiferæ.

254 Epilob. . . foliis lanceolato-linearibus denticulatis, imis oppoſitis. Chamœnerium glabrum minus. *T.* Caules quadragoni.

255 DIANTHUS floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis corollis crenatis. *Linn.* Caryophyllus hortenſis. *Raii. Bouquet parfait.*

256 Dianth. . . petalis multifidis floribus ſolitariis, ſquamis ovatis acutis. *Linn.* Caryoph. ſylveſtris ſextus. *Cluſ. A* S. *Loup.*

257 Dianth. . . floribus ſubſolitariis, ſquamis calycinis lanceolatis, corollis crenatis. *Linn.* Caryophyll. minor repens noſtras. *Raii. à l'Eſperou.*

258 Dianth. . . floribus ſubſolitariis, petalis multifidis, baſi canaliculatis. H. *Upſ.* Caryophyll. ſylveſtris alter flore laciniato carneo. *Beſler.*

259 Diant. floribus ſolitariis ſquamis calycinis binis calyce brevioribus, foliis oblongis. Caryophyllus arvenſis polygoni folio. *Schol. Bot. à l'Eſperou.*

260 Diant. . . foliis brevibus, ſquamis

muticis, caule unifloro. Caryophyllus ſylveſtris humilis flore unico. *C.* B. folia rigida.

261 Dianth. . . floribus aggregatis, ſquamis calycinis ſubovatis, apice ſubulatis longitudine tubi. L*inn.* Caryoph. barbatus ſylveſtris. *C.* B.

262 Dianth . . floribus ſubaggregatis alternis ſeſſilibus, ſquamis calycis patulis tubi longitudine. H. *Upſ.* Car. ſylv. vulgaris latifolius. *C.* B.

263 Dianth. . . floribus ſolitariis, ſquamis acuminatis breviſſimis caule repente. Foliis imis lanceolatis. *A l'Eſperou.*

Caryoph. ſimplex minor flore punctato. *C.* B.

264 Dianth. . . floribus compoſitis in capitulum ovatum, ſquamis calycinis ovatis obtuſis maximis. *Linn.* Caryoph. ſylveſtris prolifer. *C.* B. Tunica calyce univerſali peculiaribus majori, cartilagineo, mutico. *Haller.*

Dianth. . . floribus ſolitariis ſquamis calycinis ſubulatis longitudine tubi. *Linn.* Caryoph. Sinenſis ſupinus leucoii folio. Act. Acad. 1705.

265 SAPONARIA foliis ovato-lanceolatis, calycibus cylindraceis. *Linn.* Lychnis ſylveſtris quæ Saponaria vulgo. *T.* L*a* S*avoniere.* folia trinervia, flores umbellati.

266 Sapon. . . humifuſa hirſuta calyce tubuloſo. H*aller.* Folia lanceolata. Lychnis vel Ocymoides repens montanum. C. B. *à Valene.*

267 Sapon. . . calyce pentaphyllo corollis crenato - emarginatis foliis ſubulatis *Fl. Suec.* Caryophyllus minimus muralis. C. B.

268 SAPONARIA caule brachiato, capillaceo folio, calyce campanulato. floribus ſparſis. *Haller.* Tunica minima Lugdun. Caryoph. ſylveſtris flore minimo. C. B. Invenit Frater meus. *à Sales en Cevenes.* petala rubella vix calycem ſuperantia, ſolia linearia, viſcoſa.

269 Sapon. . . calycibus pentaphyllis, corymbis faſtigiatis, foliis linearibus, caule adſcendente. *Fl. Suec.* Symphytum petræum. Thali. Caryophyllus ſaxatilis, foliis gramineis umbellatis corymbis. C. B.

270 SILENE floribus dioicis petalis ſetaceis ſimpliciſſimis. *Linn.* Mas fœmina. Lychn. viſcoſa flore muſcoſo mujuſculo quæ ſterilis. C. B.
Luch. ſylveſtris minima flore muſcoſo. B. *M.*

271 Silene floribus pentagynis, capſulis quinquelocularibus. *Linn.* Lychn. ſylveſtris viſcoſa rubra anguſtifolia. C. B.

272 Silene floribus triſtylis foliis lanceolatis ſeſſilibus, capſulis trilocularibus floribus ternis. Lych. ſylveſtris viſcoſa rubra altera. C. B.

273 Silen. . . foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus nutantibus, calyce ſtriato, corollâ iuvolutâ. *Linn.* Trigyua, trilocularis, folia ima ſpatulata. Lychn. montana viſcoſa alba latifolia. C. B.

274 Silen. . caule folioſo fruticoſo, foliis lanceolatis, capſulis ovatis. *Linn.* Lychn. fruteſcens myrtifolia Behen albo ſimilis. *C. B.* triſtylaa eſt.

275 Silen. . . foliis ſubulatis cauli appreſſis, calycibus rigidis internodio longioribus

Lychnis minima rigida *Cherleri.*

.276 Silen. . . ſpicâ incurva uno verſu florida, foliis imis ſpatulatis.

Lychnis ſylveſtris alba ſpicâ reflexâ. Bot. Monſp.

277 Silen. . . foliis ligulatis, fructu ventricoſo hiſpido, petalis vix emarginatis. Lychnis ſylveſtris lanuginoſa minor. *C. B.* Silene 4. *Royen.* ? Lychnis hirſuta minor flore variegato. *T.* ?

278 Silen. . . floribus erectis laxe diſtantibus caule dichotomo. *Linn.*

Lichn. ſaxatilis alpina glabra. *T.*

.279 CUCUBALUS calycibus globoſis acuminatis (triginta ſtriis) foliis glabris. H. *Upſ.* Lychnis. ſylveſtris latifolia calyculis turgidis ſtriatis. *C.* B.

280 Cucub. . . calycibus fructûs conicis (triginta ſtriis) foliis mollibus. *Linn.*

Lychn. ſylveſtris anguſtifolia, calycibus turgidis ſtriatis. C. *B.*

.281 Cucub. . . calycibus fructûs ovatis erectis, angulis decem alternis venoſis. *Linn.*

Lychn. noctiflora. *C. B.*

.282 LYCHNIS floribus faſciculatis faſtigiatis. *Linn. Croix de Malthe.*

Lychn. hirſuta flore coccineo major. *C.* B.

.283 Lychn. . . petalis quadrifidis, capſulis ſubrotundis. *Linn.* F. Cuculi. *J. B.*

Lychn. pratenſis flore laciniato ſimplici & pleno. *Moriſſ. à la Verune.*

.284 CORONARIA. *Linn. Coquelourde.*

Lychn. Coronaria. Cæſalp.

.285 AGROSTEMA. *Linn. Nielle à fleur rouge.*

Lychnis ſegetum major. *C. B.*

286 LINUM caule ſimplici, ramis foliisque imis oppoſitis lineari - lanceolatis. *Linn.* Linum maritimum luteum. C. B. *A la Plage en Septembre.*

287 Lin. caule dichotomo foliis ovato - lanceolatis corollis acutis. *Linn.* Linum catharticum. Rupp. Lin. pratenſe floribus exiguis. *C. B.*
Folia radicalia obverſè ovata. *Au Pré de la Font Pompiniane.*

288 SALSOLA foliis inermibus. *Linn.*
Kali majus cochleato ſemine. *T. à Aiguemortes.*

289 Salſ. . . foliis pungentibus. *Linn.*
Kali ſpinoſum cochleatum. *C. B.*

290 CISTUS foliis lanceolatis ſeſſilibus utrimque villoſis trinerviis, alis nudis. *Linn.* Ciſtus ladanifera Monſpelienſium *C. B.* folia enſiformia, vel iſocelia utrimque rugoſa, viſcoſa, ſine ſtipulis. Variat foliis lineari - lanceolatis.

291 Ciſt. . . foliis lanceolatis hirſutis margine repandis, alis nudis *Linn.*
Ciſt. mas foliis undulatis & criſpis. *T. Entre Pezenas & Beziers.*

292 Ciſt. . . foliis aveniis, foliolis duobus calycinis linearibus. *Linn.*
Ciſtus folio halimi. 1. *Cluſ.* Folia lanceolata incana.

293 Ciſt. . . lanceolatis ſuprà lævibus, petiolis baſi coalitis vaginantibus. *Linn.* Ciſtus Ladanifera Hiſpanica ſalicis folio, flore albo maculâ panicante inſigno. *T.* Ciſtus ledum foliis laurinis. *C. B.* Eſt foliis latioribus. *à ſaint Jordy.*

294 Ciſt. . . ſtipulis quaternis follis lineari-

bus inferne biſulcatis incanis.

Helianthemum flore albo, folio anguſto. *J. B.*

Calyces non hirſuti, unde differt à ſequenti.

295 CISTUS ſtipulis quaternis foliis lineari-ovalibus incanis, calycibus tomentoſis.

Helianthemum flore albo folio anguſto. J. B.

296 Ciſt. . . ſtipulis quaternis foliis oblongis calycibus non hirſutis.

Helianthemum folio ſerpilli flore majore aureo odorato. *T.* Folia trinervia.

Hel. foliis ad caulem ovalibus, inferioribus longe ellipticis. H*aller*.

296 Ciſt. . . foliis oblongo-linearibus margine revolutis. *Lemonier.*

Helianth. foliis Roriſmarini ſplendentibus ſubtus incanis. *T.*

297 Ciſt. . . foliis ovato-lanceolatis ſubtus incanis alis nudis, caule procumbente.

Helianth. foliis myrti minoris ſubtus incanis. *T.* Pedunculi ſtipulati flores lutei. *aux Capouladous.*

298 Ciſt. . . foliis villoſis lanceolatis, axillis folioſis, ſtipulis ſubulatis.

Helianth. folio ſampſuci, capitulis valde hirſutis. *J.* B. An prioris 293 varietas?

299 Ciſt. . . foliiis ovali-linearibus, ſtipulatis, oppoſitis, congeſtis.

Helianthem. folio thymi incano. *J.* B. ramuli procumbentes, fruticuloſi.

300 Ciſt. . . annuus foliis imis oppoſitis trinerviis, ramiferis ternatis linearibus.

Helianthem. flore maculoſo. Columṅ. Tuberaria minor. *Dalech.* Ciſtus annuus

flore

flore guttato. *J. B. A Gramont.* Pedunculi penduli, petala nigro maculata.

297 CISTUS perennis foliis humi appreſſis villoſis, ſummis glabris.
Tuberaria major. Mycon. Helianth. plantaginis folio perenne. *T. prés Vauvert.* Folia ima lanceolata nervoſa.

298 HYPERICUM floribus triginis, caule annuo, foliis punctatis obtuſis. *Linn.* Hypericum vulgare *C. B. Millepertuis, Treſcalan jaune.*

299 CLEMATIS foliis ſimplicibus lanceolatis. *Linn.*
Clematis cærulea erecta. C. *B.*

300 PUNICA. *Linn.* Grenadier.
Variat foliis ſparſis.

B. *FOLIIS LATIS.*

301 HYPERICUM floribus triginis, fructu baccato foliis ovatis pedunculo longioribus, caule ancipiti. H. *Upſ.*
Androſæmum maximum fruteſcens. *C.* B.

302 Hyp. . . floribus triginis caule quadrato annuo. *Linn.*
Hyp. foliis perforatis, flore non punctato. *Haller.*
Hyp. Aſcyrum dictum caule quadrangulo. *C. B.* Folia ſubrotunda ſeſſilia ſeptemnervia.

303 Hyp. . . floribus trigynis, calycum ſerraturis capitatis. *Linn.*
Hyper. ſupinum tomentoſum vel Monſpeliacum. *C.* B.
Puncta nigra in foliorum margine. Aliud erectum & glabrum.

304 HYPERICUM floribus triginis, ſtaminibus petalo longioribus, caule fruticoſo ancipiti. *Linn.* Hyper. fædidum fruteſcens. *T.*

305 CISTUS foliis ovatis petiolatis utrimque hirſutis, alis nudis. *Linn.*
Ciſt. fœmina, foliis ſalviæ, erectior & rectis virgis. *T.* Flores albi pedunculi longi ex alis foliorum uniflori diphylli.

306 Ciſt. . . foliis oblongis incanis ſeſſilibus, ſuperne aveniis, alis nudis.
Ciſtus mas folio oblongo incano. *T.* flores rubelli, folia ovalia tomentoſa incana *Vers Somieres, Sete, &c.*

307 Ciſt. . . foliis lanceolatis ſupra lævibus petiolis baſi coalitis vaginantibus. *Linn.* Folia ſubcriſpa utrimque acuta.
Ciſtus ledon foliis laurinis *C.* B. *Vers ſaint Jordi.* caulis fruticoſus, erectus, flores umbellati.

308 Ciſt. . . ſtipulis quaternis, foliis oblongis utrimque glabris, caule procumbente. *Linn.* Helianthemum vulgare flore luteo. *C.* B.
Hel. foliis ſubhirſutis omnibus longe ellipticis. *Haller.*

309 Ciſt. . . humilis foliis minoribus & incanis. *C.* B. *à Caſtelnau.*
Helianth. omninò candicans flore albo. J. B. folia ovalia lateribus plicatis villoſa, cum ſtipulis minimis, caules procumbunt. An varietas 314.

310 Ciſt. . . humilis nummulariæ folio. B. Monſpel. *aux Capouladous.* Folia orbiculata.

311 SEDUM foliis planiuſculis patentibus

ſerratis, corymbo terminatum. *Linn.* Anacampſeros vulgò Faba craſſa. *T.* Folia cordata amplexicaulia ſucculenta ſæpiùs oppoſita. *Orpin, Repriſe, à l'Eſperou.*

312 CIRCÆA foliis longioribus obiter crenatis. *Linn. La Circé.*
Circæa Lutetiana. *T.* Folia cordato-ovata, crenata, flores bipetali.

313 EVONIMUS foliis oblongo-ovatis. *Linn. Fuſain.*
Evon. vulgaris granis rubentibus. C. B.

314 CORNUS drupis globoſis. *Sanguine.*
Cornus fœmina. *C. B.* Virga ſanguinea. Nulla involucra video.
Corn. umbellis involucro multoties longioribus. *Linn.*

315 Corn. . . drupis ovalibus. *Cormier, Cornouiller.*
Corn. umbellis involucrum æquantibus. *Linn.*
Corn. ſylveſtris (& hortenſis) mas. *C.* B.

316 CORIARIA foliis ovato-oblongis. H. *Upſ. Redoul mâle & femelle.*
Rhus myrtifolia Monſpeliaca. *C. B.* Folia ovata trinervia.

317 SAXIFRAGA foliis ovatis oppoſitis, ſummis ciliatis. *Linn.*
Sedum alpinum ericoides purpuraſcens. C. B.

318 CUCUBALUS calycibus ſubovatis glabris reticulato-venoſis, capſulis trilocularibus. *Linn.* Lychnis ſylveſtris quæ behen album vulgo. C. B. *Caulichous.* Folia ſunt ciliata.

319 CUCUBALUS floribus dioicis. *H. Cliffort.* Lychnis ſylveſtris ſive aquatica purpurea multiplex & ſimplex. *C. B. à l'Eſperou.* Apud nos eſt dioica, nulla hermaphroditica, adeoque prioris varietas, foliis ovato-lanceolatis villoſis.

320 Cucub. . . florib. hermaphr. pentaginis capſul. unilocul. calycib. angul. H. *Cliff.* Lychnis ſylves. alb. ſimplex. C. B.

321 Cucub. . . caule ramoſo floribus trigynis, fructu colorato globoſo. *Linn.* Cucubalus Plinii. *Dalech.* Alſine ſcandens baccifera. *C. B.*

Caules procumbunt, folia ovato-lanceolata.

322 ALSINE foliis ovato-cordatis, floribus trigynis. *Linn.* Fl. Lapp. Alſine altiſſima nemorum. C. *B.*

323 Alſine (foliis ovato-lanceolatis) pentaſtemon, petalis bipartitis. *Haller.* Alſine media. *C. B.* vulgò *Mourillous. Morgeline.*

324 Alſ. . . pentaſtemon petalis ſerratis, umbellifera. *Haller.* Alſine verna glabra floribus umbellatis albis. T.

325 CERASTIUM corollâ calyce majori. *Linn.* Myoſotis foliis ex ovato-acuminatis, flore calycem excedente. H*aller.* Caryophyllus holeſteus alpinus latifolius. *C. B.*

326 Ceraſt. foliis ex ovatis-acuminatis, flore calyci æquali. Myoſotis arvenſis hirſuta parvo flore albo. *T.* Alſine hirſuta magno flore. *C. B.*

327 Ceraſt. floribus pentandris petalis emarginatis. *Linn.* Myoſotis exigua pentaſtemon. H*aller.*

Myoſ. hirſuta minor. *T.*

328 CERASTIUM erectum villoſo viſcoſum. *Linn.* Myoſotis viſcoſa foliis ovatis. *Haller.* Myoſ. hirſuta altera viſcoſa. *T.*

329 ARENARIA foliis ſubovatis acutis ſeſſilibus. *Linn.*
Alſine minor multicaulis. *C.* B.
Alſ. foliis lanceolatis petalis integris, calycis magnitudine. *Hall.*

330 Aren. . . foliis ovatis acutis petiolatis nervoſis. *Linn.*
Alſine plantaginis folio. *J. B.* Alſ. foliis lanceolatis trinerviis petalis integris. Haller. *Le long de la Riviere de la Mouſſon au delà du Pont de ſaint Jean de Vedas, & au bois de Valene vers Caravettes.*

331 Aren. . . foliis lanceolatis, petalis integris calyce majoribus.
Alſine alpina ſerpillifolia multicaulis & multiflora. *T.* Vid. Alſ. H*aller.* 17. cum icone.

332 Aren. . . foliis ovatis acutis carnoſis. *Linn.*
Alſine littoralis foliis portulacæ. C. B.

333 SILENE foliis lanceolato ovatis, floribus terminantibus, faſciculatis, faſtigiatis. *Linn.* Lychnis viſcoſa purpurea latifolia lævis. *C.* B. Variat floribus albis. Folia baſi connata, glabra, flores umbellati. *Vers la Verune.*

334 SAPONARIA foliis ovatis acuminatis ſeſſilibus, calycibus pyramidatis anguloſis. *Linn.* Flores rubelli parvi, folia glabra perfoliatæ anguli calycis quini acutiſſimi. Lychn. ſegetum rubra foliis perfoliatæ. *C. B. Paſſerats.*

Na. Folia radicalia ſunt obverſè ovatæ ſeu ſpatulata Sileni 269. 270. 273. & lino 202.

• 335 GERANIUM pedunculis, bifloris foliis ſubrotundis multifidis, caule procumbente. *Linn.*

336 Geran. . . calycibus monophyllis, foliis orbiculatis palmatis, inciſis, piloſis, caule herbaceo. *Linn.* Ger. Africanum alchimillæ folio hirſuto, floribus albidis. *Boerhaav.*

337 Geran. . . calycibus monophyllis foliis cordato-orbiculatis inciſis zonâ notatis. *Linn.*

• 338 Geran. . . pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, foliis cordatis laciniatis. *Linn.* Geran. folio altheæ. C. B.

• 339 RANUNCULUS foliis cordatis angulatis petiolatis. *Linn.* Chelidonium minus offic. folia ima oppoſita.



ORDO VI.

Adverſifoliæ polypetalæ anomalæ.

340 LATHYRUS cirris aphyllis. L*inn.* Aphaca. *Lobel.* Stipulæ folia cordata haſtata mentiuntur.

ORDO VII.

Adverſifoliæ dioſcoideæ ſeu floribus compoſitis.

A. FLORIBUS FLOSCULOSIS.

341 BIDENS foliis ellipticis ſerratis indiviſis. *Haller.*
Bid. coronâ ſeminum retrorſum aculeatâ, foliis lanceolatis amplexicaulibus floribus nutantibus. L*inn.* Bid. folio non diſſecto. C*æſalp.*

342 DIPSACUS foliis petiolatis appendiculatis. H. *Upſ.*
Dipſac. capitulis florum conicis. H. *Cliff.* potius hæmiſphæricis nudis.
Dipſacus ſylveſtris capitulo minore, vel Virga paſtoris minor. *C. B.*

343 Dipſac. . . foliis connato - perfoliatis ariſtis fructus rectis. *Verge à Paſteur.*

Dipſac. ſylveſtris aut virga paſtoris major. *C. B.* capitulis ovalibus.

344 Dipſac. . . foliis connato - perfoliatis ariſtis fructûs hamatis.

Dipſacus ſativus. *C. B. Chardon à Bonetier.*

345 SCABIOSA corollulis quadrifidis, caule ſimplici, ramis aproximatis, foliis lanceolato - ovatis *Linn. Morsdiable.*

Succiſa foliis ad terram ovatis ad caulem oblongis parum dentatis H*aller.*

Scabioſa integrifolia glabra (vel hirſuta) radice præmorſâ. *Boerh.*

346 Scab. . . corollulis quadrifidis foliis omnibus lanceolatis ſerratis.

Scab. annua integrifolia ſive foliis bellidis. *Bot. Monſp.*

Fores rubri, caulis non hiſpidus, rami patuli, ſquammæ calycis lanceolatæ corollis breviores. *A la Colombiere dans les* B*lés.*

B. *FLORIBUS RADIATIS.*

347 DORONICUM foliis caulinis oppoſitis. *Linn. Arnica.* Offic.

Variat foliis oblonge ovalibus, ſeu Dor. plantaginis folio alterum *C. B.* Et foliis lanceolatis ſeu Aliſma Mathioli Plantago montana. *J. B. à l'Eſperou.*

348 HELIANTHUS radice annuâ. *Linn. Soleil.*

Corona Solis. *Tournefort.* Folia cordato-lanceolata ſerrata omnibus.

349 Hel. . . radice terreti inflexâ perenni. *Linn. Graine de Perroquet.*
Corona ſolis minor fœmina. Tabernæ.

350 Hel. . . radice tuberoſâ. *Linn. Taupinanbours.*
Corona ſolis parvo fiore tuberoſa radice. *T.*

351 Hel. . . radice fuſiformi. *Linn.*
Corona ſolis latifolia altiſſima. *T.*

CLASSIS VI.

Plantæ verticillatæ.

TAles dicuntur illæ quarum folia caulem vel ramos in eadem zonâ, ſimul ambiunt ſaltem terna, ſæpè quina vel plura unde etiam plantæ *Stellatæ* vocantur; illa folia in eodem plano poſita caulem ambiunt ut verticillus fuſum, & ſunt vel ſimplicia vel compoſita; ſimplicia ſi quodlibet folium ex petiolo indiviſo naſcatur, compoſita ſi petiolo ramoſo ſit annexum.

Si planta deſuper adſpiciatur folia videntur tamquam radii ex uno orbiculo oriundi, unde *Radiatæ* etiam plantæ audiunt.

ORDO I.

Plantæ verticillatæ floribus incomcompletis.

A. *FOLIIS SIMPLICIBUS HERBACEÆ.*

1 EQUISETUM caule ſimpliciſſimo, vaginis profunde ſectis. H*aller*.
Hippuris nuda equiſetum nudum *Tabern.*
2 Equiſ. . . caule ſimpliciſſimo aſpero vaginis non laciniatis. *Haller.*
3 Equiſ. . . ſcapo nudo ſimpliciſſimo. *Royen.*
Equiſ. caule nudo ſcabro, baſi ſubramoſo. *Linn.*
Equis foliis nudum non ramoſum. *C.* B.
4 Equis ſetis ſimplicibus internodia vix ſuperantibus (*Royen.*) caule Hexagono.
Equiſ. paluſtre brevioribus ſetis. C. B.
5 Equiſ. . . multiflorum caule tetragono, verticillis rarioribus. H*aller*.
Equiſ. paluſtre brevioribus ſetis. C. B.
6 Equiſ. . . ſetis ſimplicibus internodio multoties longioribus. *Royen.*
Equiſ. pratenſe longiſſimis ſetis. C. B. caule cylindrico.
Equiſ. caule non ſulcato latiſſimo verticillis denſiſſimis. H*aller*.
Equiſ. paluſtre longioribus ſetis. C. B.
7 Equiſ. . . ſulcis in caule plurimis, verticillis denſiſſimis. H*aller*.
Equiſ. paluſtre majus. *Tabern.* tenuiſ-

ſſimis & longiſſimis ſetis. *T.*

8 HIPPURIS. *Linn. La Peſſe d'eau.*
Limno peuce vulgaris. *Vaillant.*
Equiſetum paluſtre brevioribus foliis polyſpermum. *C. B.*

9 CHARA Caulibus levibus. *Royen. Luſtre d'eau.*
Chara vulgaris fœtida. *Vaillant.*
Equiſetum fœtidum ſub aquâ repens. C. B.

10 Char. . . aculeis caulinis capillaribus. *Fl. Suec.*
Char. major caulibus ſpinoſis. *Vaillant.*

11 Char. . . aculeis caulinis ovatis. *Fl. Suec.*
Char major ſubcinerea fragilis. *Vaillant.*

12 Char. . . caulium, articulis inermibus diaphanis, ſuperne latioribus. *Flor. Suec.*
Ch. tranſlucens minor. *Raii.*

13 LEMNA foliis verticillatis.
Lemna teophraſti. Folia quaterna obverſè ovata.

14 NAYAS. *Linn.* Variat foliis verticillatis. Nec non *Ephedra.* Atque *Coriſpermum* quoad folia ſumma.

B. *FOLIIS COMPOSITIS HERBACEÆ.*

15 EQUISETUM ſcapo fructifero nudo, caule ſterili, ramis compoſitis. *Flor. Suec.*
Equiſ. caulibus floriferis à folioſis diverſis. *Haller.*

Equiſ. arvenſe longioribus ſetis. *C.* B. *à Navitau.*

16 Equiſ. . . ſetis ramoſis internodio multoties longioribus. *Royen.*

Equiſ. ſylvaticum tenuiſſimis ſetis. *C.* B.

Equiſ. verticillis ad ſolia numeroſis. *Hall.*

17 MYRIOPHILLUM floribus maſculis interrupte ſpicatis. *Linn.* Le *Volant d'eau.*

Potamogetum foliis pennatis. *T.*

Millefolium aquaticum pennatum ſpicatum. *C. B.*

Pentapteris ſcapo florigero nudo. *Haller.*

18 Myriph. . . floribus omnibus verticillatis. *Linn.*

Potamogetum floſculis ad foliorum nodos. *C.* B. *Dans le Lés.*

19 CERATOPHYLLUM foliis aſperis bis biſurcatis. *Haller.* Hydre *cornu.*

Hydroceratophyllum folio aſpero quatuor cornubus armato. *Vaillant Daus les foſſés de Lattes.*

20 HOTTONIA. *Linn.* Miriophyllum equiſetifolium paluſtre. L*obel.* Stratiotes vulgaris flore albo. *Vaillant.* Habet folia emerſa floralia verticillata, cœtera pinnata.

ORDO II.

Verticillatæ floribus monopetalis regularibus foliis ſimplicibus, caulibus herbaceis.

21 RUBIA perennis foliis ſæpiùs quinis *Garence.*
Rubia ſylveſtris Monſpeſſulana major *J. B.* Folia quaterna, quina vel ſena caulis quadragonus, folia lanceolata. Rub. foliis ſenis. *Linn.*

22 Rub. . . annua foliis ſæpius quinis.
Rubia tinctorum ſativa. *C. B.*

23 GALLIUM foliis plurimis lanceolatis, pedunculis in ſummo caule floriferis. *Linn.*
Rubia ſylveſtris lævis. *C. B.* folia longe elliptica, caulis quadragonus.

24 Gall. . . foliis pluribus linearibus, pedunculis dichotomis, ſummo caule floriferis. *Royen.*
Gall. Saxatile glauco folio. *Boccon.*

25 Gall. . . foliis pluribus linearibus, ramis brevibus floriferis. *Linn.*
Gallium luteum. *C. B. Caille-lait à fleur jaune.* Folia octona graciliſſima conferta, ſpicâ floreâ caulem terminante. *Haller.*

26 Gall. . . foliis pluribus acutis, caule flaccido, ramis patentiſſimis. *Linn. Fl. Suec.*

Gall. caule quadrangulo foliis octonis glabris, acuminatis. *Haller.*
Gall. album vulgare. *T.*
27 Gall. . . foliis quaternis lanceolatis trinerviis, caule erecto. L*inn.*
Rubia pratenſis lævis folio acuto. *C. B.*
28 Gall. . . foliis quaternis obverſè ovatis inæqualibus, caulibus diffuſis. L*inn.*
Cruciata paluſtris alba. *T.*
29 Gall. . . foliis ſenis & novenis, ſubaſperis, ſpinula terminatis. *Haller.*
Rubia montana anguſtifolia. *C. B. à Gramont. vers la Valete en Eté.*
30 Gall. . . foliis quaternis ex ovato-lanceolatis, ſeminibus hirſutis, longe pedunculatis. *Haller.*
Rubia quadrifolia vel rotundifolia lævis. *C. B.*
31 Gall. . . caule tereti fulcrato, foliis octonis glaucis & obtuſis. *Haller.*
Gall. montauum latifolium ramoſum. *Magnol.* Nov. Char.
32 VALANTIA floribus maſculis trifidis, trifidis hermaphroditici germini inſidentibus. Caulibus procumbentibus glabris. L*inn. Fl. Suec.*
Valantia quadrifolia verticillata. *T. Dans les fentes des Rochers à Boutonet.*
33 Val. . . floribus maſculis trifidis hermaphroditici pedunculo inſidentibus. L*inn.*
Aparine ſemine coriandri ſacharatè Parkins. & ſemine lævi. *Vaillant.*
34 Val. . . floribus maſculis quadrifidis, pedunculis nudis. L*inn. H. Upſal.*

Cruciata Orientalis latifolia erecta glabra. *T.*

35 Val. . . floribus maſculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. *Linn. Hort. Upſal.*

Cruciata hirſuta. *C. B. La Croiſette.*

36 APARINE foliis lanceolatis acuminatis ſcaberrimis, corollis fructu minoribus. *Royen.* Aparine vulgaris. *C. B. Gratteron.*

Gallium caulis angulis foliique orâ & nervo ſerratis, fructu hiſpido. *Haller.*

37 Apar. . . foliis lineari-lanceolatis acuminatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Royen.* Idem ac Gallium. 27. Aperine paluſtris minor Pariſienſis flore albo. *T.*

38 SHERARDIA. *Dillen.*

Aparine ſupina pumila flore cæruleo. *T.*

Rubia parva flore cæruleo ſe ſpargens. C. B.

39 ASPERULA foliis octonis lanceolatis, floribus faſciculatis pedunculatis. *Fl. Suec.*

Aſperula, ſeu rubeola montana odorata. *C. B.*

40 Aſper. . . foliis quaternis linearibus, floribus trifidis. *Linn. Fl. S.*

Rubia ſynanchica. *C.* B. Rubeola vulgaris quadrifolia lævis floribus albis.

41 Aſper. . . foliis linearibus quaternis, ſummis oppoſitis. *Royen.*

Rubeola vulgaris quatrifolia floribus purpuraſcentibus. *T.*

Semina glabra, flores umbellati. *Haller.*

. 42 Aſper. . . foliis quaternis ovato-lanceolatis, ramis alternis. Mas. *Linn.*

Rubia quadrifolia & latifolia lævis. *C. B.*

. 43 Aſper. . . foliis ſenis longis & obtuſis. *Haller.*

Aſper foliis pluribus, floribus ſeſſilibus. *Linn.*

Aſperula cærulea arvenſis. *C. B.* Gallium arvenſe flore cæruleo. *T.*

. 44 CRUCIANELLA erecta foliis ſenis. *H. Upſal.*

Rubeola anguſtiora folio. *T.* Rubia anguſtifolia ſpicata. *C. B. à Gramont.* folia ſena, quina, anguſtiſſima.

. 45 Crucian. . . procumbens foliis quaternis. (*Linn.*)

Rubeola latiore folio. *T.* Rubia latifolia ſpicata. *C. B. aux Capouladous.*

. 46 Crucian. erecta, foliis quaternis, corollâ ad ſolem connivente.

Rubeola maritima. *C. B.* Folia ima quaterna, ſubulata, rigida, caules lignoſi candicantes, corollæ laciniæ quinque in ſtylos deſinentes, qui ſtyli ſublutei interdiu connivent, noctu patent. *à la Plage.* Eſt pentandra digina, abortit.

. 47 Crucian. . . repens foliis ſenis, ſpicis longis.

Rubia ſpicata repens. *Bot.* Monſp. *à Caſtelnau.*

. 48 MOLLUGO foliis quaternis. *Linn.*

Herniaria alſines folio. *T.* Adeſt corolla pentapetala, præter calycem, folia ſæpè verticillata, obverſè ovata.

. 49 ELATINE foliis ſtellatis. *Royen.*

Alſinaſtrum gallii (& gratiolæ) folio. *T* *Vaillant.*

Vaillant. folia emerſa linearia latiora, immerſa filiformia. *Dans les foſſés de Lattes.*

50 LYSIMACHIA foliis ovato-lanceolatis, floribus ad ſummos ramos ſpicatis. *Haller.*

Lyſimachia foliis ternis lanceolatis. *T.* Variat etiam foliis quaternis.

Lyſimach. lutea major. *C. B. La Corneille. à Lattes.*

51 CONVALLARIA foliis verticillatis. *Linn.* Polygonatum anguſtifolium non ramoſum. *C. B. à l'Eſperou.*

52 VERONICA foliis ſæpius ternis. *Linn.* Ver. ſpicata longifolia. *T.*

Folia ſuperiora etiam ſunt verticilata in Valérianâ foliis omnibus pinnatis. *Linn.*

ORDO III.

Verticillatæ herbaceæ floribus monopetalis anomalis.

53 ANTIRRHINUM foliis ternis ovatis. *Linn.*

Linaria Valentina. *Cluſ.* Folia ovalia.

54 Antir. . . foliis ſæpius quaternis linearibus, caule diffuſo, floribus racemoſis. *Linn.*

Linaria quadrifolia ſupina. *C. B.*

55 Antirr. . . erectum foliis linearibus imis verticillatis, pauciflorum.

Linaria lutea parva annua. *J. B. à ſaint*

Guillen. Calcar ſetaceum breviſſimum. Caules ſæpè biflori, flores ampli.

56 Antirrh. . . foliis ad caulem linearibus, ad radicem ovatis ſæpe ternatis.

Linaria annua purpuro-violacea, floſculis caudatis, foliis imis rotundioribus. *Bot. Monſpel. au bois de Gramont.* Folia ima humifuſa verticillata, rarò oppoſita. Caulina ſparſa.

57 Antirrh. . . foliis quinis linearibus. *Linn.* Linaria ſicula multicaulis, molluginis folio. *T.*

58 Antirrh. . . foliis lanceolatis petiolatis, calycibus breviſſimis, racemo terminatum. *Linn.*

Antirrh. vulgare. *T. Mufle de Veau.* Variat foliis ternatis verticillatis.

59 SCROPHULARIA foliis cordatis oppoſitis, pedunculis lateralibus ſolitariis, multifloris. *Linn.* Scroph. flore luteo. *T.* Variat foliis ad caulem ternis verticillatis.

60 Scroph. . . foliis quaternis ovatis, floribus verticillato ſpicatis. *Royen.*

ORDO IV.

Verticillatæ herbaceæ polypetalæ.

61 PARIS foliis (ſæpiùs) quaternis. *Linn.*
Herba Paris. *T. Dans les bois de la Vallée de Bonheur ou de Banahu à l'Eſperou.* Variat foliis quinis præſertim in Horto Regio.

62 HELLEBORUS flore folio inſidente. *Linn.* Helleboroides hyemalis. *Boerhaav.* floret Februario, folium unicum peltatum multifidum radiatim diviſum.

63 LIRIUM foliis verticillatis (quinis) floribus reflexis corollis revolutis. *Linn.* Lilium floribus reflexis montanum. *C. B. Martagon. , à l'Eſperou*
Folia lanceolata . ſpiraliter verticillata, flores rubri reflexi, plures ſimul.

64 Lir. . . foliis verticillatis (denis) floribus reflexis, corollis revolutis. *Linn.*
Lilium Byzantinum miniatum. *C.* B. Folia floralia ſolitaria, ſcapus pauciflorus.

65 SPERGULA foliis ſtellatis, pedunculis dichotomis. *Linn.*
Alſine ſpergula dicta major. *C.* B.

66 Sperg. . . foliis filiformibus verticillis raris, ſeminibus nigris.
Alſine ſpergulæ facie minima ſeminibus

marginatis. *T. à Gramont.*

67 SPERGULA foliis ſucculentis ſeminibus fuſcis.

Alſine ſpergulæ facie media. *C. B. à Lates.*

68 PORTULACA foliis cuneiformibus ſeſſilibus. *Royen.*

Poſtul. ſylveſtris vulgaris. *C. B.* folia ima oppoſita, ſumma verticillata.

69 CARUM foliolis ſetaceis verticillatis, radice napiformi.

Carvi foliis tenuiſſimis aſphodeli radice. *T. Au deſſus du Vigan.*

70 FRANKENIA foliis ovalibus. Francà maritima ſupina quadrifolia &c. Micheli *à Lates.* Folia ima quaterna ſed aggeſta.

Na excludimus ab hac Claſſe Plantas quarum tantummodo bracteæ ſeu folia floralia ſunt verticillata ut *Euphorbias* plurimas, & claſſem umbelliferarum involucris gaudentium.

ORDO V.

Verticillatæ fruticoſæ.

71 SIMPLANOBLA Caranienſium Pluknetii.
72 NERIUM foliis lineari-lanceolatis *Linn.* *Laurier-Roſe.*
Caules trichotomi, folia ternata, variat flore pleno, rubro, albo &c.
73 JUNIPERUS foliis ſeſſilibus patentibus. (*Linn.*) binerviis. *Genevrier.*
Juniperus vulgaris arbor. *C. B.* Juniper. vulgaris fruticoſa *C.* B. Bacca atrocærulea. Folia ſubulata unico ſulco ſuperne excavata.
74 Juniper... foliis ternis patentibus ſubulatis pungentibus trinerviis. *Cade.* Juniper. major baccâ ruffeſcente. *C.B.* Folia ut prioris terna, ſed ſupernè binis ſulcis excavata, bacca major ruffeſcens.
75 Juniper... foliis undique imbricatis ovatis obtuſis. *Royen. Oxicedre.* Cedrus folio cupreſſi media majoribus baccis. *C.* B.
Folia radicalia ſunt patentia, terna, ſubulata, uti aliis Juniperis.
76 Juniper.. foliis inferne adnatis oppoſitionibus concatenatis. *Linn.*
Sabina *Boerhaav.* Le *Savinier.* Variat foliis in eadem plantâ oppoſitis.
77 ERICA foliis ramuliſque ternis apice floriferis.
Erica ternis per intervalla ramulis. *C.* B.
Erica humilis cortice cinereo, arbuti flore. *C.B.*

Corollæ ovales corymboſæ, quadridentatæ, rubræ. *à Gramont.*

78 ERICA erecta foliis ternis floribus ad alas ſeſſilibus verticillatis. *Bruyere. Bruc.*
Erica ſcoparia floribus herbaceis. *Lobel.* Ramuli per intervalla terni, ſed flores luteoli folio quinquies breviores.
Erica major ſcoparia foliis deciduis. C. *B.*

79 Erica foliis lanceolatis oppoſitis imbricatis, floribus uno verſu racemoſis. L*inn.*
Erica major floribus herbaceis purpuraſcentibus. *Lobel. à Gramont.* Non ita evidenter ſunt verticillata folia, nec in ſequenti.

80 Erica foliis aceroſis obtuſis imbricatis, ſtaminibus corollâ longioribus. L*inn.*
Erica foliis corios multiflora. *J.* B.
Erica juniperifolia Narbonenſis denſe fruticans. *Lobel.* folia caule abrupto ſunt verticillata quina, linearia, rigida.

81 Erica erecta foliis quaternis, floribus ſpicato racemoſis.
Erica maxima alba. *C.* B. Erica foliis corios prima. *Cluſ. à Valene.*

82 Erica foliis ſubulatis ciliatis quaternis oppoſitis, corollis globoſo-ovatis terminatricibus confertis. L*inn.*
Erica Brabantica folio coridis hirſuto quaterno. *J. B.*

83 GENISTA radiata ſeu ſtellaris. *J.* B. Quid?

CLASIS VII.

Plantæ digitatæ.

TAles ſunt illæ quarum ſingula folia ſunt compoſita ex foliolis duobus, tribus vel pluribus, quorum diſci in eodem plano jacent & petioli ex uno centro vel ex uno petiolo communi procedunt non ſecus ac digiti avium ad centrum commune vel ad unicum crus radiatim diriguntur.

Differunt à verticillatis quod folia digitata ſint compoſita, & quod foliola uni petiolo plura ſimul inſideant, aut ſi ſeſſilia, ſint non undique ramum cingant.

Differunt à palmatis ex eo quod palmata folia ſint ſimplicia & in lobos proprio petiolo deſtitutos tantum diviſa. Si ſi quis ſtipulas à foliolis non diſtingua Lotos quæret in pinnatis.

ORDO PRIMUS.

Digitatæ flore incompleto.

A. *FOLIOLIS SIMPLICIBUS PLURIMIS.*

1 CANNABIS foliis digitatis. *Linn.* Maſ. femina. *Chanvre.*

2 ALCHEMILLA foliis digitatis. *Linn.* Alch. alpina, Quinquefolii folio ſubtus argenteo. *T. à l'Eſperou.*

B. *FOLIOLIS SIMPLICIBUS TERNIS.*

3 PISTACIA foliis ternatis. *Linn. Piſtachier.* Terebinthus indica Piſtacia dicta *T.* Variat foliis quibuſdam quinatis.

4 RHUS foliis ternatis, foliolis petiolatis, ovatis, acutis, integris. *Linn.* Toxicodendron triphyllum glabron. *T.*

5 SALIX foliis glabris acutè ſerratis, lanceolatis petiolatis, ſtipulis trapeziformibus. *Royen.* Sal. ſpontanea fragilis amygdalino folio auriculata. *C. B.*

6 Sal. .. foliis ſerratis glabris lanceolatis acuminatis, appendiculatis. *Linn.* Sal. folio longo ſplendente fragilis. *Raii.* hiſt.

C. *Foliis compoſitis ſeu ſubdiviſis.*

7 CERATOPHILLUM foliis aſperis bis ſurcatis. *Haller.* Vide verticillatas. 17.

ORDO. II.

ORDO II.

Digitatæ Flore monopetalo regulari.

A. *FOLIOLIS TERNATIS SEU TRIFOLIÆ.*

8 OXALIS ſcapo unifloro foliis ternatis radice ſquammoſâ, articulatâ. *Linn.*
Oxys flore albo. *T. Alleluya à fleur blanche à l'Eſperou.*

9 Oxal. . . caule ramoſo pedunculis multifloris. *Linn.*
Oxys lutea. *J. B.* Lujula offic. Angliæ. Oxytriphyllum.

10 MENIANTHES foliis ternatis. *Linn.* Menianthes paluſtre latifolium triphyllum. *T.* Trifolium fibrinum offic. *A l'Eſperou allant vers Banahu près la Barraque de Michaut.*

11 TRACHELIUM. H. *Upſal.* Trach. azureum umbelliferum. Ponæ. Folia auriculata.

B. *FOLIOLIS TERNATIS AC QUINATIS vel multipartitis.*

12 VERONICA foliis alternis infimis quinquepartitis, ſummis tripartitis, floribus ſolitariis. *Linn.*
Veron. cærulea trifido & quinquefido folio. *Boerhaav. Vers Caunelles.*

13 HYDROPHYLLUM. Morini.
Folia ternata inciſo ſerrata impari longiori trifido multilobo.
Folia ſumma ſunt ſæpè trifoliata in Solano Dulcamarâ dicto.

14 JASMINUM foliis alternis ternatis, pinnatiſque ramis anguloſis. *Linn.*
Jaſmin. luteum vulgò dictum bacciferum. *C.* B. in Hortis variat foliis. Verticillatis ternatis & quinato-pinnatis.

15 Jaſmin. . . foliis alternis ternatis pinnatiſque, ramis teretibus. H. *Upſ.*
Jaſmin. Indicum flavum odoratiſſimum. *Ferrar.*

16 Jaſmin. . . foliis oppoſitis ternatis. L*inn.*
Jaſmin Azoricum trifoliatum flore albo odoratiſſimum. B*oerhaav.*

B. *FOLIOLIS BIS TRIFOLIATIS SEU COMPOSITIS.*

17 ADOXA. L*inn.* Moſchatellina foliis fumariæ bulboſæ. *T.*

ORDO III.

Digitatæ Flore monopetalo anomalo.

A. *FOLIIS TRIPHYLLIS.*

18 TEUCRIUM foliis ſimplicibus trifidis. *Linn.*
Chamæpytis vulgaris folio trifido. C. B.

19 SALVIA foliis cordato ſagittatis dentatis. L*inn.*
Horminum ſylveſtre. 3. *Cluſ.* Folia pinnato ternata impari maximo. Vide Adverſifolias.
Styli corollæ labio inferiori incumbunt.
Variat etiam Salvia offic. undè dicta Sal. minor aurita & non aurita. *C. B.*
datur etiam Stachys foliis ternatis, varietas.

20 TRIFOLIUM capitulis ſubrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis. L*inn.*
Trifol. pratenſe folliculatum. C. B. floſculi monopetali rubelli.

21 Triſol. . . capitulis ſeſſilibus globoſis tomentoſis, calycibus inflatis obtuſis.
Trifol. fragiferum tomentoſum. Bot. Monſpel.

Veſiculæ calycinæ intus trigonæ, extus obtuſæ undique clauſæ ſine denticulis.

Folia glabra, ſtipulis lanceolatis, ad flores bina petiolata, ovato lanceolata.

22 Trifol. . . ſpicis villoſis caule diffuſo, foliolis integerrimis. *Linn. Triolet.*

Trifolium pratenſe flore monopetalo. *T.*

Trifol. ſpicis villoſis foliis inſidentibus, vaginarum caudis capillaribus. *Haller.*

23 Trifol. . . ſpicis villoſis ſubovatis, caule erecto, foliis ovato-oblongis integerrimis. *Linn.*

Trifol. ſpicis villoſis, foliis inſidentibus, vaginarum caudis latioribus. *Haller.*

Trifol. montanum purpureum *C. B.*

B. *FOLIIS POLYPHYLLIS.*

24 VITEX. Linn. *Agnus Caſtus.*

ORDO IV.

Digitatæ Flore polypetalo regulari.

A. *FOLIIS BINIS SEU BIFOLIÆ.*

25 ZYGOPHILLUM foliis petiolatis. *Linn.*
Fabago Belgarum ſive Peplis Pariſienſium. *T.*

B. *FOLIIS TERNATIS SEU TRIFOLIÆ.*

26 FRAGARIA flagellis reptans. *Linn. Fraiſier, Majouſier.*
Fragaria vulgaris. *C. B.*

27 Frag. . . caule decumbente repente. *Royen.*
Frag. ſterilis. *C.* B. Baccâ ſiccâ, foliolis ovalibus. *A Meyrüeis* Petala alba ſubrotunda.

28 Frag. caule erecto, foliolis lanceolatis, ſerratis.
Frag. ſterilis alpina auguſtifolia. Hort. Reg. Monſp.

29 RUBUS caule aculeato foliis ternis. (*Linn.*) glabris.
Rubus repens fructu cæſio. C. B. *ronce à fruit bleu comme la ſuivante.*

38 Rub. . . caule aculeato foliis ternis utrimque incanis.
Rubus minor. *Dodon.* An præcedentis va-

rietas ? *Je ne l'ai vu qu'à Sauvages près d'Alais.*

31 Rub... inermis foliis ternatis utrimque glabris.
Rubus vulgaris ſpinis carens. *C.* B. *Ronce ſans épine.*

32 RUBUS caule repente, annuo foliis ternatis (utrimque viridibus.) *Linn.*
Rubus Alpinus humilis. *J.* B. Rub. Idæus abſque ullis ſpinis. *Geſner.* folia ulmi, caulis inermis, an prioris varietas ? *A la Serane à la Combe du Bois de Gange.*

33 Rub. . . caule uniflоro foliis ternatis. *Linn.*

34 Rub. . . caule aculeato foliis ternatis ac quinatis. *Linn.*
Rub. vulgaris fructu nigro. *C. B. Ronce.* coſtâ ſpinoſâ, fructu nigro & lævi.

35 Rubus foliis ternatis ac quinatis, coſtâ plerumque inermi, fructu rubro villoſo. *Haller. Framboiſier.*
Rubus Idæus ſpinoſus. B. *C.* & Rub. Idæus lævis. *C. B.*

36 AGRIMONIA foliis caulinis ternatis, fructibus glabris. *Linn.*
Agrimonoides. Columnæ.

37 CARDAMINE foliis ternatis crenatis caule ſimplici. Linn.
Cardamine trifolia. *Lobel.*

38 FAGONIA ſpinoſa. *Linn.*
Trifolium ſpinoſum creticum. *C. B.*

39 ANEMONE foliolis ovatis integris ſerratis. Linn.
Anemone trifolia. *Lobel.*

40 CISTUS herbaceus erectus glaber, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus folio oppoſitis. *Linn.*
Helianthemum ledi folio. *T.* Ciſt. annuus

folio ledi. *Lobel. J.* C. *à Salenove.*

41 CISTUS herbaceus decumbens villoſus, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus, folio oppoſitis. *Linn.* Helianthemum ſalicis folio. *T.*

C. *FOLIIS QUINATIS PLURIBUSVE.*

42 POTENTILLA foliis digitatis inciſo-ſerratis caule erecto. *Linn. Quintefeuille.* Quinquefolium erectum luteum. *C. B.* Foliola auguſtiſſima, ſubtus tomentoſa. *à Gramont.*

43 Potent. . . foliis quinatis longè petiolatis caule repente. H*all.*
Quinquef. majus repens. *C. B.*

44 Pontent. . . foliis acutè ſerratis orâ ſericeâ, petalis maculatis. H*aller.*
Quinquefol. minus repens alpinum aureum. *C.* B. caulis declinatus.

45 Potent. . . foliis quinatis apice retuſo ſerrato, petalis albis oblongis, ellipticis. *Haller.*
Quinquef. minus album alterum. C. *B.* Caules filiformes procumbentes.

46 Potent. . . foliis quinatis, obtuſe in apice ſerratis, petalis cordatis. H*all.*
Quinquef. minus repens luteum. *C.* B. *Vers Caſtelnau & à Salenove.*
Quinquef. montanum erectum hirſutum luteum. *C. B.* Varietas hirſutior. *Entre Valene & Viols & aux Capouladous, & au* Pré *à Gramont.*

47 TORMENTILLA. *Linn. Tormentille.*
Potentilla foliis quinatis, flore tetrapetalo, caule erecto. H*aller. A l'Eſperou.*

48 HELLEBORUS caule infernè anguſtato multifolio, multifloro, foliis caule brevioribus. *Linn.* Helleborus niger fœditus. *C. B. Pié de Griffon, Marcioure.*

49 Hellebor. . . ſcapo florigero ſubnudo pedunculo communi bipartito. *Linn.* Hellebor. niger hortenſis flore roſeo. *T. Herbe du feu, en Dauphiné.*

50 Hellebor. . . flore folio inſidente. *Linn.* Elapſo flore videtur folio digitato peltato.

51 VITIS foliis quinatis foliolis ovatis ſerratis. *Linn. Vigne de Canada.* Vitis quinquefolia Canadenſis. *T.*

52 Vitis foliis quinatis foliolis multifidis. *Linn.* Vitiis foliis apii. *J. B.*

53 DENTARIA foliis quinatis. *Hall.* Dentaria pentaphyllos. *C. B.* rigoroſe pinnata eſt. *à l'Eſperou.*

54 ESCULUS floribus heptandris. *Linn. Marronier d'Inde.* Hippocaſtanum vulgare. *T.*

55 Eſcul. . . floribus octandris. *Linn.* Pavia. *Boerh.* Arbor pentaphyllos Virginiana, &c. *Raii.*

D. *FOLIOLIS PLURIBUS COMPOSITIS SEU SUBDIVISIS.*

56 RANUNCULUS foliis tripartitis laciniatis, caule ramoſo, radice tuberoſâ. *Linn.* Ran. aſphodeli radice. *Boerhaav.*

57 Ranunc. . . foliis peltatis quinquangularibus multipartitis, laciniis linearibus, caule multifloro. *Royen.* Ran. caule erecto multifloro, foliis pentagonis, lobis ſeſſilibus. *Haller.* Ran. pratenſis erectus acris. *C. B.*

C. B. Boutons d'or.

57 RANUNCULUS caule ex geniculis radicato, foliorum lobis petiolatis. *Haller.* Ran. . . foliis ternatis, foliolis petiolatis trifidis inciſis, medio productiore, caule multifloro. *Linn.* Ran. pratenſis repens hirſutus. *C. B. Boutons d'or rampant.*

58 Ranunc. . . radice ſimplici globoſa. *Linn.* Ran. pratenſis radice verticilli modo rotundâ. *C. B.* Folia & foliola tripartita.

59 Ranunc. . . ſeminibus aculeatis, foliis decompoſitis linearibus. *Linn.*
Ranunc. arvenſis echinatus. *C.* B.

60 Ranunc. . . Saxatilis magno flore. *C. B.*
Ran. caule ſimplici villoſo, ſubnudo, foliis trifidis crenatis, flore ſolitario amplo.

61 Ranunc. . . foliis tripartitis, laciniis linearibus caule multifloro, radice tuberoſâ. *Linn.* Ran. lanuginoſus anguſtifolius grumoſâ radice minor. *C. B.*

62 ANEMONE monanthos flore albo minore. *Vaillant.*
Ranuncul. nemoroſus anemones flore major. C. B. Pr.

63 Anemon. ſeminibus acutis, foliolis inciſis, caule unifloro. *Linn. A. l'Eſperou.*
Ranunc. phragmites albus vernus. *T.* Et purpureus. *T.*
Anemone ſemine lævi, petalis ſenis ellipticis. *Haller.*

64 GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinquepartitis, lobis pinnatifidis. *Linn.* Geran robertianum primum rubens. *C.* B.

65 PULSATILLA foliis decompoſitis ternatis. *Linn.*
Anemone tenuifolia (6-30) *Boerh.*

Anemone Geranifolia. *J. B.*

66 CARDIOSPERMUM. *Linn.*
Corindum ampliori folio, majori fructu. *T.* Folia enneaphylla, foliola terna inciſo-lobata, ovato acuta, imparibus majoribus. nectarium eſt quidem difforme ſed corolla regularis.

67 ŒGOPODIUM foliis caulinis ſummis ternatis. *Linn. Podagraria.* Offic.
Angelica ſylveſtris minor ſive erratica. *C. B.* *Au Vigan, à Alais.*
Foliola ovata ſerrata, radicalia duplicato-ternata, lateralibus connatis.

68 IMPERATORIA. *Linn. Imperatoire.*
Imperatoria major. C. B. Folia terna, medio trilobo, paribus bifidis, radicalia ſæpè duplicato-ternata.

69 PEUCEDANUM foliolis quinquies tripartitis, lineari-ſubulatis integerrimis. *Linn.*
Peucedanum. *Raii.*

70 EPIMEDIUM. *Dodon.*
Folia oblique cordata, ex petiolo communi novena, omnia ſeptem nervia. Corolla paria oblique cordata, formia.

71 AQUILEGIA. Linn. *Ancholie.*
Aquilegiæ omnes. *T.* Petala regularia, ſed nectaria florem difformiem faciunt, foliola novena obtuſa inæqualiter crenata. *à l'Eſperou.*

72 DENTARIA foliis omnibus ternatis. Linn.
Dentaria quinta triphyllos. *Cluſ.*
Folia caulis terna, foliolis iterum ternis, radicalia tantum trifolia.

ORDO V.

Digitatæ Flore polypetalo anomalo.

A. *TRIFOLIÆ LEGUMINOSÆ.*

Cavendum eſt in hoc ordine ne ſtipulæ pro foliolis numerentur.

72 TRIFOLIUM ſpicis ovatis ſeſſilibus ſcabris lateralibus. *Linn.*
Trifol. cujus caules ex geniculis glomerulos oblongos proferunt. *J.* B.

73 Trifolium capitulis ſubgloboſis ſeſſilibus lateralibus. *Linn.*
Trifol. cum glomerulis ad caulium nodos rotundis. *Raii.*
Foliola crenata, globuli ad foliorum alas molles, ſeſſiles, floſculi rubri.

74 Trifol. . . ſpicis denſis quaſi radicatis humi appreſſis.
Ambulacra publica julio menſe ornat; calyces ſine villis rigidiuſculi denticulis æqualibus, folia longè petiolata, maculata, ſerrata, obverſè ovata.

75 Trifol. . . ſpicis ſubovatis calycibus inflatis dorſo gibbis. *Linn.*
Trifol. fragiferum friſicum. *C. B.* Fortè Trifol. fragiferum tomentoſum. B. *M.* Vide trifolium 21. flores ſunt monopetali, foliola ovato-lanceolata, caules breves, tunicis tecti, flores rubri.

76 Trifol. . . ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, caule erecto. *Linn.*

77 Trifol. pratenſe luteum capitulo lupuli vel agrarium. *C.* B.
caulis diffuſus, capitula ſicca ſtrepentia.

78 TRIFOLIUM capitulis ſphæricis longè pedunculatis, involucris radiatis.
Trifol. capitulis thymi. *C.* B. Solo involucro differt à 20; floſculi rubelli curvi, ſtipulæ foliorum vaginantes, pedunculi nudi. *Vers Grâmont à Gauche.*

79 Trifol. capitulis ſubrotundis; floſculis pedunculatis, leguminibus tetraſpermis, caule procumbente. *Linn.* Trifol. pratenſe album. *C.* B. Media pars florum erecta, reſidui deorſum flexi, pedunculis & petiolis prælongis.

80 Trifol... capitulis villoſis globoſis, terminantibus, bracteâ orbiculâtâ veſtitis. *La Houpe.* Trifol glomerulis perſonatæ. Cherleri Setæ calycinæ villoſæ bractea capitulum involvens triplex.

81 Trifol... ſpicis villoſis, ovalibus, dentibus calycinis ſetaceis æqualibus. *Linn.*
Lagopus. Vulgò. folia oblonga, caulis erectus. *Patte de Lievre.*

82 Trifol... ſpicis villoſis, ſubovatis caule erecto, foliis ovato-oblongis integerrimis. *Linn.* Trifol. montanum purpureum majus. *C.* B. ſpicæ foliis inſident, ſtipularum caudæ latiores.

83 Trifol... ſpicis villoſis, caule erecto foliis ſerrulatis. *Linn.*
Trifol. montanum ſpicâ longiſſimâ rubente. *C. B.*

84 Trifol.. ſpicis ovatis piloſis, dentibus calycinis lanceolatis patulis. *Linn.* *Trefle etoilé.*

Dentes calycini iſoceles patuli, rubri. Trifol. ſtellatum. *C. B.*

85 TRIFOLIUM caule nudo ſimpliſſimo foliis lineari-lanceolatis. *Linn.* *Regliſſe des Montagnes.*

Anonis acaula floribus longiſſimis, foliis non ſerratis. *Haller.* *A l'Eſperou.*

Trifol. alpinum flore magno, radice dulci. *C. B.*

86 Trifol. . . leguminibus ſpicatis reniformibus nudis monoſpermis, caule procumbente. *Linn.*

Melilotus capſulis reni ſimilibus in capitulum congeſtis. *T.* caules anguloſi, flores lutei, folia obverſe ovata, unde à ſequenti diſcrepat.

87 Trifol. . . . Leguminibus glabris, racemoſis nudis, foliolis oblongis.

Melilotus anguſtifolia repens folliculis rotundis. *T.* Foliola lanceolata, ſerrulata, non retuſa, caulis procumbens, ſtipulæ ſubulatæ.

88 Trifol. ſpicis ſubrotundis, leguminibus ſemi nudis acuminatis caule erecto. *Linn.* *Melilotus* major odorata violacea. *T.* Folia ovato-acuta, pedunculi laterales, ſtipulæ an ullæ?

89 Trifol. . . floribus racemoſis, leguminibus nudis diſpermis, caule erecto. *Linn.* *Melilotus* ficinarum Germaniæ. *C. P.* Siliquæ turgidæ breves, obcure tranſverſim rugoſæ. Folia obverſe ovata crenata, ſtipulis acutis.

90 Trifolium fruteſcens ſiliquis brevibus turgidis minus rugoſis. *Haller.*

Melilotus vulgaris altiſſima fruteſcens flore albo. *T.* & flore luteo. Folia crenata ova-

ta, obtuſa ſtipulis ſetaceis.

91 Trifolium erectum foliolis obtuſe quadrangulis, leguminibus ſpæricis.
Melilotus Italica folliculis rotundis. *C. B.* petiolis rubellis foliola integerrima glabra; baſi rectangula, ſtipulis acutis. Omnibus Melilotis foliolum impar petiolatum, cætera ſeſſilia ſunt.

Na. Medicago differt à Trifolio ſiliquis inſpiram contortis. Folia ſunt uti ſectores circuli, apice ſerrata. Excipe fœnum græcum.

92 MEDICAGO leguminibus cochleatis, ſtipulis dentatis, caule diffuſo. *Linn.* Medica ſcutellata. *J.* B. Legumina integerrima, cavam ſcutellam referunt.

93 Medicago pedunculis laxe ſpicatis, leguminibus cochleatis ſpinoſis caule procumbente villoſo. *Linn.* Medica marina. *J.* B tota tomento incana, floribus luteis.

94 Medicago leguminibus ſolitariis cochleatis compreſſis planis, ſtipulis ciliatis, caule diffuſo. Medica orbiculata. *J.* B.

95 Medicago pedunculis laxe ſpicatis leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Linn.* Medica falcata. Siliquâ ſemel inflexa, caule procumbente.

96 MEDICAGO leguminibus ſolitariis globoſis, breviſſimè echinatis pedunculatis, ſtipulis ſerratis. Medica echinata hirſuta. *T.*

97 Medicago leguminibus congeſtis globoſis hiſpidis, ſtipulis ciliatis. Medica annua fructu ciliari. *T.* Flores lutei, capitulis pedunculatis, raro ſolitariis, foliolis ovalibus apice, crenulatis.

98 Medicago leguminibus reniformibus mar-

gine dentatis, foliis ternatis. *Linn.* Medicago annua trifolii facie. *T.*

99 Medicago caule erecto, floribus ſpicatis, ſiliquis repetito intortis glabris. *Haller.* Medica major & erectior floribus luteis. *T.* Eadem floribus purpureis. *T.*

100 Medicago fructu minimo coronulam utrimque dentatam referente. Medica coronata. *Cherler.*

101 Medicago fructu echinato foliis linearibus dentatis.
Trifolium cochleatum ſpinoſum Syriacum laciniatis foliis. *Breyn.* Medica cochleata capſulâ rotundâ ſpinoſâ, foliis eleganter diſſectis. *Herm.*

102 Medicago fructu turbinato.
Medica magna turbinata. *J. B.* Fructus ſphoridæus durus.
Plures haſce plantas miris modis variare concipio ex ſpeciminibus numeroſiſſimis quæ mecum communicavit. *D. Gagnebin.*

103 Medicago leguminibus confertis ſeſſilibus arcuatis inclinatis. *Linn.* Fænum Græcum ſylveſtre polyceratium Monſpelienſe *Breyn.* Medica ſiliquis ornithopodii. *Vaillant.* Flores lutei axillares ſeſſiles capitati.

104 Medicago leguminibus confertis ſeſſilibus erectis. *Roy.* Fœnum græcum ſylveſtre alterum. *Dod.* Noſtro legumina ſunt duo vel tria quandoque ſolitaria ad nodos, erecta.

105 TRIGONELLA leguminibus ſeſſilibus. *Linn.*
Fœnum græcum ſylveſtre. *C. B.*
Na Lotus differt à Trifolio & à Medicagine ſtipulis binis folia mentientibus, ita

ut folia pentaphylla videantur, & legumine cylindraceo.

106 LOTUS caule fruticoſo, florum capitulis globoſis. *Linn.*
Lotus villoſus altiſſimus flore glomerato. *T. au Lés.* Fores albidi.

107 Lotus caule erecto, hirto, capitulis hirſutis, leguminibus ovatis. *Linn.*
Lotus pentaphyllos ſiliquoſus villoſus. *C. B.* *Trefle hémorrhoidal.*
Folia lanceolata incana, ſiliquæ breves rubellæ, flores albi.

108 Lotus leguminibus ſæpius ternatis linearibus ſtrictis erectis. *Linn.*
Lotus pentaphyllos minor hirſutus ſiliquâ anguſtiſſima. *C. B.*
Siliquæ cylindricæ rectæ axillares ſæpius ſolitariæ, foliola obverſè ovata. Majo menſe. *à Gramont.*

109 Lotus caule herbaceo, florum capitulo depreſſo, leguminibus decumbentibus teretibus. *Linn.*
Lotus floribus umbellatis ſiliquis pendulis caule procumbente. *Haller.* Lotus corniculata glabra & hirſuta minor. *J.* B.

110 Lotus leguminibus ſolitariis membranaceo-quadrangularibus, foliolis floralibus lanceolatis. *Linn. F. S.* Lot. maritima lutea ſiliquoſa, folio pingui glabro. *T.* Radix perennis.

111 Lotus leguminibus ſæpius quinatis arcuatis. *Linn.*
Lot. ſiliquis ornithopodii. *C.* B.

112 Lotus leguminibus ſæpius binatis linearibus compreſſis nutantibus. *Linn.*
Lotus ſiliquis geminis peregrina *Boerhaav.*

113 LOTUS

112 Lotus leguminibus ſæpius ſolitariis, angulis quatuor membranaceis foliis floralibus ovatis. *Linn.*

Lotus humifuſus ſiliquâ acutè quadragonâ terminatrice, ſtipulis ovalibus.

Lotus ruber ſiliquâ anguloſâ. *C.* B. *Tetragonolobus. Rivini.*

113 Lotus caule erecto leguminibus ſolitariis rectis terminatricibus.

Lotus pratenſis ſiilquoſa lutea. *C. B.* Folia tomentoſa. *A Gramont, & à Lates.* Legumina non ſunt alata nec axillaria.

114 Lotus pentaphyllos major hirſutie candicans. C. B. Ad fontem Piquet.

115 Lotus pentaphyllos fruteſcens tenuiſſimis glabris foliis. *C. B.* ?

116 ONONIS floribus ſubſeſſilibus ſolitaris lateralibus, caule ſpinoſo. *Linn.*

Anonis ſpinoſa flore purpureo. *C.* B. Anonis vaginis foliorum ampliſſimis ramo quolibet in ſpinam terminato. *Haller.* Junior planta eſt inernis variat flore albo. Folia ſimplicia & ternata.

117 Oononis pedunculis unifloris ſetâ terminatis, foliis ternatis.

Anonis viſcoſa ſpinis carens lutea major. *C. B.* Natrix Plinii. Caulis glaber, folia omnia ternata oblonga, ſtipulata, ſiliquis pendulis.

118 Ononis pedunculis unifloris ſetâ terminatis foliis ternatis & ſimplicibus.

Anonis ſpinis carens lutea minor. B. *M.* Foliola ovalia terna & in eadem planta plura ſunt ſimplicia cum ſtipulis decurrentibus.

119 Ononis trifolia, calycibus ad axillas ſeſ-

ſilibus erectis & ſtipulis longas ſetas exc-rentibus. Anonis puſilla glabra fruticans tri-foliis affinis. *J.* B. Ononis floribus latera-libus ſeſſilibus ſolitariis, petiolis longiſſi-mis. *Royen.* Folia omnia terna.

120 ONONIS trifolia, viſcoſa, hirſuta, pe-dunculis congeſtis, floribus pendulis.
Anonis minima hirſuta. *Cherleri.*

121 Ononis viſcoſa ſpinis carens, lutea, lati-folia, annua. B. *M.*

122 PSORALEA foliis omnibus ternatis, pe-dunculis ſpicatis, folio longioribus. H. *Upſ.*
Cytiſus incanus folio medio longiore. C. B.

B. *TRIFOLIATÆ SINE STIPULIS.*

123 CYTISUS calycibus hirſutis trifidis obtu-ſis ventricoſo-oblongis pedunculis ſimplici-bus. *Linn.* Cytiſus hirſutus. *J.* B.

124 Cytiſ. . . foliolis ovato-oblongis, racemis ſimplicibus pendulis. *Linn.* Cytiſus alpi-nus latifolius flore racemoſo pendulo. *T.* *Laburnum.*

125 Cytiſ. . . floribus capitatis, ramis decum-bentibus. *Royen.*
Cytiſ. vij. ſpecies altera. *Cluſ.* folia & ſili-quæ hirſutæ.

126 Cytiſ. . . ramis humifuſis albidis, floribus capitatis terminantibus, foliolis ovalibus glabris aggeſtis.
Cytiſus montis calcaris. *J. B.* flores lu-tei. *Au Vigan.*

127 Cytiſ. . . foliis ovato-oblongis racemis ſimplicibus erectis. *Linn.*
Cyt. glaber nigricans. *C. B.*

128 CYTISUS foliis ſæpius ſeſſilibus calycibus ſquammulâ triplici auctis. *Linn.* Cytiſ. glabris foliis ſubrotundis pediculis breviſſimis. *C. B.* Caules teretes, flores terminantes, aggeſti lutei. Folia & foliola quandoque petiolata, rami nigricantes.

129 Cytiſ. . . caule erecto ſtriato ſiliquis lateralibus & foliis hirſutis. Cytiſ. Monſpeſſulanus medicæ folio ſiliquis denſe aggeſtis & villoſis. *T.* Siliquæ rectæ, confertæ, villoſæ, foliola ovalia incana tomentoſa, rami ſtriati, folia ſubſeſſilia flores lutei. *à Gramont.*

130 Cytiſ. . . acaulis floribus ſolitariis, foliolis ſericeis lanceolatis. Cytiſ. humilis argenteus anguſtifolius. *T.*
Trifolium argenteum floribus luteis. B. *J.* *à la Colombiere.*

131 Cytiſ. . . glaber ſiliquâ latâ *J.* B. Foliola ſeſſilia cordato-trigona glabra, rami teretes. *à Alais.*

132 HEDYSARUM foliis radicalibus ſimplicibus, caulinis ternatis, floribus laxe ſpicatis, leguminibus undulatis. *Linn.*
Hedyſarum triphyllum canadenſe. *T.*

133 SPARTIUM ramis inermibus angulatis, foliis ternatis & ſolitariis. *Linn.* Cytiſogeniſta ſcoparia vulgaris. *T. A l'Eſperou. Gineſſes.*

134 Spartium ramis ſpinoſis anguloſis, foliis ternatis. *Linn.* Cytiſus ſpinoſus. *T.* Acacia trifolia. *C. B. Vers ſaint* Hyberi, *& au bois de Can-diac.*

135 ANAGYRIS. *Linn.*
Anagyris fætida. *C.* B. *Vers Arles.*

136 PHASEOLUS radice annuâ caule volubili, leguminibus pendulis compreſſis toroſis. *Roy.* Phaſeol. vulgaris. *Lob.* Ic. *Haricot. Mongets.*

137 PHASEOLUS caule erecto lævi, leguminibus erectiuſculis compreſſis rugoſis. H. *Upſ.* Smilax ſiliquâ ſurſum rigente. *C.* B.

138 Phaſ. . . puniceo flore. *Cornut.*

139 Phaſ. . . caule erecto tereti, floribus capitatis, leguminibus cylindraceis horizontalibus. L*inn.* H*aricot de Zeilan.*

140 Phaſ. . . caule volubili, floribus ſubcapitatis, ſeminibus tetragono-cylindricis pulverulentis. *Linn.*

Phaſ. peregrinus flore roſeo, ſemine tomentoſo. *Niſſole.*

141 Phaſeol.. . caule recto anguloſo hiſpido. *Linn.* Mungo Perſarum, Max Hiſpanorum.

142 Phaſeol. . . radice perenni ſubrotundâ, leguminibus folio longioribus teretiuſculis glabris. *Royen.*

Phaſ. . . cochleato flore *Rivin. Caracalla.*

143 ORNITHOPUS foliis ternatis ſubſeſſilibus appendiculatis, impari maximo. *Linn.* Ornithopodium poſtulacæ folio. *T.*

144 DOLICHOS leguminibus acinaciformibus dorſo ſulcatis. L*inn.* Semen album membranulâ incluſum.

145 Dolich. . . leguminibus ovato-acinaciformibus, ſeminibus ovatis hilo verſus alteram extremitatem arcuato cinctis. *Royen.* Phaſ. Ægyptiacus nigro ſemine. C. B. Lablab. *Cluſ.*

146 Dolich. . . caule perenni lignoſo. *Linn.* H*aricot des Indes.*

147 CLITORIA foliis ternatis calycibus campanulatis. H. *Upſ.* H*aricot du Breſil.*

C. *DIGITATÆ BIFOLIÆ LEGUMINOSÆ.*

148 LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis

diphyllis, radicibus etiam ſub terrâ fructificantibus. *Linn.* Vicia ſiliquas infrà ſupraque terram fructum edens. *C. B.* *Au Tarail à la Colombiere.*

149 LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus compreſſis ovatis. dorſo bimarginatis. *Linn.* Lathyr. ſativus flore fructuque albo. C. B. Folia lanceolato-linearia, ſtipulæ ovatæ caudatæ, caules membranacei, flores purpurei, phænicei.

150 Lathyrus pendulis unifloris, cirrhis diphyllis foliolis linearibus, ſtipulis ſubulatis caulibus nudis. Lathyr. anguſtifolius humilior. B. *M.* fl, phænicei.

151 Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis capillaceis.
Lathyr. anguſtiſſimo ſive capillaceo folio. *C. B.* Fl. purpurei, ſiliquæ decaſpermæ pedunculi ſetâ longâ terminati.

152 Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolato-linearibus, internodiis membranaceis. Lathyri ſpecies lutea. *J.* B. legumina oblonga acuta, triſperma, dorſo bimarginata, foliola nervoſa. Varietas ſativi?

153 Lathyrus pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lineari-lanceolatis leguminibus hirſutis, ſeminibus ſcabris. *Royen.* Lathyr. ſiliquâ hirſutâ. *J. B.*

154 Lathyrus pedunculis multifloris cirrhis diphyllis, foliolis gramineis trinerviis, internodiis membranaceis. Lathyr. Major Narbonenſis anguſtifolius *J. B.* 2. 304. Fores ampli 7. vel 8. purpurei, ſtipulæ lanceolato-lineares *Vers Sommieres.*

155 Lathyrus pedunculis multifloris cirrhis di-

phyllis foliolis lanceolatis internodiis nudis. *Linn.* Lathyr. ſylveſtris luteus foliis viciæ. C. B. *à Gramont.*

.156 LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ovalibus, radice tuberoſâ. *Linn.* Lathyr. arvenſis repens tuberoſus. *C. B. Glands de terre.* Caules nudi anguloſi, flores rubelli odori, tubercula edulia. *à Lates.* In ultimis pratis juxta viam.

157 Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis internodiis membranaceis. *Linn.*
Lathyrus latifolius. *C. B.* Clymenum. *Mathiol.*

D. *TRIFOLIATÆ FOLIOLIS SUBDIVISIS floribus polypetalis anomalis.*

158 RESEDA foliis omnibus trifidis infimis laciniatis. *Linn.*
Reſeda vulgaris. *T.*

159 Reſeda foliis integris trilobiſve calycibus maximis hexaphyllis *H. Upſ.* Reſeda minor vulgaris. *T. Phyteuma* Monſpel.

160 Reſeda foliis aliis integris, aliis trilobis, calycibus exiguis.
Reſeda Ægyptiaca odoratiſſima. *Granger.*

.161 FUMARIA caule ſimplici diphyllo, floribus calyce deſtitutis. *Linn.*
Fumar. bulboſa, radice non cava major. C. B. *Fumeterre. à l'Eſperou.*

.162 Fumar. . , foliis cirrhiferis, floribus ſpicatis. *Linn.*
Fumaria claviculis donata. C. *B. aux Rochers de Mijoulan, après St. Jean de Vedas.*

163 CARDIOSPERMUM. *Linn. Cœur Indien.* Corindum. *T.*

164 LEONTICE. *Linn.*
Leontopetalon. *T.* Folia trifoliata, foliis terminantibus heptaphyllis, lateralibus pentaphyllis, foliolis ſubrotundis. Radix globoſa, petala ſex ſtamina, ſex flos regularis.

ORDO VI.

Digitatæ Floribus compoſitis.

A. FLOSCULOSIS.

165 EUPATORIUM foliis digitatis. *Linn.* *Eupatoire.*
Eupat. cannabinum. *C. B.* Folia ternata ac quinata.

166 BIDENS coronis ſeminum retrorſum aculeatis, ſeminibus erectis. *Linn.* Bidens foliis tripartito-diviſis. Cæſalp. *à la Roubine de Lates.* Ceratocephalus tripteris ac pentapteris. *Vaillant.*

B. FLORIBUS RADIATIS.

167 VERBESINA foliis pinnato digitatis foliolis lanceolatis. Bidens anagyridis folio. *D. Juſſieu.* Folia ternata ac quinata.

CLASSIS VIII.

Plantæ palmatæ.

GAudent foliis ſimplicibus, ut plurimùm ſparſis, ſed quorum nervi tres vel plures ex petiolo radiatim in diſcum lobatum excurrunt; vel gerunt hæ Plantæ folia ab apice verſus baſim diſſecta; ita ut ſegmenta proprio petiolo careant undè diſcrepant à digitatis.

ORDO I.

Palmatæ apetalæ.

A. HERBACEÆ.

1 ALCHEMILLA foliis palmatis. *Linn.* *Pié de Lion.*

2 APHANES. *Linn.* Percepier Anglor. Alchimilla montana minima. *T. à Boutonet.*

3 LUPULUS. *T.* mas fœmina. *Le Houblon.*
Lupulus. *T.* folia oppoſita, ſæpè triloba, lobis ovatis, ſerratis, ſtipulis bifidis.

4 ARUM foliis palmatis foliolis lanceolatis integerrimis ſpatham ſpadice clavato longiorem

giorem ſuperantibus. *Linn.* dracunculus polyphyllus *Boerh.* La *Serpentaire.*

B. *FRUTICOSÆ.*

5 RICCINUS foliis peltatis palmatis ſerratis petiolis glanduliferis. *Linn.*
Riccinus, gallis palma Chriſti, *Lobel.*

6 PLATANUS foliis palmatis. *Linn.* P*latane*, ou *Plane.*
Platanus Orientalis. *Parkinſon.* Folia trinervia, quinqueloba.

7 Platan. . . foliis lobatis. *Linn. Platane de Virginie.*
Plat. Occidentalis. B*oerh.*

8 FICUS foliis palmatis. *Linn. Figuier.*
Ficus communis. C. B. Variat.
Fructu præcoci pallide virenti intus roſeo. *Figue fleur griſe.*
Fructu præcoci ſubrotundo albido, ſtriato, intus roſeo. *Cordeliere.*
Fructu parvo ſerotino albido intus roſeo, cute lacerâ, *Figue de Marſeille.*
Fructu viridi longo pediculo inſidente. *Figue verte.*
Fructu flaveſcente intus ſuaverubente. *La groſſe jaune.*
Fructu intus & extus flaveſcente. *Figue medot.*
Fructu parvo fuſco intus rubente. *Coucourelle.*
Fructu minori violaceo oblongo, cute lacerâ. *Figue violette.*
Fructu atrorubente polline cæſio adſperſo. B*ourjaſſote.*

. 9 MORUS foliis cordatis hiſpidis. *Linn.* Androgyna, & fæmina. *Murier noir.*
Morus nigra. *J. B.* Sylveſtri folia palmata, ſativæ integra.

. 10 Mor. . . foliis oblique cordatis lævibus. Androgyna.
Morus alba. J. B. *Meurier blanc.*

. 11 POPULUS foliis palmatis ſubtus tomentoſis, ſæpe trilobis.
Pop. alba latifolia. *Lobel. Le long du Lez.*

. 12 QUERCUS foliis pinnato-ſinuatis lævibus, fructu ſeſſili. *Linn.*
Quercus latifolia mas quæ brevi pediculo eſt. *T. Chêne blanc.*

ORDO II.

Palmatæ floribus monopetalis regularibus.

A. *HERBACEÆ CUCURBITACEÆ.*
Vide ſupra pag. 112. *à* 207. *ad* 219.

13 CUCURBITA folia multipartitis. *Linn. H. Upſal. Citrouille.*
Anguria citrillus dicta. *C. B.*

14 CUCUMIS foliis multifidis, pomis globoſis, glabris. *H. Upſal. Coloquinte.*
Colocynthis. Offic.

15 Cucumis foliis palmato-ſinuatis pomis ſubovatis echinatis. H. *Upſal.*

Cucumis Sylveſtris Americanus anguriæ folio. *Plukn.*

16 MOMORDICA pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris, patenti-palmatis. *Linn.* Balſamina rotundifolia repens. *C. B. Pomme de merveille.*

17 Momord. . . pomis angulatis tuberculatis, foliis villoſis longitudinaliter palmatis. Mem. Zeilanica. *T.*

18 BRYONIA foliis palmatis, utrimque calloſe ſcabris. *Linn. Couleuvrée.* Bryonia aſpera ſive alba baccis rubris. *C. B.*

19 Bryon. . . foliis palmatis, ſupra calloſe punctatis. *Linn. Bryoine du* Levant.

20 Brion. . . foliis palmatis ſcabris, laciniis lanceolatis, ſerratis, lateralibus minimis. *Linn. Bryoine de Ceilan.*

MALVACEÆ COROLLIS *monopetalis quinquepartitis.*

21 XYLON foliis digitatis caule inermi *Fl. Zeil. Cotton de l'Ile de Java.* Xylon foliis digitatis caule aculeato. *Fl. Zeil.* Goſſipium arboreum caule ſpinoſo. *C.* B.

22 GOSSYPIUM foliis quinquelobis. H. *Upſ.* Goſſyp. herbaceum. *J. B.*

23 Goſſ. . . foliis trilobis integerrimis. *H. Upſal. Cotton des* Barbades.

24 LAVATERA caule arboriformi foliis ſeptem angularibus tomentoſis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillaribus. H. *Upſ.* Malva arboreſcens. *Dod. Mauve en arbre de Veniſe.*

25 LAVATERA caule fruticoſo foliis quinquelobo-haſtatis. H. *Upſal.*
Alth. fruteſcens folio acuto parvo flore. C. B. *D'Hieres en Provence.* Folia palmata ſeptemloba.

26 Lavat. . . caule herbaceo, fructibus denudatis, calycibus inciſis. H. *Upſ.*
Althæa flore majore. *C.* B.

27 Lavat. . . foliis ovato-lanceolatis inferne angulatis pedunculis unifloris caule herbaceo. *Royen.*

28 MALVA foliis angulatis criſpis, floribus axillaribus glomeratis. *Linn. D. Niſſole.* Invenit.
Malva criſpa. *J. B.*

29 Malva foliis multifidis caule repente. *Linn.*
Abutilon repens alceæ folio, flore helvolo. *Dillen.*

30 Malva caule erecto foliis multipartitis. *Linn.*
Alcea vulgaris major flore candidiore. *T.*

31 Malva caule erecto foliis ferme palmatis, obſolete ſerratis. *Linn. Mauve.*
Malva vulgaris flore majore folio ſinuato. *T.*

32 Malva caule repente foliis cordato-orbiculatis obſolete quinquelobis. *Linn.*
Malva vulgaris flore minore folio rotundo. *J. B.*

33 Malva foliis quinquepartitis, laciniis linearibus bis tripartitis.
Alcea tenuifolia criſpa. *J.* B. ima folia ſubrotunda.

34 ALTHÆA foliis infimis palmatis, ſummis digitatis, caule fruticoſo. H. *Upſal.*
Alcea cannabina. *C.* B.

35 Althæa foliis trifidis hiſpidis. *Linn.*
Alcea hirſuta. C. B. *aux Capouladous. à la Colombiere.*

36 ALCEA foliis parmrto-digitatis. *Linn.* Alcea roſea hortenſis maxima folio ficus. *T.*

37 Alcea foliis ſinuato-anguloſis. *Linn. Mauveroſe.*
Malva roſea folio ſubrotundo. *C.* B. Variat flore pleno, candido, rubro, nigricante, violaceo, puniceo, luteo, incarnato &c.

38 MALOPE foliis ovatis crenatis glabris. *Linn.* folia quinquenervia, fere triloba.

39 HIBISCUS foliis cordato-quinquangularibus obſolete ſerratis. *Linn.*
Althæa arborea roſa ſinenſis. *Moriſſon.*

40 Hibiſcus foliis peltato-cordatis ſeptemangularibus, ſerratis, hiſpidis. *Linn.*
Moſch. ſeu bammia moſchata *Pr. Alpin.*

41 Hibiſcus foliis palmato-digitatis, ſeptempartitis. *Linn.*
Kermia folio manihot ſerrato. *Dillen.*

42 Hibiſcus foliis tripartitis inciſis, calycibus inflatis capſulam obtegentibus. *H. Upſ.*
Kermia veſicaria vulgaris. *T.* Trionum. *H. Cliff.*

43 SIDA foliis palmatis, laciis lonceolato attenuatis. *Linn.*
Malva aceris folio virginiana. *T.* Laciniis iſocelibus.

C. *PALMATÆ VARIÆ.*

44 CHAMÆROPS frondibus palmatis plicatis petiolis ſpinoſis. *Linn.* Palma Dactilifera. Boer. *Dattier.*

45 Chamærops frondibus palmatis plicatis, inermibus. *Linn.*

45 JATROPHA foliis palmatis dentatis aculeatis. H. *Cliff. Manihot du Breſil.*

46 Jatropha foliis multipartitis lævibus ſtipulis ſetaceis multifidis. *Linn.*
Riccinoides Americana arbor folio multifido. *T.*

47 Jatropha aculeata, caule herbaceo, foliis trilobis. *Royen.*
Juſſiena herbacea ſpinoſiſſima &c. H*ouſton.*

48 CONVOLVULUS calycibus tuberculatis piloſis. *Linn.*
Convolv. cæruleus herbaceo folio anguloſo. *T. Nil Arabum.* Folia ima cordata, ſumma triloba.

49 Convol. . . foliis cordato-digitatis ſericeis, foliolis linearibus, intermediis duplo longioribus. *Linn.* Convolv. betonicæ folio. B. *M. à Sete près le Fort.*

50 Convolv. . . foliis digitatis piloſis caule hiſpido. *Royen.*
Ipomæa *Fl. Zeilan.*

51 CORYPHA frondibus pinnato-palmatis plicatis interjecto digitis filo. *Linn.*
palma Zeilanica tala dicta. *Burman.*

52 VERONICA foliis imis quinquepartitis, floribus ſolitariis. *Linn.*
Veronica trifido vel quinquefido folia. *T.*
Près Caunelle en Avril ou Mars.

53 OPULUS. *Linn.* Ruelli. *Obier.*
Folia triloba, lobis dentatis.

ORDO III.

Pælmata flore monopetalo anomalo.

54 LEONURUS foliis caulinis lanceolatis trilobis. L*inn.* *Agripaume.* *Cardiaca.* J. B. Variat foliis dentato ſerratis undulatis unde cardiaca criſpa. *Raii.* Folia ima utrique multifida.

55 MOLUCELLA calycibus ſeptemdentatis. *Royen.* Molucca ſpinoſa. *Dod.*

56 Moluc. . . calycibus quinquedentatis, denticulis æqualibus. L*inn.* Mol. lævis. *Dod.*

Vide adverſifolias.

57 TEUCRIUM foliis ſimpliciter trifidis. L*inn.* Chamæpithis lutea vulgaris. *C.* B. *Ivette.*

58 Teucrium foliis aliquoties trifidis, floribus verticillatis. L*inn.* Chamædrys foliis laciniatis. L*obel.* *à l'Eſperou, en deſcendant à Meyrüeis.* Folia pinnata, pinnis obtuſe trifidis.

Na. Verbena, ſclaræa foliis laciniatis, ad ultimam Claſſem attinent.

ORDO IV.

Palmatæ Floribus polypetalis regularibus.

A. HERBACEÆ.

59 HEPATICA. *Linn. Fleur de la Trinité.* Ranunculus tridentatus vernus flore ſimplici cæruleo (vel albo). *T.* Lobus foliorum quandoque trilobus, folia ipſa triloba.

60 RANUNCULUS fructu oblongo foliis infimis palmatis, ſummis digitatis. *Linn.* Ran. paluſtris apii folio lævis (& lanuginoſus) *T.*

61 Ranunc. . . ſeminibus aculeatis, foliis ſimpliciter palmatis inciſis. L*inn.*
Ran. paluſtris echinatus. *C.* B.

62 Ranunc. . . foliis radicalibus reniformibus crenatis, caulinis digitatis ſeſſilibus. L*inn.*
Ran. nemoroſus ſylvaticus folio ſubrotudo *C. B. à l'Eſperou.*

63 Ranunc. . . calycibus hirſutis caule bifloro, foliis multifidis. *Linn.* H. *Upſ.*
Ron. montanus purpureus calyce villoſo. J. B.

64 Ranunc. . . calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis, ſummis linearibus. H. *Upſ.*
Ran. prat. erectus acris. *C.* B. Ran. magnus valde hirſutus. J. B.

66 Ranunc. . .

66 RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, foliis multipartitis *H. Upſal.*
Ran. ſylveſtris *Tabern.*

67 Ranunc. . . calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, ſtolonibus repentibus, foliis compoſitis. H. *Upſal.*
Ranunc. prat. repens hirſutus. *C.* B.

68 Ranunc. . . calycibus retroflexis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, foliis compoſitis. H. *Upſal.*
Ran. prat. radice verticilli modo rotundâ. *C.* B.

69 Ranunc. . . foliis filiformi-ramoſis, calycibus appendiculatis. H. *Upſal.*
Ran. ceratophyllus ſeminibus falcatis in ſpicam adactis. *Moriſſon.*
Melampyrum perpuſillum luteum. *Dalech.*
Myoſurus foliis ramoſis. H. *Cliff.*

70 Ranunc. foliis tripartitis laciniatis, caule inferne ramoſo, radice tuberoſâ. H. *Cliff.*
Ranuncul. grumoſa radice (5-10) *C. B.*
Renoncule de Conſtantinople.

71 Ranunc. . . ſeminibus aculeatis, foliis ſimplicibus palmatis inciſis. H. *Cliff.*
Ran. ſtellatus echinatus creticus. *C.* B.

72 Ranunc. . . foliis ſubmerſis capillaceis *Fl. Suec.*
Ran. aquaticus folio rotundo (trilobo) & capillaceo. *C. B.*

73 Ranunc. . . foliis radicalibus cordato ſubrotundis, caulinis tripartitis ſeſſilibus lanceolatis integerrimis. *Royen.*
Thora foliis cyclaminis. *J.* B. *La Thore des Vaudois.*

73 Ranunc. . . caule aphyllo unifloro foliis

rotundis ſemitrifidis. H*aller*.
An. Ranunc. minimus ſaxatilis hirſutus. *C. B.*
An Ranunc. ſaxatilis foliis ſubrotundis. C. B.
An. Ranunc. arvenſis parvus folio trifido. *C. B.*

74 PULSATILLA foliis palmatis. L*inn.*
Anemone Hortenſis latifolia 1. *Cluſ.*

75 Pulſ. foliis digitatis. *Linn.*
Anemone geranii rotundo folio purpuraſcens. *C. B.*
Vide Anemones inter pinnatifidas. Claſſ. 11.

76 HELLEBORUS foliis angulatis multifidis flore globoſo. *Linn.*
Helleb. uniflorus petalis & ſiliquis plurimis. H*aller.*
Trollius rupp. Seguer. Pl. Veron. *à l'Eſperou.*

77 GERANIUM pedunculis unifloris. L*inn.*
Brec de Grue.
Geran. ſanguineum maximo flore. *C. B.* *à la taillade de Gignac.* Folia peltata, quinque partita villoſa. Geran. petræum cicutæ folio, radice craſſâ, fætidum. B. *M.* Idem videtur ex herbario Magnoliano.

78 Geran. . . pedunculis bifloris foliis ſubrotundis multifidis, caule procumbente. *Linn.*
Geran. folio malvæ rotundo. *C. B.* Folia ſemiquinquefida villoſa ſegmentis trilobis.

79 Geran. . . pedunculis bifloris, foliis quinque partito - multifidis angulatis, laciniis acutis, capſulis glabris. *Flor. Suec.*
Ger. columbinum foliis diſſectis, pediculis florum longiſſimis. *Vaillant.*

80 GERANIUM pedunculis biſloris foliis quinquepartito-multifidis rotundatis, laciniis obtuſiuſculis, capſulis hirſutis. *Linn.* Geran. columbinum villoſum petalis bifidis purpureis. *Vaillant.* Variat odore moſchato.

81 Geran... pedunculis biſloris, foliis (ſparſis) reniformibus ſemiquinquefidis, mollibus & latiſſimis. *Haller.* Geran. columbinum minus majori flore & foliis florum bifidis. B. Monſp. poteſt vocari Geranium foliis alternis. Quia omnia alia foliis oppoſitis gaudent.

82 Geran... pedunculis bifloris calycibus pyramidatis anguloſis, rugoſis, quinquelobis rotundatis. *Linn.* Geran. lucidum ſaxatile. *C.* B. Ger. pedunc. bifloris, foliis ſubrotundis ſemiquinquefidis rariter & longe piloſis. *Haller.* ſegmenta foliorum triloba. *Vers grabels.*

83 Geran... pedunculis bifloris foliis ſubrotundis ſemiſeptemfidis, caule erecto, umbellato, flore minimo. *Haller.* Ger. columbinum majus flore majore cæruleo. *T.*

84 Geran... calycibns monophyllis, follis orbiculatis, palmatis, inciſis, piloſis, caule herbaceo. *Linn.*
Ger. africanum alchimillæ folio hirſuto floribus albidis. *Boerh.*

85 Geran. pedunculis bifloris foliis peltatis multifidis caule erecto. *Linn.*
Geran. batrachioides aconiti folio. *T.* Petala bifida, folia radicata, ſolitaria, longe petiolata incana.

86 Geran... foliis ſemiquinquelobis ſericeis, floribus ſpicatis ex atro purpureis. *Haller.*
Geran... phæum ſive fuſcum petalis rec-

tis ſeu planis. *T.* pedunculi alterni, caulis erectus ſurperne ſubnudus.

87 Geran. . . pedunculis bifloris, foliis caulinis trilobis integris ſerratis, ſummis ſubſeſſilibus. *Linn.* Geran. nodoſum. *C. B. Au ſortir de Meyrueis à gauche de la Riviere.*

88 Geran. . . pedunculis biſloris foliis multipartitis laciniis linearibus ramoſis patulis obtuſis. *Linn.* Geran. tuberoſum majus. *C.* B.

89 PEGANUM. *Linn.*
Harmala. *Dod.* Folia multipartita ſeſſilia; laciniis linearibus.

90 SAXIFRAGA foliis quinquedigitatis obtuſis ſubrigidis, annoſis verticillatis. An ſedum tridactylites alpinum minus. *C.* B. *à Meyrueis.* Folia denſa ſeſſilia, apice dilatata præſecta, caulem inferne cingunt, ſuperne nudum pauciflorum, annoſa ruſſa perſiſtunt, cauliculi procumbunt.

91 Saxifraga prucumbens foliis linearibus integris trifidis & quinquefidis. *Royen.* Folia infima integra, media trifida, ſumma quinquefida, omnia latiora quam ſequenti. *à l'Eſperou.*

92 Saxifraga procumbens foliis linearibus integris & trifidis. *Linn.*
Saxifrag. muſcoſa folio trifido. *T.* Huic folia infima integra, reliquis omnibus trifidis. *à l'Eſperou.*

93 Saxifraga foliis trilobis baſi anguſtis, caule erecto. *Royen.*
Saxif. verna annua humilior. *T.* Omnia folia triloba ſunt, exceptis ſummis caulinis, quæ linearia. Sedum tridactylites tectorum. *C. B.*

94 SAXIFRAGA caule paucifloro, foliis ſubhirſutis, lingulatis & tridentatis. *Haller.*
Sedum alpinum flore pallido. *Garidel. Aux Capouladous près les Cambrettes.*

95 ASTRANTIA foliis quinquelobis, lobis tripartitis. *Haller.*
Aſtr. major coronâ floris purpuraſcente. *T.*
Aſtrantia foliis digitatis ſeptenis integris dentatis. *Haller.*
Aſtr. minor. *T.*

96 SANICULA. Cæſalp. *La Sanicle.*
Folia palmato-digitata, foliolis quinis inciſis ovali-lanceolatis. *Autour d'Alais.*

97 ERYNGIUM foliis radicalibus ſubrotundis plicatis ſpinoſis, floribus pedunculatis. *Linn.*
Eryng. maritimum. C. B. Folia caulina ſunt palmata, lacinulis acutis. *à la Plage.*

B. *FRUTICOSÆ.*

98 BAUHINIA caule aculeato. H. *Cliff.*

99 Bauhinia foliis quinque nerviis, lobis acuminatis remotiſſimis. H. *Cliff.*

100 PASSIFLORA foliis bilobis baſi emarginatis petiolatis. *Linn.*
Granadilla flore ſuaverubenti folio bicorni. *Plumer.*

101 Paſſiflora foliis bilobis oblongis tranſverſis amplexicaulibus. *Linn.*

102 Paſſiflora foliis trilobis oblongis ſubtus punctatis intermedio minore. *Linn.*
Paſſiflora foliis trilobis peltatis. *Linn.*

103 PASSIFLORA foliis palmatis integerrimis. Linn. Paſſiflora. *Plukn. Fleur de la Paſſion.*
Flos paſſionis major pentaphyllus. Sloan. colitur in hortis noſtris.

104 Paſſiflora foliis palmatis ſerratis. *Linn.*

105 Paſſiflora foliis trilobis ſerratis. L*inn.*
Granadilla Hiſpanis flos Paſſionis Italis. *T.*

106 VITIS foliis palmato-angulatis. L*inn. Vigne. Treille.*
Vitis ſylveſtris labruſca dicta. C. B. *Vigne ſauvage.*
Vitis Corinthiaca ſive Apyrina *J.* B. *Raiſin de Corinthe ſans Pepin.*
Vitis apiana. C. B. *Muſcat.*
Dantur Monſpelii plus quam triginta varietates. Quadraginta ſex recenſuit Garidellus.

107 RIBES inerme floribus oblongis monogynis. L*inn. Caſſis, Caſſier.*
Ribes nigrum vulgò dictum folio olente. *J. B. à Meyrueis.*
Ribes inerme folio & nigro fructu maximis olentibus. H*aller.*

108 Ribes inerme floribus planiuſculis racemis pendulis *Linn. Haller.*
Rib. vulgare acidum rubrum. *C.* B. *Groſelier.* Folia quinquelobba ſubrotunda.
Ribes inerme floribus planiuſculis racemis erectis. *Linn.*
Rib. alpinum dulce. *J.* B.

109 Rib. ramis aculeatis erectis, fructu glabro. L*inn.* Folia quinqueloba, lobis acutis, ſerratis.

Groſſularia ſimplici acino, vel ſpinoſa ſylveſtris. *C. B. Bleüet.*

110 RIBES ramis aculeatis reclinatis. *Linn.*
Groſſul. fructu obſcure purpuraſcente. *Cluſ.*

111 Ribes ramis aculeatis erectis fructu hiſpido. *Linn.*
Groſſul. fructu maximo hiſpido, margaritarum fere colore. *Raii.*
Quid eſt groſſularia non ſpinoſa. *B. M. Au Puy de ſaint Loup vers le Nord.*

112 HEDERA foliis lobatis & ovatis. *Linn.*
Hedera arborea. *C.* B. *Lierre*, *Eune*, *Eure.* Folia quinquenervia.

113 RUBUS caule bifolio unifloro, foliis ſimplicibus. *Linn.*
Chamærubus foliis ribes. *C. B.*

114 Rubus caule inermi multifolio multifloro, foliis palmatis. *Linn.* Rub. odoratus. *Corn.*

115 CRATÆGUS foliis obtuſis bis trifidis. *Linn. Aubepin.*
Meſpilus apii folio ſylveſtris ſpinoſa, ſeu oxyacantha. *C. B.*
Fructu dipyreno, rubro. *Pomets.* Datur arborea vix ſpinoſa. *Près Lunel.*

116 Crat. . . folio ſeptemangulo ſubtus ſubhirſuto. *Haller.*
Cratægus foliis laciniatis. *T.* Folia palmato-loba, lobis acutis, ſerratis.
Fructu cerei coloris. *Près Alais.*

117 ACER foliis trilobis integerrimis. *Erable de Montpellier.*
Acer. trifolia. *C. B.* Lobi curvilinei. *à Caſtelnau.*

118 Acer foliis quinquelobis acuminatis, acuteque dentatis, *Fl. Suec.* A. Fol. quinquangulis acutiſſimis raró dentatis. H*all.*
Acer platanoides Munt. *Faux Sycomore.*

119 Acer foliis quinquelobis acutis obtuſe ſerratis, petalis canaliculatis. *H. Upſal.*
Acer foliis quinquangulis undique ſerratis. H*aller. aux Capouladous.*
Acer montanum candidum. *C.* B.
Acer latifolium. *Cluſ. Grand Erable.*

120 Acer foliis ſemitrilobis, lobis obtuſe incifis. H*aller.*
Acer foliis tripartito - palmatis laciniis utrimque emarginatis obtuſis, cortice ſulcato. *Linn.*
Ac. campeſtre & minus. *C.* B. *Entre Valene & Viols.*

ORDO V.

ORDO V.

Palmatæ floribus polypetalis anomalis.

A. *FOLIOLIS SUBDIVISIS.*

121 ACONITUM foliis peltatis multifidis petalo ſupremo cylindraceo. *Linn.* Acon. lycoctonum luteum. *C. B.* Folia ſeptemfida lacinulis bis trifidis.

122 Acon. . . foliis multifidis, laciniis ſemipartitis, ſuperne latis. *Linn.*

123 Acon. . . cæruleum minus ſive napellus minor *C. B.* naſus galeæ ſimus acuminatus.

124 Aconit. . . foliorum laciniis linearibus lineâ excavatis. *Linn. Aconit, Napel.* Acon. cæruleum ſive napellus. 1. *Dod.* Radix bulboſa, ſed ſine tuberculis ſuperne. *A Louzere aux Prairies de l'Hoſpitalet. à l'Eſperou.*

125 Acon. . . foliorum laciniis linearibus ubique ejuſdem latitudinis. *Linn. Anthora.* Aconit. ſalutiferum ſive Anthora. *C. B.* Radix orchidis bulboſa, cum tuberculis ſupra bulbos binos; flos pallidè flaveſcens.

126 DELPHINIUM caule ſubdiviſo, nectariis monophillis. *Linn. Pié d'Alouete.* Delph. radice fibroſâ, foliis tenuiſſime di-

viſis. *Haller.*
Delph. ſegetum flore cæruleo (albove). *T.*

127 DELPHINIUM caule ſimplici nectariis monophyllis. *Linn.*
Delphin. hortenſe (10-19) *Boerh.*

128 Delph. . . nectariis diphyllis, foliis palmatis, laciniis fere integris. *Linn.*
Delph. platani folio Staphyſagria dictum. *T. Staphys-aigre. à Aſſas.*

129 Delph. . . radice cavâ foliis latioribus trilobatis. *Hall.*

130 Delph. . . nectariis diphyllis, labellis integris, floribus ſubſolitariis, foliis compoſitis lineari-multipartitis. H. *Upſal.*
Delph. luſitanicum glabrum aconiti folio. *T.*

131 Delph. . . nectariis diphyllis, labellis bifidis apice barbatis, foliis inciſis caule erecto. *H. Upſ.* Aconit. cæruleum hirſutum ſeu conſolida regalis. *C. B.*

B. *FOLIOLIS INTEGRIS, FLORIBUS LEGUMINOSIS.*

132 DORYCHNIUM. *Lobel. Embriaigue.*
Dorych. foliis digitatis ſeſſilibus. *Linn.*
Folia quina, quaterna, linearia, flores albi.

133 TRIFOLIUM capitulis dimidiatis foliis quinatis ſeſſilibus, leguminibus polyſpermis. *Linn. Lupinaſter* Buxbaum.

134 LUPINUS calycibus alternis abſque appendiculis. *Linn.* Lup. ſativus flore albo. *Cluſ.*

135 Lupin. . . calycib. alternis utrimque appen-

diculatis. *Linn.* Lup. ſylveſtris flore purpureo. *C. B.*
Lup. calycibus utrimque reflexis, foliolis ſeptenis linearibus. *à Gramont.*

136 Lupin. . . calycibus verticilatis, labio inferiori trifido. *Linn.* Lup. ſylveſtris flore luteo. C. B.

137 Lupin. . . calycibus verticillatis labio inferiori integerrimo. *Linn.* Lupin. exoticus hirſutiſſ. *J. B.*

138 Lupin. . . calycibus alternis labio inferiori bifido, foliolis quinis ſpatulatis.
Lupin. flore purpuraſcente latifolius hirſutus. *C. B.*

139 Lupin. . . calycibus verticillatis trifoliis foliis linearibus ſeptem linearibus ſeptenis.
Lupin. ſylveſter purpureo flore *J. B. A Gramont.*

ORDO VI.

Palmatæ floribus compoſitis Floſculoſis.

140 XANTHIUM ſpinis triplicibus. *Linn.* *Lampourde de Portugal.*
Xanth. luſitanicum laciniatum validiſſimis ſpinis munitum. *T. Elle eſt naturaliſée aux environs de Montpellier.*

CLASIS IX.

Plantæ pinnatæ.

ILlæ ſunt quarum folia ſaltem plurima ſunt pinnata ſeu conſtant ex rachi vel coſtâ communi quæ gerit hinc & inde petiolos foliolo ornatos in eodem plano poſitos. Si itaque in eodem plano ſint plura foliola ſaltem quatuor quorum petioli adnectantur hinc & inde lateraliter coſtæ communi, & non ſeorſim decidant foliola ſed cum coſtâ ſimul exſiccatâ delabantur, illud totum folium ſic compoſitum dicitur folium pinnatum. Vel pennatum aut penniforme quia in pennis ſunt plura fila hinc & inde poſita & rachi communi affixa.

Diſtinguuntur à foliis oppoſitis ſimplicibus in plantis humifuſis ex eo quod ramis non adhæreant foliola, ſed coſtæ deciduæ. A digitatis diſcrepant quod non è centro communi procedant pinnatarum foliola, ſed ex axi communi. Differunt à decompoſitis ex eo quod pinnatarum coſta petiolos ſimplices & non ramoſos ferant, demum à laciniatis pinnatifidis quia foliolis diſtinctis & petiolatis gaudent pinnatæ ſeſſilibus verò ut plurimum & non petiolatis ſegmentis laciniatæ.

Si foliolum impar terminet ſcalam petiolorum, folium dicitur pinnatum cum impari, vel *impari-pinnatum*, ſi deficiat impar foliolum ut in lentiſco, dicitur abruptè *Pinnatum*. Si foliola juxta coſtam poſita ſibi è diametro non reſpondeant, folium *Pennatum* potius vocatur.

ORDO PRIMUS.

Muſci pinnati.

1 JUNGERMANNIA foliis pinnatis indiviſis, foliolis ſimplicibus tridentatis æqualibus. *Fl. Lapp.*

2 Jungerm. . . foliis circinnatis auritis imbricatim diſpoſitis, ex viridi flaveſcentibus. *Michel.*

3 Jungerm. . . major foliis ſubrotundis tenuiſſime denticulatis. *Michel.*

4 Jungerm. . . foliis latiuſculis obtuſis undulatis & veluti anguloſis. *Michel.*

5 Jungerm. . . foliis oblongis acuminatis. *Michel.* Lichenaſtrum imbricatum minus. *Raii.*

6 Jungerm. . . repens foliis cordatis carinatis. *Michel.*

7 Jungerm. . . major repens foliis bifidis. *Michel.* Muſcus pennatus foliis ſubrotundis bifidis major. *T.*

8 Jungerm. . ſylvatica minor nigricans. *Ruppii.*

9 Jungerm. . . ſurculis lanceolatis pinnatis. Subramoſis planis. *Fl. Suec.*

10 Junger . . ſurculis pinnatis foliolis recurvis planis auriculatis. *Fl. Suec.*

11 Jung. . . quæ lichenaſtrum filicinum pennatum. *Dillen.*

12 Jung. . . quæ muſcus nummulariæ folio major. *T. au Vigan.*

13 Jung. . . quæ muſcus filicinus major. *Tourn.* Muſcus filicinus. *Tab.*

ORDO II.

Filices pinnatæ.

14 ASPLENIUM fronde pinnata, foliolis ſubrotundis crenatis. *Linn.* Trichomanes ſive polytrichum offic. *C.* B.

15 Aſpl... fronde pinnatâ, foliolis ovatis, margine ſuperiore gibbis inciſis. *Linn.* Filicula maritima ex inſulis Stæchadibus. *C. B. Aux Iles d'Hieres.*

16 POLYPODIUM fronde pinnatâ, foliolis lanceolatis integris ſerrulatis alternis connato-ſeſſilibus. *Linn.* Polypodium vulgare. *C. B. Vers Caſtelnau.*

17 Polyp... pinnatum pinnis bidentatis & tridentatis. *Haller.*
Dryopteris. *Dalech.* Filix ſaxatilis non ramoſa minima. *H. R. M.*

18 PTERIS fronde pinnatâ foliolis linearibus parallelis. *Royen.*
Polypodium anguſtifolium folio vario. *T.* Strutiopteris. *Haller. Près d'Alais.*

19 OSMUNDA ſcapo caulino unico; fronde pinnatâ ſolitariâ. *Flor. Suec.*
Oſmunda foliis lunatis. *T.* Lunaria botrytis. *à l'Eſperou.*

20 SALVINIA. *Michel.*

ORDO III.

Plantæ pinnatæ apetalæ.

A. FRUTICOSÆ.

21 FRAXINUS floribus nudis. *Linn.* *Frêne.* Qui ob folia oppoſita pertinet ad decompoſitas.

22 PISTACIA foliis abrupte pinnatis. *Linn.* Lentiſcus. Offic. *Lentiſque reſtencle.* Nullum eſt folium impar conjugationem terminans.

23 Piſtac. . . foliis impari-pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis. *Linn.* Therebintus vulgaris. *T.* *Terebinte. Pudis.* Foliolum impar terminat conjugationem.

24 Piſtacia foliis (ſæpius) ternatis. *Linn.* *Piſtachier.* Foliola ovalia impari majori, quandoque quina.

25 Piſtacia foliolis ſæpius quinatis ſuborbiculatis.
Therebint. major piſtaciæ folio. *Lobel.* *Au Bois de Valene.*

26 CERATONIA. *Linn.* *Carroubier.* Siliqua edulis. *T.*

27 JUGLANS foliolis ovalibus glabris omnibus ferme æqualibus. *Linn.* Nux juglans ſive regia vulgaris. *T.* *Noyer.* Foliola quina.

28 Jugl. . . foliolis ſerratis ovalilanceolatis. Juglans Americana fructu parvo olivæ formi. *Plum.*

29 ABIES foliis ſolitariis apice emarginatis. *Linn. Sapin.*
Abies taxi folio ſurſùm fructu ſpectante. C. *B. à Porte.*

30 Abies foliis ſolitariis apice acuminatis. *Linn. La Peſſe.*
Ab. tenuiori folio fructu deorſum inflexo. *C.* B.

31 TAXUS *J.* B. If.

B. *HERBACEÆ.*

32 DATISCA. *Linn.* Cannabina Cretica florifera. *T.* Foliola longe lanceolata ſerrata, herbacea eſt.

ORDO IV.

Pinnatæ monopetalæ regulares.

33 SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis. *Linn.*
Solan. tuberoſum eſculentum. *C. B. Taupinambours.*

34 SANGUISORBA ſpicis ovatis. *Linn.*
Sanguiſorba major pratenſis. *Rupii.*
Pimpinella ſanguiſorba major. *C.* B. Foliola oblongo - cordata.

35 Sanguiſorba ſpicis longiſſimis. *Linn.*
Pimpinella maxima Canadenſis alba ſpicata. *Cornut.*

36 POTERIUM inerme filamentis longiſſimis. *Royen.*
P. polyſtemon pinnis ovatis ſerratis ſpi-

câ

câ brevi. *Haller.*
Pimpinella ſanguiſorba minor hirſuta. C. B. *Petite Pimprenelle.* Foliola longiuſcula alte ſerrata, piloſa.
37 Poter. . . agrimonoides. H. *Upſ. Pimprenelle muſquée.*
Pimpinella agrimonoides odorata. *Boerhaav.* foliola ovalia ſæpe ternata, unde differt ab aliis.
38 POLEMONIUM foliis enſiformibus. Polem vulgare. *T.*
39 VALERIANA cærulea. *C. B. à l'Eſperou.*
40 Valeriana foliis omnibus pinnatis. L*inn.* *l'Eſperou.*
Valeriana ſylveſtris major. *C.* B. *Grande Valeriane.*
41 Valer. . . foliis pinnatis radice tuberoſâ. L*inn.*
Valer. tuberoſâ. *J.* B.
42 Valer. . . foliis radicalibus indiviſis, caulinis pinnatis. *Linn.* Triandra.
Valer. hortenſis major *Phu.* folio oluſatri. *C. B.*
43 SYRINGA foliis lanceolatis integris & diſſectis. *Linn. Lilac.* Vide pinnatifidas.
44 JASMINUM foliis oppoſitis pinnatis. *Linn.* Foliolis omnibus diſtinctis lanceolatis, impari majori.
Jaſmin. vulgatius flore albo. *C. B.*
45 Jaſmin. . . foliis alternis ternatis, pinnatiſque ramis teretibus. *Linn.*

Jaſmin. indicum flavum odoratiſſimum. *Ferrar.*

46 Jaſmin. . . foliis alternis ternis pinnatiſque, ramis angulatis. *Linn.* Jaſm. humile luteum. *C. B.*

47 SAMBUCUS caule arboreo ramoſo floribus umbellatis. *Linn.*

Samb. fructu in umbellâ nigro. *C. B.* *Sureau.*

48 Samb. . . caule arboreo ramoſo floribus racemoſis. *Royen.*

Samb. racemoſa rubra. C. B. foliola quina ſerrata lanceolata, folia oppoſita. *à l'Eſperou.*

49 Sambucus herbacea. H*aller*.

Samb. humilis ſive ebulus. *C. B. Hyeble Evous.*

Na. Mimoſæ ad decompoſitas attinent forte & Sambucus ob foliorum oppoſitionem.

50 HOTTONIA. L*inn.*

51 IPOMÆA foliis linearibus pinnatis, floribus ſolitariis. *Linn.* Quamoclit foliis tenuiter inciſis & pinnatis. *T.*

ORDO V.

Pinnatæ Floribus monopetalis anomalis.

52 UTRICULARIA nectario conico. *Linn.* *à Lates vers Maupas.*

Millefolium aquaticum flore luteo gale-

riculato. *J. B.* Folia bipennata.

53 SCROPHULARIA foliis difformibus pedunculis lateralibus pluribus. *Roy.* Scroph. Hiſpanica ſambuci folio. *T.* Folia ſæpe pinnulata.

54 BIGNONIA foliis ovato lanceolatis conjugatis integerrimis. *Roy.* Gelſeminum luteum odoratum Virginianum ſcandens ſempervirens. Aliæ ſpecies ſunt foliis bipinnatis ſeu decompoſitis.

ORDO VI.

Pinnatæ Floribus polypetalis regularibus.

A. ROSACEÆ.

56 SORBUS foliis pinnatis glabris fructu minimo. *Haller.* Sorbus aucuparia. *J. B. à l'Eſperou.*

57 RUBUS foliis ternatis & quinatis, coſtâ plerumque inermi fructu rubro villoſo. Rubus Idæus ſpinoſus. *C. B. Framboiſier à fruit rouge.*

58 Rub. . . foliis ternatis & quinatis, coſtâ ſpinoſâ, fructu nigro & lævi. *Haller. Ronce commune.* Folia ſunt interdum pinnata & alia ternata. Foliolis ovato-oblongis.

59 POTENTILLA foliis pinnatis caule repente. *Linn. L'Agentine.* Potentilla repens ſcapo nudo unifloro, pinnis confertis minimis intermixtis. *Haller.*

Au bout du Pont ſaint Eſprit.
60 POTENTILLA foliis pinnatis quinatis, foliolis ovatis crenatis caule erecto. *Linn.* Pentaphylloides erectum. *J. B.* Foliola ſeptena, ſubrotunda.
61 Potentill. . . foliis pinnatis oppoſitis, caule dichotomo. *Linn.* Pentaphylloides ſupinum. *J. B.*
62 AGRIMONIA foliis pinnatis, fructibus hiſpidis. *Linn. Aigremoine.*
Agrimonia offic. *Foliola ovalia.*
63 GEUM floribus erectis, fructu globoſo, ſeminum caudâ uncinatâ, nudâ. *Linn.* Geum Plin. Caryophyllata vulgaris. *T. Benoite.* Radices Caryophyllum olent.
64 Geum floribus nutantibus, fructu oblongo, ſeminum caudâ molli plumoſâ. *Linn.* Caryophyllata aquatica nutante flore. *C. B.* Extremo foliolo ampliſſimo, ſemitrifido.
65 Geum pinnis profundè inciſis. *Haller.*
66 Geum pinnis confertioribus extremâ ſubrotundâ, tubis rectis. *Haller.*
Caryophyllata Alpina lutea. *C. B.*
67 FILIPENDULA foliolo impari majori trifido. *Linn.*
Ulmaria. *Cluſ. La Reine des Près.*
68 Filip. . . foliolis longis anguſtis, extremo trilobato, minimis pinnulis intermixtis. *Haller.*
Filip. foliis pinnatis, foliolis uniformibus. *Linn.*
Filip. vulgaris, an Molon Plinii. *C. B. Vers Salenove.*
69 SCHINUS. *Linn.* Molle arbor. *Cluſ. Poivrier de Genes.*
Folia lineari-lanceolata, acria, ſervi-

da. Miſit *D. Barrere.*
70 CASSIA foliolis octo parium ovali oblongis, infimis minoribus petiolis nectario deſtitutis, ſtipulis patulis. *Linn.* Caſſia ſylveſtris fædita ſiliquis alatis. *Plumer.*
71 Caſſia foliolis quatuor parium ovato-lanceolatis rectis, glandulis è baſi petiolorum. *Linn.* Caſſ. Americ. Fædita foliis oblongis glabris. *T.*
72 Caſſ. foliolis ſex parium ovatis acuminatis lanigeris. *Linn.*
Senna Occidentalis odore opii viroſiſſimo, foliis ebuli hirſutis. *Boerhaav.*
73 Caſſ. . . foliolis trium parium oblongo-ovatis, glandulâ ſubulatâ, inter infima. *Royen.* Senna Orientalis. *Raii.*
74 Caſſ. . . foliolis ſæpius quinque parium ovatis acuminatis glabrls petiolatis. *Flor. Zeilan.* Caſſia fiſtula Alexandrina. *C. B.* *La Caſſe.*
75 Caſſ. . . foliolis trium quatuorve parium ſubovatis. *Linn.*
Senna Italica ſive foliis obtuſis. *C. B. Le Séné.*
76 ROSA caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus ſemipinnatis. *Linn.*
Roſa foliis & fructu rotundo lævibus, calycis foliolis diviſis. *Haller.*
Roſa ſylveſtris vulgaris flore odorato incarnato. *T.*
Sanatodos. *Boccon.*
77 Roſa foliis & rotundo fructu lævibus, calycis foliolis diviſis, albo flore. *Haller.*
Roſa arvenſis candida. *C. B.*
78 Roſa foliis ſubtus rubiginoſis & odoratis.

Hall.
Roſa ſylveſtris foliis odoratis. *C. B.*
79 Roſa foliis utrimque villoſis fructu ſpinoſo. *Haller.*
Roſa ſylveſtris pomifera major. *C.* B.
Roſa pomo ſpinoſo folio hirſuto. B. *M.* *Vers Salenove.*
80 Roſa calycis foliolis indiviſis, pomo globoſo. *Haller.*
Cynorrhodon polyacanthon. *Lugdun.*
Roſa pumila ſpinoſiſſima foliis pimpinellæ glabris flore albo. *J. B.* Roſa caule petioliſque aculeatis calycibus indiviſis. *Linn.*
Roſa ſylv. pomifer. minor. *C. B.*
81 Roſa non ſpinoſa calycis foliolis indiviſis, fructu oblongo. H*aller.*
Roſa ſylveſtris odoratiſſimo rubro flore. *C.* B.
82 Roſa rubra Mileſia. *C.* B.
83 Roſa floribus albis ſolitariis, foliis glabris. *B. M.*
84 Roſa ſpinis carens altera. *Cluſ. à l'Eſperou. à la Fereze.*
85 Roſa ſpinoſiſſima pumila flore rubro. *J. B.* Cynorrhodon polyacanthum. *Lugdun.* Caules ſpinoſiſſimi, petioli inermes, foliolia ſeptena, ovalia, ſerrata.
86 Roſa moſchata ſimplici flore. *C.* B. *Roſe muſcate.*
87 Roſa purpurea. *C. B.* *Roſe de Provins.*
88 Roſa rubra pallidior. *C. B.* *Roſe pale.*
89 Roſa omnium Calendarum. *C. B.*
90 Roſa lutea multiplex. *C.* B. *Roſe jaune.*

91 TRIBULUS foliolis ſex parium pinnatis. *Linn.* Tribulus terreſtris, Ciceris folio fructu aculeato. C. B. *Près l'Hôpital général.*

92 TELEPHIUM foliis pinnatis orbiculatis humifuſis.
Telephium. *Dioſcor.*

93 ANDRACHNE. *Linn.* Telephioides Græcum humifuſum flore albo. *T.* Foliola orbiculata, pennata.

94 LAGÆCIA. *Linn.* Cuminoides vulgare. *T.*
Foliola ſubrotunda, inciſo - crenata.

95 GERANIUM floribus pentandris, pedunculis multifloris, foliolis ovalibus impari trifido. Geran. cicutæ folio moſchatum. *C. B.* Et Ger. cicutæ folio acu longiſſimâ. *C. B.*

96 RANUNCULUS foliis radicalibus pinnatis.
Foliola quina inciſa, radices fibroſæ, folia longe petiolata.
Ranunc. montanus lanuginoſus foliis Ranunculi pratenſis. C. B. *à la Taillade de Gignac.*

97 RHUS foliis pinnatis ſerratis. *Linn.* *Sumac.*
Rhus folio ulmi. C. B.

98 Rhus foliis pinnatis integerrimis. *Linn.* *Sumac d'Amerique.*

99 Rhus foliis pinnatis, pedunculo communi membranaceo articulato. *Royen.* *Sumac de Virginie.*

100 CHELIDONIUM pedunculis multifloris. *Linn.* petalis indiviſis.
Chelidon majus vulgare. C. B. Folia inciſo, laciniata.

101 TRAPA. *Linn. Mâcre.*
Tribuloides. *T.* Folia aquis immerſa linearia pinnata emerſa rhomboidea ampla, faſciculata.

B. *PINNATÆ* CRUCIFORMES *tetradynamæ.*

102 LEPIDIUM foliis pinnatis, pinnis lanceolatis. *Linn.*
Naſturtium pumilum vernum. *C.* B. Petala calyce majora.
103 Lepid. . . procumbens foliis pinnatifidis impari majori.
Naſturt. pumilum ſupinum vernum. *B. M.*
104 Lepid. . . foliis filiformibus apice pinnatifidis, caule nudo.
Naſturt. minimum vernum foliis tantùm circa radicem. *F. M.*
105 IBERIS amara foliis linearibus apice pinnatifidis.
Naſturt. ſylveſtre. *Dalech.*
106 DENTARIA foliis imis pinnatis, ſummis ſimplicibus. *Linn.*
Dentar. heptaphyllos baccifera. *C. B.*
107 Dentaria foliis omnibus pinnatis.
Dentaria heptaphyllos. *C.* B. Dentaria foliis ſeptenis, ſuperioribus quinatis. H*aller.* *à l'Eſperou.*
108 SISYMBRIUM foliis pinnatis, foliolis ſubcordatis. *Linn. Creſſon d'eau.*
Siſ. foliorum pinnis anguloſis, floribus ſuperfolia vix elatis. H*aller.*
Siſymbrium aquaticum. *Mathiol.*
109 Siſymbrium foliis pinnatis, foliolis lanceolatis

ceolatis ſerratis. *Linn.*
Syſ. pinnis profunde ſerratis diſſitis. *Hall.*
Syſimbrium paluſtre repens folio naſturtii *T.*

110 SYSIMBRIUM foliis pinnatis, pinnis ſerratis, ſiliquâ brevi *Haller.*
Syſimbr. foliis infimis capillaceis, ſummis pinnatifidis. *Linn.*
Syſimbr. aquaticum folio in profundas lacinias diviſum. *T.*

111 Syſimbrium foliis imis integris ovatis, ſerratis, ſummis pinnatis. *Haller.* Raphan. paluſtris. *Dalech.*

112 Syſimbrium foliis pinnatis flaccidis, foliolis ſublinearibus integerrimis. *H. Upſal.* Eryſimum Monſpeſſulanum ſinapios folio. *Walther.* Foliola ad baſim gerunt lacinunulam acutam.

113 CARDAMINE foliis pinnatis, imorum pinnis ſubrotundis anguloſis, ſuperiorum oblongis & ſtrictis. *Hall.* Cardam. pratenſis magno flore albo. *T.* & purpureo.

114 Cardamine caule procumbente pinnis ovatis, cum nervo confluentibus. *Haller.* Naſſurt. Alpinum minus reſedæ folio. *C. B.*

115 Cardamine caule & foliis hirſutis. *Haller.* Naſturtium pratenſe parvo flore. *C. B.*

116 Cardamine foliis pinnatis, floribus tetrantris. *Linn.*
Card. quarta. Delachampii. An a priori diverſa? Primo vere floret.

117 Cardam. . . foliis pinnatis, foliolis æqualibus lobatis petiolatis. *Linn.* Card. ſiculæ foliis fumariæ. *T.*

118 Cardam. . . foliis pinnatis pinnis ſubrotundis anguloſis. *Haller.* Naſturtium aquaticum majus & amarum *C. B.* Pr.

119 SINAPIS ſiliquis hiſpidis roſtro obliquo longiſſimo. *Linn.*
Sinapi apii folio. *C.* B. Foliola ovata ſerrata, impar lobatum. Ad plantas lyratas accedit.

ORDO VII.

Pinnatæ flore polypetalo difformi.

A. *UMBELLIFERÆ.*

120 CAUCALIS umbellâ univerſali trifidâ, partialibus pentaſpermis foliis pinnatis, pinnis ſerratis. *Linn.*
Caucalis arvenſis latifolia. *C.* B. Flore rubro. Flore albo.

121 TORDYLIUM umbellâ confertâ foliolis lanceolatis inciſo-ſerratis. *Linn.* Caucalis major. *Cluſ.* Tordylium maximum. *T.* Foliola lanceolata ſerrata.

122 Tordylium involucris umbellâ longioribus. Tordyl. ſyriacum. *T.* Folia infima pinnata, foliolis, quinis orbiculatis impari majore.

123 Tordyl. . . involucris partialibus longitudine petalorum, foliolis ovatis laciniatis. *Linn.* Tordyl. Narbonenſe minus. *C. B.* Foliola ovalia, crenis obtuſis, inciſa.

134 HERACLEUM foliolis pinnatifidis. L*inn.* ſphondylium vulgare hirſutum. C. B. *La Berce.* Foliola pinnato-ſinuata. *A l'Eſperou.*

125 PASTINACA foliis ſimpliciter pinnatis. *Linn.* Paſtinaca ſylveſtris latifolia. *C. B.* Et

ſativa. *C. B. Panais.* Foliola ſubrotunda quandoque inciſa.

126 ANISUM foliis radicalibus ſimplicibus. *Linn.* Folia radicalia ſunt quinata-pinnata, vel ternata. *L'anis* foliolis orbiculatis, caulina cuneiformia, ſumma linearia.

127 Aniſ. . . foliis radicalibus pinnatis. *Linn.* Apium peregrinum foliis ſubrotundis. *C.* B. folia infima ut coriandro.

128 PIMPINELLA foliolis trifidis lobomedio tripartito, lobulis quadrifidis. *Haller.* Pimpinella ſaxifraga tenuifolia. *C.* B.
Pimp. ſaxifraga hircina minima. *J.* B. *Bouquetine aux Capouladous.*

129 Pimpin. . . pinnis ſemilobatis circumſerratis. *Haller.*
Tragoſelinum majus umbellâ candidâ. *C.* B. Pinpinella alba. *Schroder. Stalh. Pimprenelle blanche.* Variat flore rubello. *Aux prairies d'Alais.*

130 Pimp. . . foliolis ſubrotundis. *Linn.* Tragoſelinum alterum majus. *T. Le Boucage. aux Capouladous.*

131 Pimp. . . pinnis laciniatis, ſuperius tenuiſſimis. *Linn.* Tragoſelin. minus *Tourn. aux Capouladous.*

132 SIUM foliis pinnatis umbella terminatrice. *Linn. Berle.*
Sium latifolium. *C.* B. Foliolis ovato-acutis ſerratis caule ſtriato.

133 Sium foliis pinnatis, floralibus ternatis. *Linn. Chervi.*
Siſarum Germanorum. *C. B.* Foliola horizontalia.

134 Sium foliis pinnatis umbellis ex alis ſubſeſſilibus. *Linn.*

Sium ſive apium paluſtre foliis oblongis. C. B. Variat foliis diſſectis.

135 Sium foliis linearibus, laciniis decurrentibus connatis. *Linn.* Ammi perenne. *Moriſſ.* pinnis multifidis rarius ſerratis, nervo folioſo. *Haller. à Euſet près Uſés.*

136 Sium foliis ſubmerſis capillaceis, emerſis pinnatis. *Royen.*

Sium minimum. *Raii.*

137 SISON foliis pinnatis umbellis erectis. *Linn.* *Siſon.* Officin. caules teretes, foliola oblonga ſerrata inciſa. *à Gramont.*

138 Siſon foliis pinnatis, umbellis dependentibus. *Royen.*

Siſon arvenſe ſive ſegetum. *T.*

139 SELINUM foliolis pinnatim laciniatis, lacinulis trifidis obtuſis. *Linn.* Daucus alſaticus. *C. B.* Pr.

140 AMMI laciniis foliorum caulis lanceolatis. *Linn.* Ammi majus. C. B. Folia infima pinnata, foliolis lanceolatis, ſerratis, ſummis, linearibus.

B. *NON UMBELLIFERÆ NEC papilionaceæ.*

141 MELIANTHUS ſtipulis ſolitariis petiolo adnatis. *Linn.* Mel. Africanus minor fœtidus. *Comm.*

142 DICTAMNUS. *Linn.* *La Fraxinelle le Dictam blanc. Au bois de Candiac, & près de la* Tourmagne *à Nimes.* Fraxinella. *T.*

C. *FLORIBUS PAPILIONACEIS.*

143 GLYCIRRIZA leguminibus glabris. *Royen.*

Glyc. ſiliquoſa Germanica. *C.* B. *La Regliſſe douce.* Foliola pinnata cum impari, ovalia. *à Vic.*

144 Glyc. . . leguminibus echinatis. *Royen.* Glyc. capite echinato. *C.* B. Pſeudoglycirriza. *Rivin.*

145 CICER foliolis ſerratis. *Linn. Pois chiche.* Foliola ovalia pennata ſerrata.

146 Cicer. . . pedunculis multifloris, ſeminibus globoſis. *Linn.*
Vicia ſegetum cum ſiliquis plurimis hirſutis. *C.* B. Semina bina. Cracca minor. *Tab.*

147 Cic. . . pedunculis bifloris, foliolis integerrimis, ſtipulis indiviſis. *Linn.* Lens vulgaris. *C.* B. *La Lentille.*

148 Cic. . . piſtillorum germinibus undulato-plicatis. *H. Upſal.*
Ervum verum. *Camer. Les Ers* vulgò *Eſſes.* Folia ovalia pinnata ſine impari, coſtâ in viticulam breviſſimam terminata.

149 HEDISARUM foliis pinnatis leguminibus ſubrotundis aculeatis. *Linn.* Onobrychis foliis viciæ fructu echinato major. *C.* B. Et minor legumina ſunt ſæpe ex duobus articulis inflata. *Eſparſette.*

150 Hediſ. . . foliis pinnatis leguminibus articulatis aculeatis. *Linn.*
Hediſ. clypeatum flore ſuaverubente. *C.* B. aut albo.

151 PISUM ſtipulis deorſum gibbis crenatis, petiolis teretibus caule tereti, pedunculis multifloris. *Linn.* Piſum hortenſe. C. B. *Pois.*

152 Piſ. . . petiolis ſupra planiuſculis, caule angulato. *Linn.*

Piſum marinum. *Raii.*

154 VICIA pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis, foliolis ſublanceolatis glabris. H. *Upſal.* Vic. perennis multiflora majori flore cæruleo ex albo mixto. *Magnol.*

154 Vic. . . pedunculis multifloris, foliolis ovatis, infimo pari caulino. *H. Upſal.* Piſum ſylveſtre perenne. *C.* B.

155 Vic. . . leguminibus erectis ſubſeſſilibus, foliolis ſubovatis, ſtipulis dentatis. H. *Upſ.* Faba ſylveſtris fructu rotundo atro. *C. B.* Vicia narbonenſis. *Rivin. Vers Boutonet.*

156 Vic. . . leguminibus erectis, petiolis polyphyllis, foliolis acumine emarginatis, ſtipulis dentatis. *F. S.* Vicia vulgaris ſativa. *C.* B. *Veſſe.*

157 Vic. . . leguminibus adſcendentibus, petiolis polyphyllis, foliolis ovatis acutis integerrimis. L*inn.* Vicia ſepium perennis. *J. B.*

158 Vic. . . pedunculis multifloris ſtipulis crenatis. *Royen.*
Vic. foliolis ovatis ſiliquis racemoſis pendulis. *Haller.*

159 Vic. . . pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis cirrhoſis foliolis alternis ovatis, ſtipulis dentatis. *Linn.*
Vicia maxima dumetorum. *C. B.*

160 Vic. . . pedunculis multifloris, ſtipulis utrimque acutis integris. *Linn.* Vicia multiflora. *C.* B.

161 Vic. . . caule erecto petiolis abſque cirrhis. *Linn. Faba.* Cæſalp. *Feve des Marais.* Datur tamen viticula inflexa breviſſima.

162 Vic. . . pedunculis unifloris, cirrhis polyphyllis, foliolis linearibus, ſtipulis crenatis.

Vicia anguſtifolia purpuro-violacea ſiliquâ latâ glabrâ. Bot. *M. à la Serane.*

163 Vic. . . leguminibus ſolitariis deorſum flexis hirſutis vicia ſylveſtris lutea ſiliquâ hirſutâ. *C.* B. *Cornebiau.*

164 Vicia pedunculis multifloris, ſtipulis crenatis, foliolis linearibus.
Vicia onobrychidis flore. *C.* B. Caulis quadrangularis eſt. *Vers ſaint Jean de Vedas.*

165 Vic. . pedunculis multifloris petiolis tetraphyllis, foliolis oblongis integerrimis, ſtipulis dentatis.

166 GALEGA. *Dodon.* Foliola lanceolata pinnata cum impari, petiolis cirrhum ſpinoſum proferentibus. Floribus albis, cæruleiſve.

167 CORONILLA (herbacea) leguminibus facato-gladiatis. L*inn.* Securidaca lutea major. *Tourn.* Foliola imparipinnata, ſtylo acuminata.

168 Coron. . . leguminibus teretibus toroſis, unguibus corollæ brevibus foliolis glabris caule herbaceo. L*inn.* Coron. herbacea flore vario. *T.* Vexillum purpuraſcit alæ & carinæ albeſcunt. Caules ſulcati repentes.

169 Coron. . . fruticoſa leguminibus teretibus pedunculis multifloris. *Linn.* Siliquæ ſunt pendulæ breves calyce fere vaginatæ foliola glauca impari majori, caulis humilis. Flores lutei coronilla ſive collutea minima. *T. à Valene.*

172 OROBUS caule ſimpliſſimo foliolis pluribus lanceolatis oblongis. *Linn.* Orobus radice tuberoſâ. *Rivin. à l'Eſperou.*

173 Orob. . . caule ramoſo foliolis lanceolatis ſenis nervoſis.
Orob. pyrenaicus latifolius nervoſus. Schol.

botan. an prioris varietas ?

174 OROBUS caule ſimpliſſimo foliolis pluri-
bus ovatis acutis. *Linn.*
Orob. purpureus ſylvaticus vernus. *C. B.*

175 Orobus caule ramoſo. *Linn.* Foliola ovalia
flores corymboſi rubri.
Orob. ſylvaticus foliis viciæ. *C.* B. *à Va-
lene.*

176 HIPPOCREPIS leguminibus ſolitariis ſub-
ſeſſilibus. Linn. Ferrum equinum ſiliquâ
ſingulari. *C. B. Serracavallo.*

177 Hipp. . . leguminibus pedunculatis con-
fertis margine altero lobatis. *Royen.* Sinu-
bus orbiculatis.
Ferrum equinum ſiliquâ multiplici. *C.* B

178 Hipp. . . ſiliquis umbellatis utrimque emar-
ginatis. *Haller.*
Sinus hinc & inde ſunt ſemi-orbiculati.
Ferrum Eq. Germanicum ſiliquis in ſum-
mitate. *C. B.*

179 ORNITHOPUS foliis pinnatis legumini-
bus ſubarcuatis. H. *Upſ.*
Ornithopodium perpuſillum. *Dalech.*

180 Ornith. . . foliis pinnatis articulis legumi-
num ſubrotundis lævibus. *Linn.* Ornith.
ungue ſiliquæ brevi , flore albeſcente.
Haller.
Ornithop. majus. *C. B.*

181 Ornith. . . foliis pinnatis leguminibus com-
preſſis rugoſis. *Linn.*
Foliola ovalia ſubtomentoſa , flores lutei.
Ornith. ſcorpioides ſiliquâ compreſſâ. *T.*

182 Ornith. . . foliis pinnatis , leguminibus ar-
ticulatis , radice tuberoſâ.
Ornith. radice tuberculis nodoſâ. *C. B.*
Dalech.

ANTHYLLIS

183 ANTHYLLIS foliis pinnatis, foliolis æqualibus. *Linn.* Barba jovis pulchre lucens. *J. B.* Non invenitur.

184 Anthyll. . . foliis pinnatis æqualibus, ſub umbellâ palmatis. *Haller.* Barbajovis pumila villoſa flore globoſo purpureo. *Breyn.* Aſtragal. villoſus floribus globoſis. B. *M.* *à l'Eſperou. Meyrueis.*

185 Anth. . . herbacea foliolis quaternis pinnatis, floribus lateralibus. *H. Upſ.* Vulneraria pentaphyllos. *T.* Foliorum terminale eſt majus cæteris tribus quorum duo oppoſita, primum & ultimum impar. Flores lutei, alias purpurei. *Au delà de Salenove.*

186 Anth. . . foliis pinnatis foliolis pluribus (ſeptenis) terminatrici majori. *Royen.* Anthyllis prior. *Dodon.* Vulneraria ruſtica. *J. B.* Folia radicalia ſimplicia ovata. *aux Capouladous.* Vulneraria flore purpuraſcente. *T.* varietas eſt.

187 Anth. . . fruticoſa foliolis ternatis ac quinatis lanceolatis tomentoſis. Barbajovis lagopoides cretica incana fruteſcens flore ſpicato purpureo amplo. *Breyn.* Ebenus cretica, proſper. Alpin.

188 PHACA leguminibus rectis. *Linn.* Aſtragaloides Luſitanica. *T.*

189 BISERRULA. *Linn.* Pelecinus. *T.* Foliola numeroſa apice retuſa *En Provence.*

190 TRAGACANTHA. *C. B. Linn.* fruticoſus caulis, ſpinis rigidis terminatus foliolis ovalibus incanis. *Barberenard, à Marſeille.*

191 ASTRAGALUS cauleſcens procumbens

leguminibus ſubulatis recurvatis glabris. *Linn.* Caulis humifuſus folioſus, foliolis apice retuſis, flores lutei. Aſtragal. luteus annuus Monſpeliacus procumbens. *Boerhaav.*

192 ASTRAGALUS acaulis ſcapo declinato longitudine foliorum, leguminibus ſubulatis teretibus ſubarcuatis glabris. *Linn.* Aſtrag. Monſpeſſulanus. Flores purpurei ſpicati.

193 GLYCINE radice tuberoſâ. *Linn.* Apios Americana. Boerh. Foliola quina pinnata lanceolata, flores purpurei congeſti ſuccus lacteus.

194 COLUTEA foliolis obverſe cordatis, caule arboreo. *Linn. Baguenaudier.* Colut. veſicaria. C. B. Flores lutei. *à la Valete.*

195 Col. . . foliolis ovato-lanceolatis (tomentoſis) caule fruticoſo. Linn. Colut. Æthiopica. *Rivin.* Flores purpurei, vel phænicei.

196 ROBINIA aculeis geminatis. *Linn.* Acacia Virginiana ſiliquis glabris. *Riv. Faux Acacia.*

ORDO VI.

Pinnatæ Floribus compoſitis.

A. FLOSCULOSIS.

197 CINARA foliis pinnatis foliolis oblongis indiviſis, caule ſpinoſo.
Cinara ſpinoſa cujus pediculi eſitantur. *C. B.*
Folia inermia.

198 Cin. . . foliis pinnatis foliolis ſerratis. *Linn.* foliola oblonga.
Cinara hortenſis aculeata. *C. B.* Et non aculeata. *C.* B. *Artichaud.*

199 CENTAUREA ſquamis calycinis ciliatis inermibus, foliis pinnatis, foliolis lineari lanceolatis ſcabris. Jacea Africana. *D. Niſſole.* Pinnulæ rarò dentatæ.

200 Centaurea calycibus inermibus, ſquamis ovatis obtuſis foliis pinnatis glabris, foliolis integris (lanceolatis) impari ſerrato. *Linn.* Centaurium majus luteum. *T.*

201 Centaur. . . calycibus inermibus, ſquamis, ovatis, foliis pinnatis foliolis ſerratis decurrentibus. *Linn.* Cent. majus juglandis folio. *J.* B. Cent. majus folio in plures lacinias diviſo. C. *B.*

202 SERRATULA foliis pinnatifidis, lacinia terminatrici maxima. *Linn.*
Ser.atula, *C. B.* Serr. foliis glabris imis ovatis, ſummis ad baſim pinnatis. H*aller.*

203 TANACETUM foliis pinnatis, pinnis

pinnatifidis inciſis ſerratis. *Linn.* Tanacetum vulgare luteum. *C. B.* Vide decompoſitas.

204 BIDENS coronis ſeminum retrorſum aculeatis, ſeminibus erectis. *Linn.* Ceratocephalus tripteris ac pentapteris. *Vaillant.* Bidens foliis tripartito-diviſis. Cæſalp. folia ſæpe pinnata.

B. *FLORIBUS RADIATIS.*

205 VERBESINA foliis pinnato-digitatis, foliolis lanceolatis.
Bidens anagyridis folio. H. *R. P.*

206 SENECIO foliis pinnato-lyratis, laciniis laciniatis. *Linn.* Jacobea. *T.* Variat foliis pinnatis & pinnatifidis, pinnis ligulatis.

207 Senec. . . foliis pinguibus pinnatis, pinnis alternis breviſſimis radiis perexiguis. *Hall.* Senecio pinguis incanus. *C. B.* Vide decompoſitas. *En allant à ſaint Loup, au Caſtel.*

208 BUPHTALMUM caule ramoſo foliis pinnatifidis linearibus, laciniis dentatis ſerratis, floribus pedunculatis. *Linn.* Eſt foliis pinnatis foliolis lanceolatis ſerratis. Buphtalmum. *Mathioli. à Aiguemorte.*

209 ACHILLÆA foliis pinnatis, foliolis lanceolatis inciſis ſerratis, ſubtus lanigeris. *Linn.* Millefolium Orientale foliis tanaceti incanis radiis pallide luteis. *Boerh.*

210 Achill. . . foliis pinnatis, foliolis obtuſe lanceolatis, ſerrato-dentatis. *Linn.* Ptarmica incana pinnulis criſtatis. *T.*

211 Achill. . . foliis pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis, baſi ſurſum acutis. *Linn.* Ptar-

mica Orientalis foliis tanaceti incanis, flore aureo. *T.*

212 TAGETES caule ſubdiviſo diffuſo. *Linn.* Tagetes indicus minor ſimplici flore. *C. B.* *Œillet d'Inde.*

213 Taget. . . caule ſimplici erecto pedunculis nudis unifloris. *Linn.*
Taget. maximus rectus flore ſimplici ex luteo pallido. *J. B.* *Paſſevelours.*

C. *FLORIBUS AGGREGATIS.*

214 SCABIOSA corollulis quadrifidis foliis pinnatis, pinnis lanceolatis ſerratis. *Linn.* Scabioſa alpina foliis centaurii majoris. *C. B.* Foliola omnia ampla integra ſubæqualia.

215 Scabioſ. . . corollulis quadrifidis, ſquamis calycinis ovatis obtuſis. *Linn.*
Scab. flore globoſo niveo. *C.* B. Folia ima integra, ſumma pinnata, lacinulis linearibus inciſis & ſerratis.

216 Scabioſ. . . corollulis quadrifidis calyce brevioribus, foliis radicalibus lyratis, caulinis pinnatis. *Linn.* Scab. altiſſima annua foliis agrimoniæ non-nihil ſimilibus. H*erm.*

217 Scab. . . corollulis quinquefidis, foliis diſſectis, receptaculis floſculorum ſubulatis. *Linn.* Scab. peregrina rubra capitulo oblongo. *C.* B. .

218 Scab. . . corollulis quadrifidis, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis ſuperne inciſis. Scabioſa multifido folio flore flaveſcente. C. B. *A l'Eſperou.*

219 Scabioſ. . . corollulis quadrifidis, ſquamis calycinis ovatis acutis, flore duplo brevioribus, foliis pinnatifidis, caule hirſuto ſubnudo.

Scabioſa major hirſuta folio laciniato. J. B *Au Caſtel ſaint Martin.*

Scab. major flore ex cæruleo purpureo. *Tabern.*

220 SCABIOSA corollulis quinque fidis foliis radiealibus ovatis (ſpatulatis) crenatis, caulinis pinnatis ſetaceis. (anguſtis.) *Linn.* Folia radicalia ſunt obverſe ovata, caulina ſunt pinnata pinna impari lineari lanceolata, integerrima ſquamæ calycis ſubulatæ, capitula fructuum ſetis hiſpida ovalia.

Scabioſa minor vulgaris. J. B. Uſitata ob penuriam pratenſis hirſutæ.

CLASSIS X.

Plantæ decompoſitæ.

ILlæ vocantur quarum plurima folia ſunt conflata ex foliolis vel ramoſis vel petiolo bis ter vel quater diviſo inſidentibus. dicuntur hæc folia decompoſita quia, cum in folio componendo ſint plures fibræ ramoſæ & reticulares quarum trunci ex coſtâ communi oriuntur, ſeparatis ab invicem illis fibris & reticulis exurgit folium decompoſitum ſeu in ſuas minutias reſolutum.

Diſcrepant à pinnatis quia petioli ultima foliola gerentes ſunt indiviſi in pinnatis, ramoſi verò in decompoſitis differunt à lacyniatis & lyratis in eo quod petiolis ramoſis adeoque foliolis diſtinctis gaudeant decompoſita, non verò laciniatæ nec lyratæ, quæ ultimæ ſimpliciores ſunt.

Decompoſitæ vocari poſſunt *alantæ* quia ſicut alæ avium ſunt conflatæ ex pennis juxta ulnam digeſtis & iterum pennatis, ita foliola in decompoſitis annectuntur coſtæ communi & iterum in ramos multos divaricantur.

Dividuntur in *bipinnatas* quarum petioli bis ramoſi aut coſtæ in eodem plano oppoſitæ, ut in *meliâ*, *juglande* etiam ſi ramuli pro coſtis numerentus; has vocat illuſtriſſ. Linn. *duplicato - pinnatas*. Si petioli ter quater ramoſi, dicuntur folia tripinnata, quadripinnata & ab aliis *ſupradecompoſita.*

ORDO I.

Filices decompoſitæ.

. 1 OSMUNDA ſcapo paniculato polyphyllo *F. S.* Oſmunda vulgaris & paluſtris *T. Fougere fleurie.* Fronde bipennatâ pinnis lineari lanceolatis. *Autour d'Alais.*

. 2 PTERIS fronde ſupra decompoſitâ, foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis, ſuperioribus minoribus. *H. Cliff.* Filix fœmina. Fuchs. *Fougere femelle.*

. 3 POLYPODIUM trifidum, ramis pinnatis, pinnis pinnatifidis. *Fl. Lapp.* Filix ramoſa minor pinnulis dentatis. *C. B.* Fil. pumila ſaxatilis. *Cluſ.* Hiſt. folia tenuia ſunt.

4 Polyp. . . fronde duplicato-pinnatâ, pinnis ramoſis, foliolis ſubrotundis inciſis. *Fl. Lapp.* Filix pumila ſaxatilis. 2. *Cluſ.*

. 5 Polyp. . . fronde duplicato-pinnatâ, pinnulis obtuſis, coadunatis, crenatis. *Linn.* Filix non ramoſa latifolia dentata. *Tourn.* Crenas imas pinnarum bifidas dicit *Hall.* Filix mollis ſive glabra vulgari mari non ramoſæ accedens. *J. B.*

. 6 Polypod. . . fronde duplicato-pinnatâ, pinnulis lanceolatis acutis pinnatifidis. *Fl. Lapp.* Filix petræa fœmina 1. *Tab.*

. 7 Polyp. . . fronde duplicatâ, foliolis obtuſis, crenulatis petiolo ſtrigoſo. *Linn.* Fil mas non ramoſa dentata. *C. B.* *Fougere mâle.*

mâle. La Côte ou tige eſt couverte d'un duvet noir. A l'Eſperou.

8 POLYPODIUM pinnis ramorum laxe pinnatis pinnulis acutè dentatis. *Haller.* Filix rhætica tenuiſſime denticulata. *J. B.*

9 Polyp. . . fronde duplicato-pinnatâ, foliolis lunulatis dentatis, petiolo ſtrigoſo. *Royen.* pinnulæ ſurſum gibbæ, ſerrato-ciliatæ. Lonchitis aculeata major. *T.* Aculei nulli niſi cilia dicas. *à l'Eſperou.*

10 Polyp. . . fronde duplicatò pinnatâ, pinnis remotis, foliolis ſubrotundis inciſis. *Linn.* Adjanthum album folio ſilicis. *J. B.* Tripinnatum eſt.

11 PTERIS ramis duplicato-ramoſis latiſſimè diviſis pinnulis profunde crenatis, perfæcunditatem integris. *Haller.* Filicula montana folio vario. *Tourn. au Canigou.*

12 ASPLENIUM frondibus duplicato pinnatis, foliis infimis minoribus, foliolis obverſe ovatis crenatis. *Royen.* Trichomanes ramoſum. *J.* B.

13 Aſpl. . . frondibus duplicato-pinnatis, foliis infimis majoribus foliolis obverſe ovatis ſuperne crenatis. *Royen.* Adjanthum nigrum officin. *J.* B. *Capillaire ordinaire.* Ambitus frondis ſubtriangularis, pinnulæ majores alternæ pinnatifidæ.

14 ADJANTHUM fronde bifidâ, ramis alternis pinnatis, foliolis obtuſis recurvis (arcuatis) ſuperne inciſis multifloris. *Royen.* Adjanthum Americanum. *Cornuti.*

15 Adjanth. . . ramis pinnatis, foliis circuli ſectorem referentibus.

Adjanth. foliis coriandri. *T. Capillaire de Montpellier.*

16 ACROSTICUM bipinnatum pinnulis indiviſis.
Adjanthum pulcherrimum. *J. B.* Pinnulæ pulvere croceo omnino adſperſæ à parte poſticâ. *Près Alais.*

17 Acroſt. . . fronde duplicato-pinnatâ, pinnis baſeos pinnatifidis. Dryopteris. *Dodon. à l'Eſperou.*

ORDO II.

Decompoſitæ apetalæ.

18 FRAXINUS floribus nudis. *Linn. Frêne. Fraiſſe.* Fraxinus excelſior. *T.* Dantur Hermaphroditi, & fæminæ.

ORDO III.

Decompoſitæ floribus monopetalis regularibus.

19 SOLANUM caule inermi herbaceo foliis pinnatis inciſis. *Linn.* Lycoperſicum vulgare. *T. Pommes d'amour.*

ORDO IV.

Decompoſitæ Floribus monopetalis anomalis.

20 BIGNONIA foliis decompoſitis, foliolis inciſis, articulis cirrhiferis. *Linn.* Bign. arbor flore luteo fraxini folio. Peumen

21 Bignonia foliis pinnatis, foliolis inciſis, geniculis radicatis. L*inn.* Bign. Americana fraxini folio flore amplo phæniceo. *T.*

22 PEDICULARIS alpina foliis alternis, bis pinnatis, floribus ochroleucis roſtratis in ſpicam congeſtis. H*aller*. Filipendula alpina flore pediculariæ. *C.* B. *à l'Eſperou.*

23 Pedicularis foliis alternis, pinnis pinnatis, foliis ex ſpicâ florigerâ longe eminentibus. *Haller.* Pedicul. major alpina. *Dalech.*

24 SCROPHULARIA foliis pinnatis, racemo terminante, nudo, pedunculis bifidis. L*inn.*
Scrop. ruta canina dicta. *C.* B.

ORDO V.

Decompoſitæ flore monopetalo anomalo.

25 VERBENA foliis de compoſito-pinnatifidis caule diffuſo. *Linn.*
Verb. tenuifolia *J.* B.
26 CELSIA foliis duplicato-pinnatis. *Linn.*
Verbaſcum Orientale ſophiæ folio. *T.*
27 TEUCRIUM foliis aliquoties trifidis floribus verticillatis. *Linn.*
Chamædrys foliis laciniatis. *Lobel. à l'Eſperou.*
28 UTRICULARIA nectario conico. *Linn.*
Lentibularia *Rivin.* Folia ſetacea bipennata. *à Lates.*

ORDO VI.

Decompoſitæ floribus polypetalis uniformibus.

A. *ROSACEIS.*

29 MELIA foliis decompoſitis. *Linn.* Azedarach arbor fraxini folio. *T. Pater noſter* Italis. *à Nîmes.*
30 STAPHYLÆA foliis pinnatis. *Linn.* Sta-

phylodendron. *T. Nés-coupé.*

31 FRAXINUS floribus completis. *Linn.* Ornus ponted eræ.

. 32 ACTÆA. *Plin. Linn.* Chriſtophoriana. *Moriſſon.* Foliola laciniata, crenata *à l'Eſperou, à la Louzere.*

. 33 CLEMATIS foliis pinnatis foliolis ovato-lanceolatis integerrimis. *Royen.* Caulis rectus, foliola quina, ſemina plumoſa, flammula ſurrecta alba. J. B. *Herbe aux gueux, Entrevige.*

. 34 Clem. . . foliis pinnatis foliolis cordatis inæqualiter inciſo ſerratis. *Linn.* Clemat. ſylv. latifolia. C. B.

. 35 Clemat. . . foliis inferioribus pinnatis laciniatis, ſummis ſimplicibus lanceolatis integerrimis. *Linn.*
Clem. ſive flammula repens. *C. B.* Flores pentapetali.

36 FILIPENDULA ſexu diſtincta foliolis æqualibus. *Haller.*
Aruncus. *Linn.* Barba Capræ floribus oblongis. *T.*

37 RUTA foliis decompoſitis. *Linn.* foliolis ovalibus.
Ruta hortenſis latifolia. *C.* B. Petalis inciſis.
Ruta latifolia arbuſculæ ſimilis. *T.* Petalis integerrimis.

. 38 Ruta foliis inciſis, lobulis linearibus acutis. *Haller.* Rut. ſylv. minor. *C. F.*

39 EPIMEDIUM. *C.* B. *Linn.* Foliola oblique cordata petala nulla, nectaria quatuor pro petalis.

40 POINCIANA foliis duplicato-pinnatis foliolis oblongo-ovalibus caule inermi. *Linn.* Poinc. flore pulcherrimo. *T.*

41 MIMOSA ſpinis geminatis diſtinctis foliis duplicato pinnatis partialibus utrimque duobus. Acacia vera. *Plukn.*

42 Mimoſa caule aculeato foliis geminatis, partialibus tetraphyllis, foliolis infimis minimis. *Linn.* Mimoſa ſpinoſa prima. *Breyn.* L*a Senſitive.*

43 Mimoſa ſpinis geminatis, foliis duplicato pinnatis, partialibus utrimque quinis pluribus. H. *Upſ.* Acacia vera. *J.* B.
Acac. Ægyptiaca offic. unde gummi Arabicum.

44 Mimoſa caule aculeato foliis pinnato-palmatis ſingulis multiplici oppoſitione pinnatis. *Linn. Senſitive ordinaire.*

45 Mimoſa inermis foliis duplicato-pinnatis ſiliquis linearibus glabris. L*inn. Senſitive de Pernambucq, ou d'Italie.*

46 Mimoſa quæ Acacia Americana abrùs folio triacantha. *Plukn.*

47 Mimoſa ſpinis geminatis diſtinctis, foliolis duplicato pinnatis, partialibus utrimque duobus. L*inn.*
Acacia indica farneſiana. *T.*

48 THALICTRUM foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Linn.*
Thal. pratenſe anguſtiſſimo folio. *C. B. à la Verune, entre Lates & Perauls, il fleurit le* 1. *Juillet ſes fleurs ſont jaunes.*

49 Thal. . . ſeminibus triangularibus pendulis, ſtipulis ad ſubdiviſiones petiolorum. L*inn.* Thal. majus florum ſtaminibus purpuraſcentibus. *T.* Caulis teres, folia tripinnata, foliola ternata multiloba, lobis obtuſis. *à Lates.*

50 Thal. . . caule folioſo ſtriato, paniculâ

multiplici terminatrici. *Linn.*
Thal. majus ſiliquâ anguloſâ aut ſtriatâ. *C. B.* Variat ſtaminibus luteis ; folia tripinnata foliola quina, lobis acutis. *à Lates.*

51 Thal. . . caule ſiliformi ramoſiſſimo, interſperſis foliolis paniculato. *Royen.* Foliola triloba mediolobo trilobo, folia bipinnata. Thal minimum fæditiſſimum. *C. B. au deſſûs de Caſtelnau.*

52 Thal. . . caule fere nudo ſimplici foliis obtuſis. *Linn.*

53 Thal. . . minus. *C. B.* Flores luteis ſtaminibus donati, folia quadripinnata, foliolis ultimis trilobis, lobis acutis, caulis ſimpliciſſimus, foliis alternis veſtitus. *à Lates au bois des P. Jeſuites.*

54 Thal. . . caule folioſo ſtriato, foliolis rugoſis trilobis obtuſis.
Thal. majus ſiliquâ ſeminum ſtriatâ, foliis rugoſis trifidis. *T. à Lattes.*

55 GERANIUM pedunculis multifloris, pinnis foliolum aliis laciniatis aliis minimis & ſimplicibus. *Haller.* Ger. cicutæ folio acu longiſſimâ. *T.* Pedunculi quinqueflori pentandri.

56 Geran. . . calycibus monophyllis, corollis papilionaceis, vexillo dipetalo foliis duplicato-pinnatis. *Linn.* Ger. afric. coriandri folio, floribus incarnatis majus. *Boerh.*

57 Geran. . . pedunculis novemfloris, foliis tripinnatifidis ligulatis, petalis maculatis.
Geran. triſte. cornuti. petala obverſe ovata, atropurpureâ maculâ ovali notata. Radix ſubgloboſa.

58 Geran. . . calycibus monophyllis, petalis linearibus, caule carnoſo nodoſo foliis du-

plicato-pinnatiſidis. *Linn.*

. 59 GERANIUM pedunculis multifloris calycibus pentaphyllis foliis duplicato-pinnatis. *Linn.* Geran. cicutæ folio minus & ſupinum. *C. B.* Foliola octo pinnatifida, pedunculi quinqueflori.

. 60 Geran. . . pedunculis bifloris foliis quinque partitis, lobis pinnatifidis. L*inn.*
Geran. robertianum primum. *C.* B. rubens, vel viride.

. 61 PAPAVER foliis ternato pinnatifidis fructu angulato. *Linn.* Pap. eractic. capite longiori hiſpido. *T.* Sulcatis hiſpidis. *H. Upſ.*

. 62 Papaver caule ramoſo foliis linearibus pinnafidis, capſulis ſulcatis. H. *Upſal.*
Folia bipennatifida. Glaucium flore violaceo. *T. à Caſtelnau.*

. 63 Papaver caule multifloro folioſo hiſpido, foliis pinnatifidis capſulis lævibus. H. *Upſ.*
Papaver erraticum majus. *Dod. Coquelicoc.*
Folia bipinnatifida.

. 64 NIGELLA floribus involucro folioſo exceptis. L*inn.* Styli 5.
Nigell. Anguſtifolia flore majore ſimplici (vel pleno) cæruleo. *T. Nielle.*

65 Nig. . . flore foliis nudo piſtillis corollam æquantibus. L*inn.* Nigella cretica latifolia odorata. *Toute Epice.*
Nigell. arvenſis cornuta. *C.* B. Styli 5. vel 6. *Elle n'eſt pas de ce Pays.*

66 Nig. . . piſtillis decem corollâ longioribus. *Linn.*
Nig. Orientalis flore flavo, ſemine alato plano. *T.* Folia linearia bipennata.

67 GARIDELLA. L*inn.* folia ſiliformia pennata, foliolis ramoſis. *En Provence.*

68 NIGELLA

68 NIGELLA piſtillis decagynis corollam æquantibus. *Linn.*
Nigella latifolia flore majore ſimplici cæruleo. *T.*

69 Nigell. . . petalis ſubtricuſpidatis, foliis ſubpiloſis. *Linn.*
Nigell. . . flore minore ſimplici candido. *C. B.* Nig. offic.

70 DELPHINIUM caule ſimplici nectariis monophyllis. *Linn.*
Delph. hortenſe flore pleno. *T. Pié d'Aloüette.*
Folia ſeſſilia, foliolis bipennatis linearibus. Cætera delphinia & aconita pertinent aptius ad palmatas ut myriophylla & ceratophylla ad verticillatas.

71 RANUNCULUS foliis omnibus capillaceis circumſcriptione rotundis. *Linn.* Ranunc. aquaticus capillaceus. *C.* B.

72 Ran. . . foliis filiformibus ramoſis calycibus appendiculatis. H. *Upſal.*
Ranunc. ceratophyllos ſeminibus falcatis in ſpicam adactis. *T.*

73 Ran. . . ſeminibus aculeatis foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus. *Linn.*
Ran. arvenſis echinatus. *C. B.*

74 Ran. . . foliis ſubmerſis capillaceis. H. *Upſ.*
Ran. aquat. folio rotundo & capillacæo.

75 ADONIS radice annuâ. *Linn.* Ranuncul. arvenſis foliis chamæmeli flore atrorubente.

76 Ad. . . radice perenni. *Linn.* Helleborus niger Hippocratis. *Tab.*
Adon. montanus perennis flore amplo luteo. *Rupp. L'Hellebore noir d'Hippocrate. à l'Eſperou, près Meyrüeis.*

77 ANEMONE tubis caudatis, foliis omni-

bus bipinnatis, pinnulis remotis albo flore. *Haller.* puſatilla albo flore. *T.*

78 Anem. . . tubis caudatis foliis omnibus bipinnatis, pinnulis confertis luteo flore. *Haller.* Pulſatilla lutea paſtinacæ ſylveſtris folio. *C. B.*

79 PULSATILLA foliis decompoſitis pinnatis, flore nutante limbo recto. *Linn.* Pulſat. Folio craſſiori & majori flore. *T.* *Coquelourde à fleur violette pourprée, à l'Eſperou.* Folia filiformia bipinnata.

80 Pulſ. . . foliis decompoſitis pinnatis, flore pendulo, limbo reflexo. *Linn.* Pulſ. flore minori nigricante. *C.* B.

81 Pulſ. . . foliis decompoſitis ternatis. *Linn.* Anemone tenuifolia. *Boerhaav.*

B. *FLORIBUS CRUCIFORMIBUS.*

82 VELLA. *Linn.* Naſturcium ſylveſtre Valentinnum. *Cluſ.*

83 Crambe foliis & foliolis alternatim pinnatifidis. *Linn.*
Rapiſtrum Orientale acanthi folio. *T.*

84 LEPIDIUM foliis imis multifidis, ſummis integris peranguſtis. *Haller.* Lepid. floribus apetalis diandris. *Linn.* Naſturt. ſylv. oſyridis folio. *C.* B. *à Villanove.*

85 Lepidium foliis caulinis pinnato-multifidis, ramiferis cordatis amplexicaulibus integerrimis. *Linn.* *Creſſon d'Orient.*

86 Lepid. . . foliis oblongis multifidis. *Linn.* *Creſſon alenois, naſitord.*
Folia infima bis pennatifida. Naſturtium hortenſe. *T.*

87 COCHLEARIA foliis pinnatifidis. *Linn.*

Naſturt. ſylv. capſulis criſtatis. *T. Corne de Cerf des Champs.*

88 SYSIMBRIUM petalis calyce minoribus foliis decompoſito-pinnatis. *Flor. Suec.* Sophia Chirurgorum.

89 Syſimbr. . . foliis pinnatifidis raró dentatis, anguſtiſſimis. Sinapi parvum ſiliquâ aſperâ. *C. B.* Pinnæ foliorum lineari lanceolata raró dentatæ, flores lutei. In foſſis udis. Sinapi Monſpeſſul. ſiliquâ aſperâ hirſutâ. J. B.

90 SINAPIS foliis duplicato pinnatis, laciniis linearibus. *Linn.*
Sinapi Hiſpanicum naſturtii folio. *T.*

91 CARDAMINE foliis duplicato pinnatis, pinnis laciniatis. *Linn.*
Cardam. annua exiguo flore. *T. à l'Eſperou.*

ORDO VII.

Decompoſitæ Floribus difformibus umbelliferis. T.

A. *FÆNICULACEÆ.*

92 ANETHUM fructu ovato. *Linn.*
Fæniculum vulgare germanicum. *C. B.*
Fænic. dulce. *C. B.* Le *Fenoüil.*

93 Aneth. . . fructu compreſſo. *Linn.* Anethum hortenſe. *C. B. Anet.*

94 SESELI petiolis ramiferis membranaceis

oblongis integris. *Linn.* Meum latifolium adulterinum. *C. B.* Daucus glauco folio. *B. M.*

95 Seſeli petiolis ramiferis membranaceis ventricoſis emarginatis. *Linn.* Saxifraga pannonica. *Cluſ. Vers Fontfroide, à Ferrand.*

96 Seſeli petiolis membrana deſtitutis. *Royen.* Ammoides. *C. B.*

97 Seſeli fœniculum ſylveſtre elaticus ferulæ folio longiori. *T.* Peucedanum pannonicum. *Cluſ.* Invenit. D. Magnol ad fontem Piquet *& au Serre de Bouquet près de Seine, entre Alais & Uſez.*

98 ATHAMANTA foliis capillaribus ſeminibus hirſutis. *Linn.*
Daucus cretenſis verus. *Lobel* Ic. 722.

99 Aham. . . foliis capillaribus ſeminibus glabris ſtriatis. *Linn.* Meum *Dod. à l'Eſperou. Ciſtre.*

100 Atham. . . foliolis multipartitis, laciniis linearibus, teretiuſculis acuminatis. *Royen.* Daucus creticus ſemine hirſuto. J. B.

101 PHELLANDRIUM foliis ad angulos obtuſos ramoſis. *Haller.*
Phellandrium. *Dodon. à Nimes dans les foſſés près Millaud.*

102 BUNIUM bulbo globoſo. Bulbocaſtanum majus folio apii. *C. B. Terrenoix à l'Eſperou.*

103 Bunium bulbis oblongis.
Carvi tenuiſſimis foliis, aſphodeli radice. *T.* Folia filiformia ramoſa quaſi verticillata. *à l'Eſperou.*

104 CUMINUM. *Linn.* Fœniculum Orientale cuminum dictum. *T. Cumin.*

105 CACHRIS foliis pinnatis acutis multifidis *Armarinte.*

Cachris ſemine fungoſo ſulcato plano, foliis peucedani anguſtis. *Moriſſon. à Sete, le long de la riviere de Mauſſon.*

106 DAUCUS ſeminibus nudis. *Linn.* Viſnaga. *J. B. à Miraval, à Marſyllargues.*

107 SISON foliolis ſubcapillaribus. *H. Upſal.* ammi offic. *Ameos.* Pharmacop. fœniculum annuum odore origani, *T.*
Ammi parvum foliis fœniculi, *C. B.*

108 PEUCEDANUM foliolis quinquies tripartitis, lineari-ſubulatis integerrimis. *Linn.* Peuced. *J.* B. *Fenoüil de Porc.*

109 Peuced. . . foliolis pinnatim diviſis, laciniis oppoſitis. *Linn.*
Silaum quibuſdam flore luteolo. *J.* B. Angelica prat. apii folio. *T. Lates.*

110 ŒNANTHE ſtriata rigida. *Linn.* fœniculum tortuoſum *T.* Seſeli. offic.

111 Œnanthe foliis caulinis inflato-fiſtuloſis. *Linn.*
Œn. aquatica. *C.* B. *à Gramont.*

112 FERULA foliolis linearibus longiſſimis ſimplicibus. *Linn.*
Ferula major ſeu fœmina Plinii. *Boerhaav.* Folia quadripinnata, *à la Baume de Miraval.*

113 Fer. . . foliolis pinnatifidis pinnis linearibus planis trifidis. *Linn.*
Fer. galbanifera. *Lobel.* Folia bipinnata.

114 CARUM. *Dodon. Linn. Carvi. T.* Folia linearia pinnatifida nodos decuſſantia.

B. *FOLIOLIS MAJORIBUS ANGUSTIS floribus umbelliferis.*

115 LASERPITIUM foliolis lanceolatis inte-

gerrimis petiolatis. *Linn.* Liguſticum quod ſeſeli officin. *C. B.*

116 THAPSIA foliolis pinnatifidis linearibus ad pedunculum communem radiatis. *Royen.* Th. ſive turbit garganicum ſemine latiſſimo. *C.* B. *à Nimes vidit D. Baux.*

117 CAUCALIS caule lignoſo foliolis ſubulato-ſpinoſis integerrimis. *Linn.*
Echinophora maritima ſpinoſa. *T. à la Plage.*

118 CHRITMUM foliolis lanceolatis carnoſis. Linn. *Fenoüil marin, ſur l'Egliſe de Maguelone.*

C. *FLORIBUS UMBELLIFERIS, FOLIOLIS lateſcentibus anguſtis.*

119 CHÆROPHILLUM ſeminibus lævibus nitidis, petiolis ramiferis ſimplicibus. L*inn.* nervo foliorum ſubhirſuto. *Haller.*
Chærop. perenne ſylveſtre cicutæ folio. *T.* Bipinnatum foliolis ovato-oblongis inciſo-ſerratis.

120 CAUCALIS involucris ſingulis pentaphyllis, petalo unico duplo majore. L*inn.* Caucal. arvenſis echinata magno flore. *T.* Petalum extremum bifidum amplum.

121 Caucal. umbellâ ſæpius trifidâ, umbellulis triſpermis involucris triphyllis. L*inn.* Cauc. Monſpeliaca echinata magno fructu. *C.* B.

122 Caucalis caule lignoſo foliolis ſubulato-ſpinoſis integerrimis. L*inn.*

223 Caucal. . . involucro generali ſæpe nullo, laciniis foliorum peranguſtis. *Haller.*
Cauc. arvenſis echinata parvo flore & fruc-

tu. *C. B.* Umbellulæ fertiles quinæ flores rubelli, ſemina quina, folia quadripinnata.

124 SIUM pinnis laciniatis pinnulis trifidis nervo non folioſo. H*aller*. *Cicuta*. *Linn.* Cicuta aquatica. *Geſner* Sium alterum erucæ folio. *Dalech.*

125 TORDYLIUM umbellâ conferta foliolis ovato-lanceolatis (oblongis) pinnato-laciniatis. L*inn*. Anthriſcus Plinii caucalis ſemine aſpero floſculis rubentibus. *C. B.*

126 DAUCUS ſeminibus hiſpidis. *Linn.* Daucus vulgaris *Cluſ.* *Carotte*, *Chiroüis.*

127 Dauc. . . radiis involucris, planis, laciniis recurvis. *Roy.*
Gingidium. Mathioli.

128 PEUCEDANUM pinnis duplicato-pinnatis foliis anguſtis breviter trifidis. H*all*. Carvifolia. *J.* B.

129 CHRITHMUM foliolis lateralibus bis trifidis. *Linn.*
Apium pyrenaicum thapſiæ facie. *T.*

130 LIGUSTICUM foliis multiplicato-pinnatis foliolis pinnatim inciſis. L*inn*. Cicutaria latifolia fœtida. *à l'Eſperou.*

131 CONIUM ſeminibus ſtriatis. L*inn*. Cicuta major. *C. B.*
Folia tripinnata, foliolis oblongis ſerratis, vel ſemi ſeptifidis, caulis maculoſus. *à las agarelles rarement jauvertaſſe.*

132 ŒNANTHE foliis omnibus multifidis obtuſis fere æqualibus. L*inn*.
Œnanthe. chærophylli foliis. *C. B.*
Succus flaveſcens in radicibus.

133 Œnanthe foliolis radicalibus inciſis ovatis, caulinis integris linearibus longiſſimis, ſimplicioribus. *Linn.*

Œn. apii folio. *C.* B.

134 ŒNANTHE fructibus globoſis. *Linn.*
Œn. luſitanica ſemine craſſiori & globo-
ſo. *T.*

135 Œn.
Œnanthe cherophylli foliis. *H. R. M.*

136 CORIANDRUM fructibus globoſis. *Linn*
Coriandr. majus. *C. B. Coriandre.* Foliola
ima ſuborbiculata.

137 Coriandr. fructibus didymis. *Linn.*
Coriandr. minus teſticulatum. C. *B. Prè*
Caunelles.

138 SCANDIX ſeminibus roſtro longiſſimo ex-
tenſis. *Linn.*
Foliis omnibus tenuiſſime diviſis. *Hall. Pei-
gne de Venus.*
Scandix ſemine roſtrato vulgaris. *C.* B. Se-
mina erecta pedunculo longiora.

139 *S*cand. . . ſeminibus roſtratis patulis pe-
dunculo brevioribus.
Scandix cretica minor. *C. B.* odore aniſi
à Caſtelnau.

140 Scand. . . ſeminibus ſulcatis angulatis. *Linn*
Myrrhis major vel cicutaria odorata. *C.* B
Tripinnata pinnis pinnatifidis oblongis. *Cer-
feuil muſqué.*

141 Scand. . . ſeminibus nitidis ovato-ſubulatis
Linn. Cerfeuil.
Chærophyllum ſativum. *C. B.*

D. *FLORIBUS UMBELLIFERIS*, FOLIOLIS
ultimis latis lobatis ſæpius inciſis.

142 BUBON foliolis Rhomboideis ovatis cre-
natis, umbellulis numeroſiſſimis. *Linn*
Apium Macedonicum. *C. B.* Folia bipin-
nata

nata, foliolis ovato ſerratis. *Perſil de Macedoine.*
143 LASERPITIUM foliolis cordatis (ovatis) inciſis. *Linn.*
Laſerp. foliis latioribus lobatis. *T.* Libanotis Theophraſti. *Lobel.* *à l'Eſperou.*
144 Laſerp. . . foliolis ramoſis ſeſſilibus. *Roy.* Laſ. Gallicum. *C. B.* *Au Serre de la Cabane près d'Alais.*
145 ANGELICA foliorum impari lobato. *Linn.* Angelica ſativa Offic. imperatoria ſativa. *T.* *L'Angelique des Jardins.*
146 Angel. . . foliolis æqualibus ovato lanceolatis ſerratis. *Linn.* Imperatoria pratenſis major. *T.* *Angelique des Prés.*
147 Ang. foliolis tripartitis, lobis ſuperne inciſis. *Linn.*
Angel. montana perennis aquileginæ folio. *T.*
148 LIGUSTICUM foliis multiplicibus, foliolis ſuperne inciſis. *Linn.* *Liveche.*
Angelica montana perennis paludapii folio. *T.* *à l'Eſperou.* *à la Louzere.*
149 SIUM foliis duplicato pinnatis. *Linn.* Liguſticum græcum apii folio. *T.*
150 SELINUM foliolis radicalibus ovatis inæqualiter ſerratis. *Linn.* Oreoſelinum apii folio majus. *T.* Pinnis pinnatis, pinnulis appendiculatis ſerratis triangularibus. *Haller.* *à l'Eſperou.*
151 Selin. . . foliolis ovato-acutis, acutè ſerratis & inciſis. *Linn.*
Oreoſelinum apii folio minus. T. Pinnis ad angulos obtuſos pinnatis, pinnulis inciſis non ſerratis. *Haller.* *à l'Eſperou.*
152 Selin. . . foliolis pinnatim laciniatis, lacinulis trifidis. *Linn.*

Daucus Alſaticus. *C. B.* Pr. Oreoſel. Pratenſe cicutæ folio. *T.*

. 153 Selin. . . radice fuſiformi multiplici. *Linn.* involucro univerſali nullo. H*all.* Thyſſelinum Plinii. pinnis ovatis ſerratis.

154 ETHUSA. *Linn.* Cicuta minor petroſelino ſimilis. *C. B.*

Bipinnata foliolis inciſis pinnulis oblongis. *Petite Ciguë.*

. 155 CHÆROPHYLLUM foliolis diſſectis, petiolis univerſalibus ramiferis utrimque membranâ auctis. L*inn. à la Serane.*

Myrrhis ſeminibus ſtrictis longiſſimis. *Haller.*

Cicutaria alba. L*ugdun. à l'Huort-Dieu à l'Eſperou.*

156 Chærophyll. . . caule maculato geniculis tumidis. L*inn.*

Chærop. ſylveſtre. *C.* B.

157 Chærop. radice turbinatâ carnoſa. *Linn.*

. 158 PASTINACA foliis decompoſito-pinnatis. *Linn.*

Paſtinaca ſylv. *C. B. La Janete*, L*ates.*

. 159 SMYRNIUM foliis caulinis ternatis petiolatis. L*inn.*

Smyrn. Mathioli. *à ſaint Paul.*

. 160 APIUM foliolis caulinis cuneiformibus. L*inn.*

Apium paluſtre & Offic. C. B. *Ache.* Ap. foliis ſemitrifidis ſerratis. H*aller.* Apium dulce Celeri italor. *C. B.* Varietas.

161 Ap. . . foliis caulinis linearibus. L*inn.* Petroſelinum Offic. *Perſil. Jauver.*

Na Imperatoria. L*inn.* Ægopodium. L*inn.* Ammi perenne. *Moriſſon.* Tordylium Syriacum &c. Ad trifoliatas attinent.

). FLORIBUS DIFFORMIBUS *polypetalis.*

162 FUMARIA pericarpiis monoſpermis, foliolis obtuſis inciſis. *Linn.*
Fumaria officin. C. B.
163 Fum. . . . foliis ſiliformibus ſpicâ ovatâ, caule erecto.
Fum. tenuifolia ſurrecta. *J.* B. Fum. nobilis Monſpel. C. *B.* Pericarpia monoſperma, folia quadripinnata.
164 HYPECOUM ſiliquis arcuatis compreſſis articulatis. H. *Upſ.*
Hypecoum latiore folio. *T. à Balaruc.*
65 Hypecoum ſiliquis pendulis teretibus æqualibus. H. *Upſ.*
Hypecoum tenuiore folio. *T.* Cuminum ſylveſtre. *Dalech.*

ORDO VIII.

lantæ decompoſitæ floribus compoſitis foliolis anguſtis.

. FLORIBUS CAPITATIS ET *corymboſis.*

66 CINARA foliis bipinnatis anguſtis, caule ſpinoſo. Cyn. ſylveſtr. latif. C. B. *La Cardonete. à Perauls.*
67 CENTAUREA calycibus ſquamoſis, folii

radicalibus duplicato-pinnatifidis, caulinis dentato pinnatis. *Linn.*
Stœbe Salmantica 3. *Cluſ.* Jacea calyculis argenteis major. *T.*

168 Cent. . . calycibus ciliatis, foliis filiformibus bipennatis, caule folioſo ramoſo. Jacea foliis candicantibus laciniatis calyculis non ſplendentibus. *T.*

169 Cent. . . calycibus inermibus, ſquamis lineari-ſubulatis, foliis pinnatis ſerratis. *Linn.* Jacea annua foliis laciniatis ſerratis purpuraſcente flore. *T.*

170 Cent. . . ſquamis calycinis glabris integerrimis, inermibus, foliis bipinnatis foliolis dentatis. Centaurium majus foliis in profundas lacinias diviſis. *T.*

171 ARTEMISIA foliis compoſitis multifidis floribus ſubgloboſis pendulis receptaculo pappoſo. *Linn.* Abſinthium Ponticum ſeu Romanum Offic. *T.* Folia incana, pinnata pinnis bilobis latioribus, *à Louzere.*

172 ARTEMISIA foliis compoſitis multifidis floribus ſubrotundis, nutantibus, receptaculo nudo. *Linn.* Abſinthium Ponticum tenuifolium incanum. *C. B.*

173 Artem. . . foliis compoſitis multifidis, racemis ſimplicibus alternis floribus erectis ſeſſilibus. *Royen.* Abſinthium ſeriphium belgicum. C. B. Folia tomentoſa, rami floriferi nutantes.

174 Artem. foliis multifidis ſetaceis, caule erecto. *Linn.*
Abrotanum mas anguſtifolium majus. *C. B.*

175 Artem. . . foliis multifidis linearibus caule procumbente. *Linn.* Abrotanum campeſtre caulibus rubentibus. *T.* Et albicantibus

bus. *T.* Seu vireſcentibus.

176 TANACETUM foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis inciſis ſerratis. *Linn.* Foribus umbellatis. *H.* Tanac. vulgare luteum. C. B. *Tanaiſie.*

177 VERBESINA foliis pinnatis, foliolis pinnatifidis laceris.

Bidens Americana apii folio. *T.*

178 SENECIO foliis pinnatis, pinnis multiformibus, dentatis, floribus umbellatis luteis. *Haller.* Jacobea vulgaris laciniata. C. B.

179 Senecio foliis ramoſis, nervo & pinnulis planis, & anguſtiſſimis floribus umbellatis. *Haller.* Ageratum ferulaceum *Lugd.* *Ciſtre.*

180 BUPHTHALMUM floribus nudis foliis ſubtus incanis pinnatis, pinnis argutè ſerratis. *Haller.* Bupht. tanaceti minoris folio. *C. B.* *à Aiguemorte.* Floris radicis & diſcus flavus. Buph. caule ramoſo, foliis pinnatifidis laciniis linearibus dentatis ſerratis, floribus penunculatis. *Linn.*

181 Bupht. . . caule decompoſito calycibus ramiferis. *Linn.* *La dulcinée.*

182 Bupht. . . caule ramoſo foliis pinnato-multifidis ſetaceis, calycibus tomentoſis pedunculatis. *Linn.* Buphtalm. cotulæ folio. C. B. Cotula flore luteo radiato. *T.*

183 Bupht. . . foliorum ſerraturis ſetaceis radiis florum albis.

Chamæmelo affine buphtalmum ſegetum altiſſimum. *J. B.* Chamæmelum leucanthemum magno flore. *C. B.*

184 Bupht. . . caulibus ſimplicibus unifloris, foliis pinnato-multifidis. *Linn.* Pyretrum

bellidis flore. C. B. *à l'Eſperou.* Radio rubello, diſco luteo.

185 ANTHEMIS receptaculis conicis paleis lanceolatis, ſeminibus coronato-emarginatis. *Linn.* Chamæmelum inodorum. Buphtalmum. *Fuchs.* Pedunculi quinque ſtriati, longi, folia incana, inodora, margo ſemen coronans tetragonus.

186 Anthem. . . foliis pinnato-decompoſitis, laciniis linearibus caulibus diffuſis, radice annuâ. *Royen.*
Chamæmelum fætidum. *C. B. Vers Sete.* Anthem. receptaculis conicis, paleis ſetaceis, ſeminibus nudis. H. *Upſal.*
Pedunculi octo fere ſtriis ſulcati paleæ ſetæ inſtar anguſtæ, nulla corona ſemini.

187 MATRICARIA receptaculis conicis, radiis deflexis, ſeminibus nudis, ſquamis calycinis margine æqualibus. *Linn. H. Upſal.* Anthemis foliis pinnato-decompoſitis, laciniis ſetaceis. H. *Cliff.* Chamæmelum nobile ſeu leucanthemum odoratius. *C. B. Chamomille des Boutiques.*

188 Matric. . . receptaculis hæmiſphæricis, radiis patentibus, ſeminibus coronato-marginatis, ſquamis calycinis margine exſoletis. *Linn.*
Matric. foliis ſupra decompoſitis ſetaceis, pedunculis ſolitariis. *Linn.*
Chamæmelum vulgare leucanthemum *Dioſc. C. B. Chamomille vulgaire.*

189 MATRICARIA foliis compoſitis planis, foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis. *Linn. Matricaire uſuelle.*
Matric. vulgaris ſeu ſativa. *C.* B. Variat flore aphyllo ſeu vix radiato, petalis flo-

rum fiſtulis. Flore pleno &c.

190 Matricar. . . foliis duplicato pinnatis pedunculis ſolitariis. *Linn. Camomille Orientale blanche à feüille d'abſinte.*

191 CHRYSANTHEMUM foliis pinnatis, pinnis ſerratis, caule multifloro. *Roy.* Matricaria tanaceti folio flore majore, ſemine umbilicato. *T. à Alais.*

192 ACHILLÆA foliis pinnatis, foliis obtuſe lanceolatis ſerrato dentatis. *Linn.* Ptarmica incana pinnulis criſtatis. *T.*

193 Achill. . . foliis duplicato-pinnatis glabris laciniis linearibus acutis laciniatis. *Linn.* Millefolium vulgare album. *C.* B. H*erbe au Charpentier.*

Achill. pinnis foliorum plurimis longe æqualibus pinnatis pinnulis trifidis & quinquefidis. *Hall.*

194 Achillæa foliis bipinnatis pinnulis linearibus indiviſis. Ptarmica alpina foliis matricariæ. Triumpheti. Umbellæ ſemifloſculos albos gerunt, caules recti ſimplices foliis glabris bipinnatifidis linearibus veſtitæ, folia ambitu lanceolata.

195 Achill. . . foliis linearibus pinnatifidis villoſis, foliolis tripartitis intermedio longiore. *Linn.* Achill. pinnis foliorum æqualibus tomentoſis, pinnulis primis trifidis, ſecundis ſimplicibus. *Haller.* Millefolium tomentoſum luteum. *C. B.*

196 Achill. . . pinnis æqualibus confertis tomentoſis, pinnulis capillariter diviſis. H*all.* Millefolium odoratum Monſpelienſe. Pillet. *T. Près de Ville-nove.*

197 Achill. . . pinnis foliorum ſemipinnatis & varie inciſis. *Haller.*

Millefol. purpureum majus. T. *Mille feüille.*
197 Achill. pinnis foliorum & pinnulis remotis & anguſtis pinnulis plurimis. H*aller.* Millefolium nobile Tragi.
198 ACHILLÆA elatior foliis pinnatis, pinnis minutiſſime ſerratis. *Vaillant.* Act. Ac. Ptarmica alpina foliis profundè inciſis. *T.* *A l'Eſperou.*
199 Achill. . . foliis pinnatis foliolis lanceolatis inciſis ſerratis ſubtus lanigeris. *Linn.* Millefolium Orientale, foliis tanaceti incanis, radiis pallide luteis. *T.*
200 Achill. . . foliis duplicato-pinnatis glabris, laciniis linearibus acutis laciniatis. *Linn.* Achill. pinnis foliorum plurimis, longe æqualibus pinnatis, pinnulis trifidis & quinquefidis. H*aller.* Millefolium vulgare album. C. *B. Mille feüille.*
201 Achill. . . foliis linearibus pinnatifidis villoſis, foliolis tripartitis intermedio longiore. *Linn.* Pinnulis primis trifidis, ſecundis ſimplicibus. *Haller.* Millefolium tomentoſum luteum. *C.* B.
202 SCABIOSA corollulis trifidis, foliis caulinis tripinnatis filiformibus. Scabioſa capitulo globoſo, foliis in tenuiſſimas lacinias diviſis. C. *B.* *à Gramont.*
203 Scab. . . corollulis quinquefidis, foliis radicalibus ovatis, crenatis, caulinis pinnatis ſetaceis. L*inn.* Scab. minor vulgaris. *J.* B.
204 Scab. . . corollulis quinquefidis foliis diſſectis, receptaculis floſculorum ſubrotundis. *Linn.* Scab. ſtellata folio laciniato major. *C. B.*

CLASIS XI.

Plantæ laciniatæ.

LACINIATÆ dicuntur Plantæ quarum folia ſunt ut plurimum integra ſed lateraliter ultra marginem & ſæpè uſque ad nervum medium inciſa, & quaſi lacerata.

Segmenta lateralia ſæpiſſimè petiolo ſunt deſtituta; ſeu per baſim latam nervo communi adhærent, unde differunt à foliis compoſitis pinnatis; quorum ſingula foliola petiolo proprio inſident: interea propter affinitatem *pinnatifida* ac ſemipinnatifida vocitantur.

Segmenta illa non ſunt radiatim diſpoſita, nec nervos à centro communi, ſed tantum ab axi communi folii, ſi quos habent, mutuantur, atque ſunt ut plurimum dentata, vel eroſa & inæqualiter ſinuata, unde diſcrepant hæc folia à palmatis.

Si ſegmentum impar, quo folium terminatur, ſit aliis longè amplius, tunc folium lyræ claviculis ad manubrium ornatæ figuram aliquatenus refert & *Lyratum* dicitur. Aliquando apex cum ſegmentis lateralibus haſtæ, aliquando ſagittæ hinc & inde uncinatæ figuram repræſentat, unde folium *haſtato* vel *ſagittato-pinnatifidum* vocatur.

Si ſegmenta ſeu laciniæ prominentes & excavationes marginis lineis curvis terminentur folium dicitur *ſinuatum*, ut in quercu vulgari, aſplenio &c. gallicè, *feuille chantournée.*

ORDO I.

Plantæ laciniatæ cryptogamæ ſeu algæ, & filices laciniatæ.

1 PTERIS fronde pinnatâ, foliolis linearibus parallelis. *Linn.* Strutiopteris *Hall.*

2 ASPLENIUM fronde pinnatifidâ, laciniis alternis adnatis. *Linn.*
Aſplenium ſive ceterach. *J. B.* *l'Herbe dorée.*

3 POLYPODIUM fronde pinnatifidâ foliolis lanceolatis baſi connatis ſinuato-pinnatifidis. *Linn.*
Polypodium Cambro-britannicum pinnulis ad margines laciniatis. *Boerhaav.*

4 Polypod. . . fronde pinnatâ, foliolis lanceolatis integris, ſerrulatis, alternis connato-ſeſſilibus. *Linn.* Polypodium vulgare. *C. B.* *Polypode.*

5 ACROSTICUM fronde lineari-laciniatâ. *Linn.*
Filix ſaxatilis corniculata. *C. B.*

6 MARCHANTIA capitulo ſphærico, pedunculo baſi vaginato. Lichen petræus. *C. B.* Claſſ. 11. pag. 31. n. 201.

7 March. . . floribus maſculis cruciformibus, femineis ſeſſilibus lunulatis.
Lunaria vulgaris. *Michel.* In labyrintho horti regii. Monſp. *adde alias algas ceſpititias* à n. 186. ad 201. Claſſ. 11.

8 LICHEN foliaceus repens laciniatus obtuſus glaber, ſupra lacunoſus, ſubtus tomentoſus. *Fl. Suec.* *Pulmonaire de Chêne.*

Lichen pulmonarius ſive Pulmonaria arborea. *J.*

9 LICHEN foliis laciniatis cinereis, laciniis linearibus apice piloſis. *Linn.*
Lich. cinereus arboreus marginibus fimbriatis. *T.*

10 Lich. . . cruſtæ modo ſaxis adnaſcens tinctorius. *T. La Perelle.*

11 Lich. . . pallide viridis rugoſus margine undulatus. *Royen.*
Lich. Dioſcoridis & Plinii ſecundus. *Columm.*

12 Lich. . . foliis planis multifidis obtuſis, laciniis verſùs apices latioribus. *Linn.* Lich. cruſtæ modo arboribus adnaſcens olivaceus. *Vaillant.*

13 Lich. . . papyraceus nivem referens. Folia criſpa & complicata. *à Gramont.*

14 Lich. . . imbricatus, foliolis multifidis, glabris, obtuſis, canis, punctis rugis eminentibus. *Linn. Uſnée.*
Lichen nigricans omphalodes. *Vaill.* *Uſnea.* offic. ſupra pag. 30.

15 FUCUS cornucerui diviſurâ. *T.*

ORDO II.

Plantæ apetalæ laciniatæ.

16 QUERCUS foliis deciduis ſubtus tomentoſis pinnato-ſinuatis ſuperne latioribus, glandibus ſeſſilibus. Quercus latifolia mas quæ brevi pediculo eſt. *C. B. Chêne, Roure, à Gramont.*

17 Querc. . . foliis deciduis oblongis ſuperne

latioribus, ſinubus acutioribus angulis ob-
tuſis. *Linn.*
Querc. cum longo pediculo. *C. B.*
18 QUERCUS foliis pinnato ſinuatis lævibus
fructu ſeſſili. *Royen.*
Quercus parva ſive Fagus Græcorum. *C. B*
19 Querc. . . foliis oblongo-ovatis ſinuato
ſpinoſis, ſubtus tomentoſis fructu pedun
culato.
Ilex arbor luci Gramuntii. Bot. Monſp.
20 Querc. . . foliis ovatis dentato-ſpinoſi
utrimque glabris fructu ſeſſili. *Royen.* Ile
coccigera. *J. B. Avauſſes.*
21 Querc. . . foliis orbiculatis utrimque gla
bris ſinuato-ſpinoſis.
Ilex folio agrifolii. Bot. Monſpel. *au boi
de la Verune.*
Vide Palmatas hiſce affines ut Morum, Fi
cum, Populum, platanum, Xanthium i
Claſſe viij. pag. 197.
22 RUMEX androgynus involucro femini
dentato, foliis ſupra petiolum emarginati
Hall. Lapathum violon vulgo.
Lapathum pulchrum Bononienſe ſinuatum
J. B.
23 Rum. . . foliis ovato-lanceolatis baſi ſi
nuato-haſtatis.
Lapathum marinum ſinuatum. *J. B. à Ai
guemortes.*
24 ATTRIPLEX caule annuo foliis deltoide
lanceolatis obtuſe dentatis ſubtus farinacei
Linn.
Attriplex maritima laciniata. *C. B.* Foli
ovato-trigona lateribus ſinuato dentata. Paſ
ſim in fimetis.
25 Attripl. . . caule erecto annuo foliis op

poſitis in medio haſtatis.
Attripl. . . folio haſtato. *H. R. P.*

26 CHENOPODIUM ſoliis oblongis dentato-ſinuatis, racemis nudis multifidis. *Linn.* Chenop. ambroſioides folio ſinuato. *T.*

27 Chenop. . . folio lævi paucis & ampliſſimis dentibus inciſo, ramis florigeris laxis & ramoſis. *Haller.* Chen. foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramoſis nudis. *Linn.* Chen. ſtramonii folio. *Juſſieu.*

28 Chen. . . foliis rhomboideo-triangulis eroſis poſtice integris ſummis oblongis racemis erectis. *Linn. Fl. Suec.* Chen. folio ſinuato-candicante. *T.*

29 Chen. . . foliis cordato-triangularibus obtuſiuſculis dentatis, racemis erectis compoſitis ſubnudis caule brevioribus. *Linn. Fl. Suec.* Attriplex ſylveſtris. Pes anſerinus *Dalech.* Vide plura in ſparſis latifoliis pag. 99.

30 SPINACIA *Linn.* mas & fæmina. *Les Epinards.* Folia ſæpè haſtata, aliquando haſtatoſinuata & baſi inciſa.

ORDO III.

Plantæ laciniatæ monopetalæ regulares.

31 HYDROPHYLLUM. *Linn.* Dentariæ affinis echii flore. *Dodart. Act. Ac.*

32 CONVOLVULUS foliis cordato-digitatis

ſericeis, foliolis linearibus intermediis duplo longioribus. *Linn.*

Convolvul. peregrinus pulcher betonicæ folio. *J. B. à Cete.*

33 MALVA caule repente foliis multifidis. *Linn.*

Malva repens alceæ folio flore helvolo *Dillen.*

34 SOLANUM caule aculeis recurvis foliis ſinuatis ſubtus tomentoſis utrimque aculeatis, pedunculis aculeatis. *Flor. Zeilan.*

Solanum pomiferum fruteſcens africanum ſpinoſum nigricans borraginis flore foliis profunde laciniatis. *Moriſſon.*

35 Solan. . . caule aculeato fruticoſo, foliis ovatis ſinuatis aculeis utrimque rectis. *Royen.*

Sol. Indicum ſpinoſum flore borraginis. *Dillen.*

36 Solan. . . caule aculeato fruticoſo foliis ovatis, lateribus laciniatis aculeis utrimque rectis. *Linn. Solanum de la Jamaique.*

37 Solan. . . foliis aliis trifidis aliis ſimplicibus. *Haller.*

Solan. ſcandens vel Dulcamara. *Morelle, Loque.*

38 Solan. . . caule inermi herbaceo foliis ovatis. *Linn.*

Solan. Officin. variat foliis valde undulatis hirſutis, baccis luteis. *Haller.*

39 Solan. . . foliis ovatis iutegerrimis villoſis calycibus aculeatis. *Linn.*

Melongena. *T. Moyene, Aubergine.*

40 DATURA pericarpiis erectis ovatis. *Linn. Pomme épineuſe. Endormie.*

Stramonium fructu ſpinoſo oblongo flore albo. *T.*

Variat aculeis fructûs conicis craſſis, flori-

bus violaceis, &c.

41 DATURA pericarpiis nutantibus globoſis. *Linn.*
Stramon. fructu ſpinoſo rotundo flore albo. *T.*

42 HYOSCIAMUS foliis amplexicaulibus. *Linn. Juſquiame Careillade.*
Hyoſc. vulgaris & niger. *C. B.* Folia ſinuato-dentata.

43 Hyoſciam. foliis petiolatis, floribus ſeſſilibus. *Linn.*
Hyoſciam. albus major. *T.* Folia ovata crenato-ſinuata.

40 Hyoſciam foliis lanacoletis ſubdentatis calycibus ſpinoſis. H. *Upſ.*

45 PLANTAGO foliis linearibus pinnato-dentatis. *Linn.*
Coronopus hortenſis. *C.* B. *Corne de Cerf.*

46 VALERIANA floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indiviſis. *Linn. H. Upſ.*
Valer. major hortenſis. *C. B.* Folia ima laciniata ſunt.

47 Valeriana floribus monandris foliis pinnatifidis H. *Upſ.*
Valer. foliis calcitrapæ. *C. B.* Folia omnibus valerianis oppoſita.

48 Valeriana caule dichotomo foliis oblongis rariter inciſis, ſeminis mucrone ſimplici. *Haller.*
Valerianella arvenſis præcox ſemine compreſſo. *T.*

49 Valeriana caule ſuperne quadrifido, foliis imis biſpennatifidis ſeminis pappo plumoſo.
Valerianella ſemine umbilicato hirſuto minore. *Moriſſon. à la Colombiere.*

50 VALERIANA caule dichotomo, foliis ſerrato dentaris, ſeminibus tricuſpidatis, pedunculis umbelliferis conicis.
Valerianella cornucopioides echinata *Columm.*

51 Valeriana floribus triandris, ſoliis radicalibus cordatis, aliis laciniatis.
Valeriana foliis ad caulem tripteris. *Haller.*
Valeriana alpina 1a. *Cluſ. à l'Eſperou.*

52 VERBASCUM foliis pinnato-ſinuatis ſubtùs tomentoſis. *Royen.*
Verb. nigrum foliis papaveris corniculati. C. B. Folia ramiſera decurrentia, caulis patulus.

53 Verbaſcum foliis glabris ſerrato-dentatis radicalibus ſinuatis. *Roy.*
Blattaria lutea folio longo laciniato. *C. B.*

54 Verbaſcum foliis utrimque tomentoſis, imis baſi pinnatifidis. *à Clermont Lodeve*, Folia periolata, lanceolata, crenara.

Scabioſas & Echinopos inter compoſitos flores cum Tournefortio reponimus licet ſint tantum floribus aggregatis. Verbaſcum & Hyoſciamum floribus anomalis gaudere novimus licet inter regulares ſint repoſiti.

ORDO IV.

ORDO IV.

Plantæ laciniatæ floribus monopetalis non circinnatis.

A. *ANGIOSPERMÆ.*

55 SCROPHULARIA foliis profundè inciſis, pedunculis multifloris ex alis foliorum. *Haller.*
Scrophularia annua, folio lamii flore luteo. *Moriſſon.*
Folia cordata oppoſita, quandoque verticillata.

46 Scrophularia foliis difformibus, pedunculis lateralibus plurimis. *Royen.*
Scroph. Hiſpanica ſambuci folio glabro. *T.*

57 ANTIRRHINUM foliis ſpatulatis ſerratis corollis patulis.
Linaria bellidis folio. *T.* Folia caulina ſæpe digitata, ima ſpatulata.

58 MELAMPYRUM ſpicis conicis laxis laceris. *Fl. Suec.*
Melamp. purpuraſcente comâ. *C. B. Blé de Vache.*
Melamp. foliis laciniatis laxè ſpicatis. *Roy.*

59 Melampyrum ſpicis quadrangularibus compactis obtuſis ciliatis. *Fl. Suec.*
Melamp. luteum anguſtifolium. *C. B.*

60 Melampyrum florum conjugationibus remotis, corollis clauſis. *Fl. Suec.*
Melampyrum luteum latifolium. *C. B. à Ba-*

nahu près l'Eſperou. Folia lanceolata, bracteæ inciſæ.

61 PEDICULARIS alpina folio ceterach. *Helvet flora* ſceptrum carolinum *Rudbeck.*

62 Pedicularis caule ſimplici foliis ſemipinnatis obtuſis, laciniis imbricatis crenatis. *Fl. Lappon.*

63 Pedicularis caule ſimplici foliis lanceolatis, ſemipinnatis, ſerratis acutis. *Fl. Lappon.*
Pedicul alpina alphodeli radice purpuraſcente flore. *T.*

64 ACANTHUS foliis ſinuatis inermibus. *Linn. à Niſmes.*
Acanthus ſativus vel mollis Virgilii. *C. B.*
Acante, Brancurſine.

65 Acanthus foliis pinnatifidis ſpinoſis. *Linn.*
Acanthus aculeatus. C. *B.*

B. *GYMNOSPERMÆ FOLIIS OPPOSITIS.*

66 TEUCRIUM foliis lanceolatis obtuſis dentatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Royen.*
Chamæpithys moſchata foliis ſerratis. *C. B.*

67 Teucrium foliis ovatis inciſo-crenatis petiolatis floribus laxe verticillatis *Linn. Petit-Chêne.* Page 145. n. 176.

68 SALVIA foliis ſimplicibus dentato-pinnatis aſperis. *Linn.*
Salvia verrucoſo laciniato folio. *T.*

69 Salvia foliis oblongis ſinuato-dentatis, floribus verticillos comprimentibus. *Linn.* p. 164. n. 178.

70 Salvia foliis ſerrato-ſinuatis, corollis calyce anguſtioribus. *Linn.*
Horminum ſylveſtre lavandulæ flore. C. *B.*
Prudhomme.

71 Salvia foliis ovatis inciſo-crenatis, verticillis ſubnudis. *Linn.*

Sclaræa pratenſis foliis ſerratis flore cæruleo. *T. à Sellenove.* Folia ovato-lanceolata, ſerrata, verticilli diſſiti p. 146. n. 184.

72 BRUNELLA foliis imis integris, ſuperioribus laciniatis, parviflora. *Haller.* Brunella folio laciniato *T. à Gramont.*

73 Brunella foliis imis integris, ſuperioribus laciniatis, grandiflora. *Haller.* Brunello alpina laciniata flore magno. *Boerhaav.*

74 Brunella foliis dentatis, ſpicâ folio minore. *Haller.*
Bunella major foliis non diſſectis. *C. B.*

75 PHLOMIS foliis laciniatis. *Royen. Ex Oriente.*

76 SIDERITIS foliis ovatis & lanceolatis inciſo-ſerratis. *Linn.*
Marrubiaſtrum folio cardiacæ. *Boccon.*

77 LAVANDULA foliis duplicato pinnatifidis. *Linn.*
Lavandula folio diſſecto. *C. B.*

78 Lavandula foliis pinnato-dentatis. *Linn.*
Stœchas folio ſerrato. *C. B.*

79 HYSSOPUS ſpicis interruptis. *Linn.*
Chamæpythis Auſtriaca. *Cluſ. La Ruiſchiene.*

80 LYCOPUS. *Linn. rumene.*
Varia: foliis glabris, villoſis. &c.

81 VERBENA foliis mnltifido laciniatis, ſpicis filiformibus. *Linn.*
Verbena foliis laciniatis, ſummis tripartitis, ſpicis anguſtis longiſſimis. *Haller.*
Verbena communis flore cæruleo. *C. B.*
Verveine.

ORDO V.

Plantæ laciniatæ floribus polypetalis regularibus.

A. *TETRAPETALIS CRUCIFORMIBUS.*

82 MYAGRUM ſiliculis biarticulatis foliis extrorſum ſinuatis denticulatis. *Linn.* Rapiſtrum monoſpermum. *C. B.* Junio in ſatis. ſiliquæ nodo ſtriato globoſo, primo ſtrictiori.

83 Myagrum ſiliculis ſulcatis lævibus, foliis oblongis dentato-ſinuatis. *Linn.* Rapiſtrum Orientale folio raphani, capſulis rugoſis. *Boerhaav.*

84 CRAMBE foliis & foliolis alternatim pinnatifidis. *Linn. Royen.* Rapiſtrum Orientale acanthi folio. *T.* Stamina bifida.

85 Crambe foliis pinnato-haſtatis. *Royen.* Crambe Orientalis, dentis leonis folio, erucaginis facie. *T.*

86 CRAMBE foliis ſucculentis linearibus pennato-dentatis. Crambe maritima foliis erucæ anguſtioribus fructu haſtiformi. *T. Roquette de mer.*

87 VELLA. *Linn.* Naſturtium ſylveſtre Valentinum. *Cluſ.*

88 ALYSSUM foliis auriculatis glabris profundè dentatis. *Haller.* Myagrum fœtidum. *C. B.*

89 Alyſſum foliis lanceolatis repando-dentatis. *Linn.*

Alyſſoides incanum foliis ſinuatis. *T.*

90 THLASPI ſiliculis verticaliter cordatis. *Linn.*

Burſa paſtoris major folio ſinuato *C. B.* *Bourſette.*

91 LEPIDIUM foliis oblongis multifidis, *Linn.* *Naſitord.*

Naſturtium hortenſe vulgatum. *C. B.*

92 Lepidium floribus apetalis diandris. *Linn.*

Lep. foliis imis multifidis, ſummis linearibus peranguſtis. *Haller.*

Naſturtium ſylveſtre. *J. B.* Thlaſpi minus Germanicum Tab. Ic. *Vers Ville-neuve.*

93 Lepidium foliis caulinis pinnatis multifidis, ramiferis cordatis amplexicaulibus integerrimis. *Linn.*

94 Lepidivm procumbens foliis pinnatifidis foliolo impari majori.

Naſturtium pumilum ſupinum vernum. *B. M.*

95 Lepidium foliis filiformibus apice pinnatifidis, caule nudo.

Naſturtium minimum vernum foliis tantùm circa radicem. *B. M.* Capſulæ thlaſpi umballatæ emarginatæ, petala æqualia.

96 COCHLEARIA foliis pinnatifidis. *Linn.*

Naſturtium ſylveſtre capſulis criſtatis. *T.* Coronopus Ruellii. Primo vere ingreditur acetaria.

97 Cochlearia folio cubitali. *T.* Armoracia & Raphanus ruſticanus. Offic. folia ima pinnatifida, cætera cubitalia lanceolata ſerrata. Caulina ſæpe inciſa.

98 IBERIS amara foliis linearibus apice pinnatifidis.

Naſturtium ſylveſtre Dalechampii, *à Gra-*

mont, flores umbellati.

99 Iberis foliis lanceolatis acutis ſubdentatis, floribus racemoſis. *Linn.*
Thlaſpi umbellatum arvenſe iberidis folio, *C. B.* Amarum, *J. B.* An ſatis diverſum à priori. Rectius dicitur Iberis foliis ſurſum lateſcentibus dentatis. *Haller.*

100 BISCUTELLA folio aſpero dentato ſiliquâ lævi. *Haller.*
Thlaſpidium Monſpelienſe, hieracii folio hirſuto. *T.*

101 CHEIRANTHUS foliis ſucculentis pinnato-dentatis.
Leucoium maritimum minus. *C. B.* Folia viridia, flores rubelli. *à la Plage.*

102 Cheiranthus foliis lanceolatis rariùs denticulatis obtuſis, incanis. *Linn.*
Heſperis maritima anguſtifolia incana. *T.* Folia caulina linearia, ima lanceolata ſinuato-dentata. *à la Mer, & à l'Eſperou. Giroflier de Mer.*

103 HESPERIS ramoſa tomentoſa foliis oblongis amplexicaulibus dentatis.
Heſperidi alpinæ ſimilis (ſurrecta) & magna. *J. B.* ſed procumbit. *à l'Eſperou.*

104 Heſperis foliis multifidis. *Royen.*
Heſperis flore albo minimo, ſiliquâ longâ, folio profundè dentato. *Boerhaave.*

105 ARABIS foliis amplexicaulibus dentatis, caule diffuſo ramoſo. *Royeni.*
Leucoium vernum perenne album majus. *T. à l'Eſperou.*

106 TURRITIS foliis radicalibus dentatis hiſpidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Linn.*
Turritis foliis inferioribus cichoraceis, cæ-

teris perfoliatæ. *T.*

107 Turritis foliis omnibus dentatis hiſpidis caulinis amplexicaulibus. *Linn.*
Turritis vulgaris minor. *Raii.*

108 SISYMBRIUM foliis ſimplicibus dentatis ſerratis. *Linn.*
Siſymbrium aquaticum, raphani folio, ſiliquâ breviore. *T.* Folia lanceolata inciſo-ſerrata, petiolis alatis. *à Lates.*

109 Siſymbrium foliis pinnatifidis ſerratis *Flor. Suec.*
Siſymbrium aquaticum foliis in profundas lacinias diviſis, ſiliquâ breviore. *T.* Folia ſæpê pinnata pinnis ſerratis.

110 Siſymbrium foliorum pinnis lineari-lanceolatis raro dentatis corollis luteis calice longioribus.
Synapi Monſpeſſulanum ſiliquâ aſperâ hirſutâ. *J. B.*

111 Siſymbrium foliis imis pinnatifidis, aliis longis lineari-lanceolatis, caule glabro.
Eruca ſylveſtris. *Lobel. Adv.* *Roquete ſauvage.*

112 Siſymbrium foliis pinnatifidis laciniis exterioribus majoribus caule hirſuto. *Linn.*
Eruca cærulea in arenoſis creſcens. *C. B.*

113 Siſymbrium pinnis rotundè ſinuatis obtuſis. *Haller.*
Eruca inodora. *J. B.*

114 Siſymbrium ſiliquis lateribus ſeſſilibus tubulatis aggregatis, foliis repando dentatis.
Eryſimum, polyceratium ſeu corniculatum. *C. B.*

115 Siſymbrium foliis pinnatis flaccidis, foliolis ſublinearibus integerrimis. *Linn.* Vide pinnatas.

116 Eryſimum ſiliquis cauli appreſſis. *Linn.*

Eryſimum vulgare. *C. B. Velar, Tortelle.*

117 ERYSIMUM foliis lyrato-pinnatis, extimo haſtato. *Linn.*
Eryſimum latifolium majus glabrum. *C. B.*

118 Eryſimum foliis lyratis extimo ſubrotundo *Linn.*
Siſymbrium erucæ folio glabro, flore luteo. *T.*
Barbarea fœmina Tabernæ. *Près ſaint Jean de Vedas.*

119 Eryſimum ſiliquis laxis foliis haſtato-pinnatis *Linn.*
Eryſimum anguſtifolium majus. *C. B.*

120 SYNAPIS ſiliquis hiſpidis roſtro obliquo longiſimo. *Lin.*
Sinapi apii folio *C. B.*

121 Synapis ſiliquis glabris tetragonis. *Linn.*
Synapi rapi folio. *C. B.*

122 Sinapis ſiliquis multangulis toroſo-turgidis roſtro proprio longioribus. *Linn.*
Rapiſtrum flore luteo. *C. B.*

123 BRASSICA radice cauleſcente orbiculari depreſſâ carnoſâ. *Linn.*
Rapa ſativa rotunda. *C. B. Rave.*

124 Braſſica radice cauleſcente fuſiformi. *Linn.*
Napus ſativa. *C. B.*

125 Braſſica foliis lyratis caule hirſuto, ſiliquis glabris. *Linn.*
Eruca latifolia alba. *C. B. Roquette.*

126 Braſſica foliis lyratis, caule hirſuto, ſiliquis retrorsùm hiſpidis. *Linn.*
Eruca ſylveſtris major lutea, caule aſpero. *C. B.*

127 Braſſica radice cauleſcente tereti carnoſâ. *Linn.*
Braſſica laciniata, fimbriata, criſpa &c. *C. B. Chou friſé.*

127 RAPHANUS ſiliquis teretibus toroſis bilocularibus. *Linn.*
Raphanus minor oblongus. *C.* B. *Raifort, Radis.*

128 Raphanus ſiliquis teretibus articulatis unilocularibus. *Linn.*
Raphaniſtrum ſiliquâ articulatâ glabrâ majore. *T.*

129 Raphanus ſiliquis ovatis angulatis monoſpermis. *Linn.*
Cakile ſive Eruca maritima latifolia. *J.* B.

130 BUNIAS foliis antrorſùm ſinuatis. Horti Upſalienſis. Erucago ſegetum. *T.*

131 CARDAMINE caule procumbente pinnis ovatis cum nervo confluentibus. *Haller.*
Naſturtium alpinum minus, reſedæ foliis. *T.*

B. *POLYPETALIS VARIIS.*

132 PAPAVER foliis ſimplicibus glabris inciſis caule multifloro. Horti Upſalienſis.
Papaver hortenſe ſemine albo. C. B. & ſemine nigro. *C.* B.

133 Papaver caule ramoſo foliis lineari-pinnatifidis, capſulis ſulcatis hiſpidis. Horti Upſalienſis.
Glaucium flore violaceo. T.

134 Papaver caule unifloro ſcabro ſubfolioſo foliis pinnato ſinuatis. *Linn.*
Papaver Orientale hirſutiſſimum, flore magno. *T.*

135 Papaver caule multifloro folioſo hiſpido, foliis pinnatifidis capſulis lævibus. Horti Upſalienſis.
Papaver erraticum flore pleno. *C.* B.

136 CHELIDONIUM glabrum pedunculis

unifloris. Horti Upſalienſis.
Glaucium flore luteo. *T.*
136 CHELIDONIUM hiſpidum, pedunculis unifloris. *Linn.*
Glaucium hirſutum flore phœniceo. *T.*
138 ARGEMONE. *Linn.*
Papaver ſpinoſum. *C.* B. P*avôt épineux.*
139 CISTUS foliis lanceolatis hirſutis margine repandis ; alis nudis. *Linn. Près Beziers.*
Ciſtus mas foliis undulatis & criſpis.
140 STATICE foliis caulinis decurrentibus. L.
Limonium peregrinum foliis aſplenii. *C.* B.
140 GERANIUM pedunculis biſloris, foliis quinquepartitis lobis pinnatifidis. *Linn.*
Geranium robertianum primum. *C.* B.
141 Geranium calycibus monophyllis, caule carnoſo nodoſo, internodiis filiformibus, foliis lobato-pinnatifidis. *Linn.*
Geranium Africanum noctu olens tuberoſum & nodoſum aquilegiæ foliis. *Boerh.*
142 Geranium pedunculis multifloris radicibus, pentaphyllis foliis cordatis laciniatis. *Linn.*
Geranium folio althææ. *C.* B.
143 CRATÆGUS foliis cordatis acutis, lacinulis acutis ſerratis. *Linn.*
Cratægus folio laciniato. *T.*
Cratægus folio ſeptem angulo ſubtus ſubhirſuto *Haller.*
Folia glabra palmato-lobata venis pinnatis. *Près d'Alais.*
144 Cratægus foliis ovatis repando angulatis ſerratis. *Linn.*
Meſpilus ſpinoſa ſive Oxyacantha Virginiana maxima. *Boerh.*
145 Eryngium foliis radicalibus pinnatim tripartito diviſis. *Linn.*

Eryngium vulgare. *T. Panicaut.*

146 HERACLEUM foliolis pinnatifidis, *Linn.* Sphondylium vulgare hirſutum. *C. B.* Folia pinnata ſæpè quina, foliola pinnato ſinuata aut triloba. *à l'Eſperou.*

147 LASERPITIUM foliolis ramoſis ſeſſilibus. *Royen.*

Laſerpitium Gallicum. *C. B.* Folia decompoſita, foliola quinqueloba. *Près Alais.*

ORDO VI.

Plantæ laciniatæ Floribus compoſitis floſculoſis.

148 CENTAUREA calycibus inermibus ſubrotundis glabris ſquamis ovatis foliis ſinuatis. Linn. *'Ambrette.*

Cyanus floridus odoratus turcicus ſive Orientalis major *T.*

149 Centaurea calycibus, glabris, ſquamis ovatis ſetâ reflexâ terminatis, foliis dentato-pinnatifidis ſerratis. *Linn.*

Jacea foliis cichoraceis villoſis, altiſſima flore purpureo. *T.*

150 Centaurea calycibus inermibus, ſquamis ovatis, foliis pinnatis, foliolis ſerratis decurrentibus. *Linn.*

Centaurium majus folio in lacinias plures diviſo. *C. B. Rhapontic.*

Foliola non gaudent petiolo diſtincto.

151 Centaurea calycibus inermibus, ſquamis

ovatis obtuſis, pinnatis glabris, foliolis integris impari ſerrato. *Linn.*

Centaurium majus alpinum luteum *Boerh.*

Folia ima pinnatifida.

152 CENTAUREA calycibus ſerratis, foliis linearibus, infimis dentatis ſuperioribus integerrimis. *Linn. Bleüet Caſſelunette.*

Cyanus ſegetum flore cæruleo. *T.* Flore carneo, albo &c.

Folia ima pennata, omnia pubeſcentia. floſculi radiales ſeptifidi.

153 Centaurea calycibus ciliatis oblongis, foliis pinnatifidis linearibus integerrimis. *Royen.*

Stæbe Auſtriaca humilis. *Cluſ.*

154 Cenraurea inermis calycum ciliis pinnatis, foliis oblongis villoſis humifuſis, floralibus verticillatis ligulatis.

Cyanus humilis albus, hieracii folio. Boc. Monſp.

155 Centaurea calycibus palmato-ſpinoſis reflexis, foliis oblongis decurrentibus tomentoſis.

Carduus Hiſpanicus purpureus foliis cichorii. *T* Folia infima ſinuata dentata.

156 Centaurea calycibus palmato-ſpinoſis, foliis decurrentibus ſpinuloſis emarginato-crenatis. *Linn.*

Jacea laciniata, ſonchi folio. *Boerh.*

157 Centaurea calycibus ſubulato-ſpinoſis, foliis decurrentibus inermibus lanceolatis (linearibus) inferioribus dentatis. *Linn.* Carduus ſtellatus foliis cyani. *C.* B. *Spina ſolſtitialis.*

158 Centaurea calycibus ſubulato-ſpinoſis ſeſſilibus, foliis linearibus pinnatifidis. *Linn. Calcitrapa.* Officin. *Chauſſetrape.*

159 Centaurea calycibus duplicato-ſpinoſis ſub

rotundis, foliis decurrentibus lanceolatis (ligulatis) ſinuoſis inermibus floribus lateralibus. *Royen.*
Jacea melitenſis capitulis conglobatis. *Boerhaav. au bois de Caunelle.* Folia omnia viſcida, mollia, ima ſinuata, ſpatulata.

160 CENTAUREA calycibus palmato-ſpinoſis, foliis decurrentibus inermibus, radicalibus pinnatifidis impari maximo. *Linn.*
Carduus Creticus, rapi folio. *T.*

161 Centaurea calycibus ſetaceo-ſpinoſis foliis ſinuatis ſpinoſis decurrentibus. *Linn.*
Carduus galactites. *J. B.*

162 Centaurea calycibus ciliato-ſpinoſis, foliis pinnatifidis laciniis ſuperioribus majoribus omnibus margine integris. *Royen.*
Carduus luteus centauroides ſegetum. *T.*
Jacea lutea ſpinoſa centauroides. *C. B.*

163 Centaurea calycum ſquamis quinque cuſpidatis reflexis, foliis ligulatis dentatis ſeſſilibus.
Carduus jaceæ folio, capitulis minoribus cum ſquamis tricuſpidibus. *T.*

164 Centaurea calycibus ſquamoſis, foliis lanceolatis, radicalibus ſinuato-dentatis, ramis angulatis (pentagonis) *Linn.*
Folia ſqualida tomentoſa, ima ad baſim ſemipinnata.
Jacea pratenſis latifolia. *C. B.*

165 Centaurea calycibus ſquamoſis, foliis radicalibus bipinnatifidis caulinis laciniatis.
Jacea calyculis argenteis major. *T.*

166 Centaurea calycibus ſquamoſis, foliis tomentoſis, radicalibus lanceolatis, caulinis pinnarifidis, caule ſimplici. *Royen.*
Centaurium majus humile capite pini. *T.*

Pappus plumoſus.

167 CENTAUREA inermis ſquamis ovatis integerrimis, foliis enſiformibus baſi dentatis, incanis, ramis angulatis.

Jacea nigra anguſtifolia *C. B.* Folia trinervia caulina ſeſſilia. Varietas Jaceæ latifoliæ.

168 Centaurea calycibus ciliato-ſpinoſis, foliis incanis lyratis inermibus, capitulis terminantibus.

Jacea Sicula cichorii folio flore luteo capite ſpinoſo. Bocc.

169 ONOPORDUM foliis decurrentibus ligulatis pinnatifidis.

Carduus tomentoſus, acanthi folio anguſtiori. *T.* Folia caule vix latiora caulem undique veſtientia. *à Caſtelnau.* Acanthium.

170 Onopordum foliis tomentoſis obiter laciniatis caule alato, brachiato. H*all.*

Carduus tomentoſus, acanthi folio vulgaris. *T.*

171 Onopordum foliis ſemidecurrentibus hiſpidis pennatifidis pinnis bilobis.

Carduus cyrſium dictus folio laciniato nigrius. J. B. *à Gramont.*

172 CARDUUS foliis ſpinoſis ſemi decurrentibus, floribus nutantibus ſquamis calycinis ſuperne patentibus. *Flor. Suec.*

Carduus nutans. *J. B.* Capitulum ſolitarium, ſpinoſum, craſſum nutans, foliorum laciniæ complicatæ & ſpinoſæ.

173 Carduus foliis ſeſſilibus bifariam pinnatifidis, laciniis alternis erectis, calycibus globoſis. *H. Upſal.*

Carduus capite rotundo tomentoſo. *C. B.* Corona fratrum. L*obel.* denticulis & ſuperficie folii ſpinoſis, calycibus lanigeris. *Au Chemin de ſaint Loup à Valene.* Pinnæ ſemibi-

lobæ, ſquamæ rubræ erectæ.

174 CARDUUS foliis ſinuatis decurrentibus, denticulis ſuperficieque ſpinoſis (capitulis turbinatis.) *Linn.*

Carduus lanceolatus latifolius. *T.* Folia ſpinoſa, hirſuta, pinnatifida pinnis ſemibilobis, capitulis tomentoſis turbinatis pungentibus. Squamis reflexis luteis.

175 Carduus foliis ſinuatis decurrentibus margine ſpinoſis, floribus confertis terminatricibus. *Linn.*

Carduus caule criſpo. *J. B.* Carduus foliis ciliatis ſubtus tomentoſis capitulis ſeſſilibus congeſtis mollioribus. *Haller.* Carduus viarum, vulgò Aſininus.

76 Carduus ſquamis calycinis margine & apice ſpinoſis. *Linn.*

Carduus albis maculis notatus vulgaris. *C. B.* *Chardon Marie.*

77 Carduus foliis ſeſſilibus, angulis ſpinoſis, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus, foliis aliquot obvallatis. *Linn.*

Cnicus albis maculis notatus. *T.*

78 Carduus caule alato ſpinoſo, foliis ſpinoſis, ſpinis duplicibus. *Royen.*

Cnicus polycephalos caneſcens aculeis flaveſcentibus munitus. *T.*

Carduus lanceolatus ferocior. *J. B.* *Vers ſaint Loup.*

79 Carduus acaulis calyce glabro. *Flor. Suec.*

Cyrſium acaule flore purpureo. *T.* *Vers Reſtincliere, Sommieres.*

80 Carduus foliis linearibus dentatis ſpinoſiſſimis, caule criſpo, ſpinoſo ramoſo, floribus erectis. *Royen.* Caulis pene nudus, capitula mitia, in vertice congeſta. Ex Hallero.

Cirſium pratenſe, polycephalum vulgare. *T.*

181 CARDUUS foliis laciniatis ſubtus tomentoſis margine ſpinoſis, capitulis ſeſſilibus congeſtis aculeatis. *Haller.*
Carduus acanthoides. *J.* B.

182 Carduus foliis ſemipinnatis pinnis ſemibilobis, capitulis inermibus ſingularibus.
Circium pratenſe aſphodeli radice latifolium. *T.*
Carduus bulboſus Monſpelienſium. L*obel.* *à Lates.*
Caulis ſæpè uniflorus, nudus.

183 SERRATULA foliis dentatis ſpinoſis. *Fl. Suec.*
Carduus vinearum repens, ſonchi folio. C. *B.*
Folia pinnatifida, capitula mitia oblonga. *Cauſſide.*

184 Serratula foliis pinnatifidis, laciniâ terminatrice maxima. *Linn.*
Serratula. *J.* B. Folia glabra, ima ovata, ſumma ad baſim pinnata. *Aux Capouladous.*

185 CARTHAMUS caule piloſo ſuperne lanato, foliis inferioribus pinnatifidis, ſummis amplexicaulibus dentatis. *H. Upſal.*
Cnicus attractylis lutea dictus. *T. Capelan.*

186 Carthamus foliis caule longioribus ligulatis pinnatifidis.
Carduncellus montis lupi. L*obel.* Planta fere acaulis inermis, foliis caput magnum amplexantibus, pinnatifidis pinnis lineari-lanceolatis, ſquamæ calycis oblongæ apice obtuſo ſicco ciliato. *A l'Eſperou. au Puy de ſaint Loup.*

187 CNICUS caule diffuſo foliis dentato-ſinuatis. *Linn.*

Carduus benedictus Offic. *Chardon beni.*
188 CNICUS caule erecto foliis inferioribus laciniatis, ſuperioribus integris. *Royen.*
Cnicus pratenſis acanthi folio flore flaveſcente. *T.*
189 ATTRACTYLIS foliis linearibus dentatis, calycibus conniventibus. *Linn.*
Crocodylodes exigua capite cancellato. *Vaillant.*
190 ECHINOPS floribus capitatis calycibus unifloris. *Linn.*
Echinopus major. *T.* Caulis multiflorus.
191 Echinops floribus corymboſis, calycibus multifloris. *Linn.*
Chamæleon niger Cortuſi. *Doden.*
Carduus flore hyacintino umbellato. *Boerh.*
192 Echinops caule ſub-unifloro. H. *Upſal.*
Retro floribus cæruleis. *Lobel.* Echinopus minor. *J. B.*
193 CARLINA caule dichotomo trifloro.
Carlina *Richeri de Belleval.*
Carlina caule trifloro dichotomo medio flore ſeſſili, quaſi prolifero. Carlina flore purpuro-rubente patulo. *T. Carline.*
194 Carlina caule ramoſo floribus umbellatis. *Haller.*
Carlina ſylveſtris vulgaris. *T. Flagellum Chriſti.* vulgò.
195 Carlina caule unifloro. *Linn.*
Carlina acaulos magno flore. *T. Cardouille à l'Eſperou.*
196 Carlina floribus ſeſſilibus lateralibus pauciſſimis.
Carlina caule paucifloro ſubdiviſo. *Royen*, flores bini lutei.
Carlina ſylveſtris minor hiſpanica. *Cluſ.* Non-

dum inveni.

Carlinæ flores radiati videntur, ſunt tamen floſculoſi.

197 AMBROSIA foliis multifidis tripartitis dentatis. *Linn. Ambroiſie.*

Ambroſia maritima. *C. B.* Folia bipennatifida.

198 PARTHENIUM foiiis compoſito-multifidis. L*inn.*

Patheniaſtrum Americanum ambroſiæ folio. *Niſſole.* Floſculi radii ſunt tubuloſi & tamen florem radiatum imitantur, nec antheras habent conjunctas ut radiati.

199 ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis laciniatis, floribus erectis. *Linn.*

Artemiſia foliis planis ſemipinnatis, pinnis rariter dentatis, floribus erectis. *Haller.*

Artemiſia. Offic. *Armoiſe. Arceniſe.*

200 Artemiſia foliis compoſitis multifidis tomentoſis, ramis floriferis nutantibus. *Linn.* Abſinthium ſeriphium Belgicum. *C.* B. vide decompoſitas.

201 TANACETUM foliis pinnatifidis integerrimis. *Linn.*

Tanacetum Africanum arboreſcens foliis lavandulæ multifido folio. B*oerhaav.*

202 SENECIO foliis pinnato-ſinuatis amplexicaulibus, floribus nudis ſparſis. *Royen.*

Senecio minor vulgaris. *C.* B.

ORDO VII.

Plantæ laciniatæ floribus compoſitis ſemifloſculoſis.

203 SCOLYMUS annuus Hort. *Upſal.* Scolymus chryſanthemos annuus. Bot. Monſp. *Entre Montbaſin & villemagne & près Villeneuve.*

204 Scolimus vivax.
Scolymus. Theophraſti. *Cardouſſes.*

205 PICRIS. Vide ſupra pag. 82. 498.
Folia mire ludunt, omnia hiſpida aſpera, ima ſinuato-dentata, ſumma enſiformia integra, caules octogoni hiſpidi.

206 Picris perianthiis aculeatis, foliis inermibus haſtato-ſinuatis. *Flor. Suec.*
Sonchus aſper laciniatus Creticus. *C. B.* Folia apud nos lyrata. Tragopogon calycibus corollâ brevioribus aculeatis. *Linn. à la Colombiere ſur la garrigue.*

207 TRAGOPOGON calycibus corollâ brevioribus inermibus, foliis lyrato-ſinuatis. *Linn.* Hieracium magnum. *Dalech.* Folia tria ſuprema integra fere verticillata, infima ſinuata.

208 LACTUCA foliis coſtâ aculeatis, pinnatifidis.
Lactuca ſylveſtris coſtâ ſpinoſâ. *C. B. Laitüe ſauvage.*

209 Lactuca caule & foliis margine aculeatis. *Linn.*
Lactuca ſylveſtris odore viroſo. *C. B.* folio-

rum diſcus non horizonti parallelus, ſed verticalis, ſæpè inciſus, in foliis ſuperioribus.

210 LACTUCA foliis imis pinnatifidis, cæteris enſiformibus, baſi haſtatis, dorſo ſerratis. Lactuca ſylveſtris anguſto laciniato folio. *Bot.* Monſp. App.

211 Lactuca foliis linearibus dentato-pinnatis, laciniis ſurſum dentatis. *Linn.* Lactuca perennis humilior flore camleo. *T.* in horto eſt annua.

212 SCORZONERA foliis ſemipinnatis, caule pene nudo, papo ſeſſili. *Haller.* Hieracium vulgare. *Fl. Lapp. à Lattes.*
Hieracium chondrillæ folio glabro. *C.* B. Eſt Leontodon juxta *D. Linnæum.*

213 Scorzonera foliis laciniatis. *Tournefort.* Scorzonera foliis anguſtiſſimis, imis raro ſemipinnatis, reliquis integris, caule folioſo. *Haller à Gramont.*

214 Prænanthes floſculis quinis, foliis pinnato-haſtatis. *Linn.*
Chondrilla ſonchi folio flore, luteo palleſcente. *T. aux Capouladous.* Folia lyrata, apice amplo cordato.

215 PRÆNANTHES foliorum laciniis extrorſum dentatis, ramentis folioſis cauli ramiſque adnatis. *Linn.*
Lactuca viſcoſa caule foliis obducto. *C. B.*

216 ANDRYALA foliis inferioribus dentatis, ſummis integris. *Linn.*
Sonchus villoſus luteus minor. *C. B.* Pr.

217 TARAXACUM foliis integris ſinuatis, pappo plumoſo, calyce glabro. *Haller.*
Hieracium dentis leonis folio monoclonum glabrum. *C. B.*

218 TARAXACUM foliis integris dentatis pappo plumoſo, calyce hiſpido. *Haller.*
Taraxacum foliis aſperrimis pene ſpinoſis, pinnato-ſinuatis, pappo plumoſo. H.
Hieracium parvum hirſutum caule aphyllo. *T.*

220 Taraxacum dentibus foliorum triangularibus, fine ſubrotundo. *Haller.* Densleonis alpinus minimus glaber. *T.*

221 Taraxacum foliis integris dentatis pappo ſimplici. *Haller.*
Dens leonis alpinus glaber, ſpatulæ folio dentato. *Vaillant.*

222 Taraxacum pinnis foliorum triangularibus. *Haller. Dent de Lion.*
Dens leonis qui Taraxacum Officin. *Vaillant.*
Variat latiore & rotundiore vel anguſtiore folio.

223 Taraxacum calyce toto erecto ſubhirſuto, radice bulboſà.
Dens leonis aſphodeli bulbulis. *T.* Bulbi oblongi, folia obtuſa dentata *à Gramont. à Pailletriſſe.*

224 Taraxacum (Leontodon) calycibus erectis, foliis glabris dentatis integerrimis, pedunculis ſquamoſis. *Fl. Suec.*
Hieracium chondrillæ folio glabro, radice ſucciſa majus. *C. B. aux prairies de Lattes.* Vide Scorzoneram 1am.

225 Taraxacum (Leontodon) calyce toto erecto hiſpido, foliis hiſpidis dentatis dentibus integerrimis. *Linn.*
dens leonis foliis hirſutis & aſperis ſaxatilis. *H. R. P.*
Hieracium dentis leonis folio obtuſo minus. *C.* B. *à Ferrand, près Caſtelnau.*

226 HIERACIUM foliis cichoraceis tomento-

ſis dentis leonis facie. *Magnol. H. R. M.*
Tragopogon ſcapo nudo foliis pinnatifidis tomentoſis ?
Calyces corollâ breviores, pappus ſimplex.

227 Hieracium minus glabrum foliis eleganter virentibus. *C.* B.
Folia radicalia longa ſinuato-dentata, ſcapus nudus uniflorus.

.228 Hieracium foliis dentatis viſcidis hirſutis, ſubaſperis calyce hirto. H.
Dens leonis foliis caneſcentibus villoſis. *T.*
Hieracium montanum laciniato folio. *Cluſ.* *à la Serane.*

.229 Hieracium] foliis triangulariter dentatis piloſis, calyce ſubhirſuto caule penè nudo. *Haller.*
Dens leonis minimus aſper. *T.*

.230 Hieracium foliis ad terram piloſis acutè dentatis caule brachiato penè nudo. *Haller.*
Hieracium murorum laciniatum minus piloſum. *C.* B.
Folia ovata poſtice dentato-ſinuata. *aux Capouladous.*

.231 CREPIS foliis pinnatis angulatis, petiolis dentatis. *Royen.*
Hieracium amygdalas amaras olens. *T.*
Erigeron tertium. *Dodon.*

.232 Crepis foliis longis, dentibus linearibus, caule declinato, ferè nudo. *Linn. à Gramont.* Sed papus noſtræ ſimplex eſt.
Hieracium chondrillæ folio grabro radice ſucciſa majus. *C. B.*

233 Crepis foliis lanceolatis haſtatis ſeſſilibus, inferioribus dentatis. *Linn.*
Hieracium majus Dioſcoridis. Tabernæ.
Hieracioides vulgaris annua, cichorii folio

flore luteo ſubtus purpuraſcente. *Vaillant.*

234 CREPIS foliis amplexicaulibus lanceolatis, omnibus dentatis, radicalibus ſinuatis. *Linn. Virid.* Hieracium Apulum. Col.
Hieracium dentis leonis folio, flore ſuave rubente. *C. B.*
Calices ante floreſcentiam nutant, odor fætens.

235 Crepis foliis omnibus haſtato-pinnatifidis, ſummis amplexicaulibus.
Hieracium luteum hirſutum. *J. B.*

236 Crepis foliis tomentoſis linearibus pinnatifidis pinnis denticulatis. Sonchus villoſus luteus. minor. *C. B.*

237 Crepis folio leviter dentato. *Vaillant. Terre-grepie.* Crepis Dalech. Sonchus lævis anguſtifolius. *C. B.*

238 Crepis foliis imis pinnatifidis pinnis triangulariter ſurſum crenatis, caulibus & pedunculis ramoſis ſubnudis.
Hieracium minus grabrum. *C. B.* Stipulæ lineares.

239 Crepis (Hieracioides) foliis variis ſubaſperis caule altiſſimo folioſo & unifloro. H.
Hieracium chondrillæ folio hirſutum. *C. B.*
Hieracium erucæ folio hirſutum. *J. B*

240 Crepis (Hieracioides) foliis variis glabris, caule ramoſiſſimo. *Haller.*
Hieracium chondrillæ folio glabrum. *C.* B.
Hieracium foliis & facie chondrillæ *Lobel. Ic.*

241 HYPOCHŒRIS foliis ſerrato-ſinuatis, caule ramoſo nudo, pedunculis ſquamoſis. *Linn.*
Hieracium dentis leonis folio obtuſo, majus. *C. B.*
Hipocheris dentibus foliorum rectangulis, caule nudo ramoſo. *H. à Caſtelnau en May.*

.242 HYPOCHŒRIS (calycibus oblongis imbricatis glabris) caule nudo glabro , foliis dentato-ſinuatis. *Linn.*
Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro. *C. B.* Hioſeris altera. *Tab.*

.243 Hypochæris caulibus ramoſis nudis , foliis lyrato-oblongis , radice granuloſâ.
Hieracium dentis leonis folio bulboſum. *C. B.*
Hieracium intybaceum. *Tabern. à Lattes.*

.244 HYOSERIS foliis glabris haſtato pinnatis. *Royen.*
Dens leonis minor foliis radiatis. *C. B.*

.245 SONCHUS pedunculis calycibuſque hiſpidis , floribus congeſtis. *Linn.*
Sonchus repens multis hieracium majus. *J. B.* Folia haſtato-pinnatifida.

.246 Sonchus foliis lævibus & teneris calycibus glabris. *H. Laitron.*
Sonchus pedunculis tomentoſis. *Linn.* Folia ſumma amplexicaulia , pedunculi inæquales. Sonchus lævis laciniatus. *T.*

247 Sonchus floribus ſpicatis cæruleis. *Haller.*
Sonchus cæruleus latifolius. *J. B.* Lactuca montana latifolia laciniata.
Sonchus pedunculis ſquamoſis , floribus racemoſis. *H. Upſ.*

248 Sonchus foliis ſemipinnatis , rigidiuſculis , calycibus nigris & hiſpidis. *Haller.*
Sonchus arboreſcens. *T.*

.249 Sonchus foliis rigidiuſculis ſerratis , calycibus lævibus. *Haller.*
Sonchus aſper laciniatus. *C. B.*

250 CHONDRILLA. *Linn.*
Chondrilla juncea viſcoſa arvenſis. *T.* Folia ad radicem dentato-ſinuata , ad caulem linearis

nearia integerrima, caulis hiſpidus.

251 CICHORIUM caule ſimplici foliis dentato-ſinuatis. *Linn.*

Cichorium ſylveſtre ſive officinarum. *C. B. Chicorée.*

Flos cæruleus *Endive friſée.* Intybus Offic.

252 LAMPSANA calycibus fructus undiqué radiis ſubulatis patentibus, foliis lyratis. *Linn.*

Rhadagiolus lampſanæ foliis. *T.* Orientalis éſt.

253 Lampſana calycibus fructus ſubrotundis angulatis, pedunculis incraſſatis floribus erectis. *Royen.* Zacintha. *T.*

ORDO VIII.

Plantæ laciniatæ Floribus compoſitis radiatis.

Excludimus ex hoc Ordine Carlinas ut pote veris radiis carentes.

254 SENECIO foliis pinnato-lyratis, laciniatis, caule erecto. *Linn.*

Jacobæ vulgaris laciniata. *C. B.* *la Jacobée.*

255 Senecio foliis pinnatifidis denticulatis, florum radiis revolutis linearibus. *Linn. Flor. Suec.*

Jacobæa ſenecionis folio. *T.* radii florum, breviſſimi.

256 Senecio foliis pinnato-ſinuatis amplexicau-

libus floribus nudis ſparſis. *Royen.* Vide ſupra.

257 SENECIO foliis lyratis, pinnulis dentatis; floribus umbellatis.
Jacobæa latifolia paluſtris ſive aqutica. *Raii.* *Armoiſe des Herboriſtes de Montpellier.*

258 Senecio tomentoſus foliis ſpatulatis pennatifidis, pinnis ſubrotundis.
Jacobæa alpina abſinthi folio humilior. *T.* Totus incanus eſt, ſcapus corymbum florum luteorum gerit folia abſinthi; latifolii æmula. *à Puicerda.*

259 Senecio foliis pinnatis, pinnis linearibus apice inciſis, ſubtus incanis.
Jacobæa ſenecionis folio, incana perennis. *T.*

260 Senecio foliis amplexicaulibus linearibus pinnato-dentatis laciniis linearibus integris. *Royen.*
Jacobæa Ægyptia folio glauco coronopi. *Boerhav.*

261 Senecio petiolis amplexicaulibus, pedunculis folio triplo longioribus, foliis pinnato-ſinuatis, floribus radiatis. *Royen.*
Jacobæa Afra perennis viſcoſa lutea, aſplenii foliis. *Vaillant.*

262 Senecio foliis pinguibus pinnatis pinnis alternis breviſſimis, radiis perexiguis. *Haller.*
Senecio pinguis incanus. *C. B.* Jacobæa Pannonica 1a. *Cluſ. Vers le Puy de ſaint Loup.*

363 SOLIDAGO foliis pinnatifidis, laciniis diſtantibus linearibus, extrorſum dentatis. *Royen.*
Jacobæa Afra, folio botryoſ. *Boerhav.*

364 OTHONA foliis pinnatifidis tomentoſis,

laciniis ſinuatis, caule fruticoſo. H. *Upſal.* Calix tamen polyphyllus, ſed ſine calyculo ad baſim.

Jacobæa maritima. *C.* B. Cineraria. *Dodon.*

265 ASTER foliis ovatis angulatis dentatis, calyce terminante folioſo-patente. *Linn. La Reine Marguerite.*

Aſter chenopodii folio, annuus flore ingenti ſpecioſo. *Dillen.*

266 BUPHTHALMUM caule ramoſo foliis pinnatifidis linearibus, laciniis dentatis ſerratis, floribus pedunculatis. *Royen. Œil de beuf.*

Buphthalmum. *Mathioli.* Buphtalmum floribus nudis foliis ſubtus incanis pinnatis pinnis argutè ſerratis. *Haller. à Aigue-mortes.*

267 ANTHEMIS foliis pinnatifidis obtuſis planis, pedunculis hirſutis foliolis calycibus tomentoſis. *Linn.*

Chamæmelum maritimum incanum folio abſinthii craſſo. *Boerhav.*

268 Anthemis foliis pinnatifidis planis ſucculentis, pinnulis ovalibus pedunculo nudo. Chamæmelum maritimum. *J.* B. *à la Plage.*

269 Anthemis foliis pinnatifidis laciniatis pedunculis nudis vix villoſis. *Linn.*

Chamæmelum Chium vernum folio craſſiori, flore magno. *T.*

270 Cotula foliis lanceolato-linearibus amplexicaulibus inferne dentatis. *Linn.*

Ananthocyclus coronopi folio *Vaillant.*

271 CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus (ſpatulatis) oblongis, ſuperne ſerratis, infernè dentatis. *Linn.*

Leucanthemum vulgare. *T.* Bellis montana folio obtuſo, crenato. *C.* B.
272 CHRYSANTHEMUM foliis pinnatifidis inciſis extrorſum latioribus. *Linn.*
Chryſanthemum foliis matricariæ. *C.* B.
273 Chryſanthemum foliis linearibus pinnatifidis. Leucanthemum alpinum foliis coronopi. *T.* *à l'Eſperou.*
274 Chryſanthemum foliis imis palmatifidis, foliolis linearibus pinnatifidis. Bellis montana foliis chryſanthemi Cretici anguſtioribus. B. *M.* *à l'Eſperou.*
275 Chryſanthemum florum floſculis omnibus hermaphroditis uniformibus. *Linn.*
Santolina ſpinoſa foliis ager. *T.*
276 ACHILLÆA foliis ſinuato-linearibus planis villoſis nitidis obtuſis. *Linn.*
Achillæa foliis ſericeis petiolo longo lateſcente, ſine lato ſemipinnato. H*aller.*
Abſinthium alpinum umbelliferum latifolium. *C.* B. *Genepit.*
277 CALENDULA foliis dentatis lanceolatis pedunculis filiformibus. *H. Upſal.*
Caltha Africana flore intus albo extus violaceo. *T.*
278 Calendula foliis radicalibus ſinuatis, caulinis ſuperne incraſſatis. *H. Upſal.* Cardiſpermum Africanum, &c.
279 ARCTOTIS foliis pinnatifidis, caule herbaceo, petalis radii profundè trifidis. *Royen.* Anemonoſpermos Afra, folio & facie taraxaci incanis. B*oerhav.*

FINIS.

APPENDIX.

CLASSIS IV.

Latifoliæ, foliis ſubrotundis.

A. *HERBACEÆ.*

HELIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis, tomentoſis, rugoſis. *H. Upſ.*
Heliotropium majus. *Dioſcorid. Herbe aux verruës.*

PYROLA foliis integerrimis. *Linn. Pyrole.*
Pyrola rotundifolia major. *C. B. à l'Eſperou.*
Pyrola ſcapo unifloro. *Royen.*
Pyrola rotundifolia minor. *C. B.*

TROPÆOLUM foliis ſubquinquelobis, petalis obtuſis. *H. Upſ.*
Cardamindum ampliori folio & majori flore. *T.*
Tropæolum foliis integris petalis acuminato-ſetaceis. *H. Upſ.*
Cardamindum minus & vulgare. *T. Capucine.*

CROTON foliis ovatis plicatis, ſcabris, capſulis è pedunculo ramoſo pendulis. *Royen. Maurelle. Tourneſol.*
Ricinoides ex quo paratur Tourneſol Gallorum. *T.* Folia ſine variant hinc quandoque oppoſita, ſemper incana.

RHEUM foliis glabris. *H. Upſ.*
Rhaponticum *Proſp. Alpin. Rhapontic du Levant.*
Rheum foliis ſubvilloſis *H. Upſal. Rhubarbe.*

Rhabarbarum Sinenſe folio criſpo. *Amman.* folia cordata. *Rhubarbe de la Chine.* Rheum 65. Claſſ. 1.

B. *FRUTICOSÆ.*

RHAMNUS floribus trigynis, aculeis geminatis, altero inferiori reflexo. *Linn.* Paliurus. *Dod. Paliure. Arnavès.*

Folia nervoſa, alterna, in eodem plane ſæpe poſita, ovalia, integerrima. Fructus ſiccus clypeoli inſtar umbonatus, marginatus.

Rhamnus inermis floribus monogynis hermaphrodytis. *Linn.* Frangula. *Dodon. Bourgene.*

Folia venoſa, ovalia, parum ad margines craſſa, arbor excelſa, fructus baccatus, diſpermus. *à l'Eſperou.*

ALNUS. *Linn.*

Alnus rotundifolia glutinoſa viridis. *C.B. Aulne. ver.* Alnus folio orbiculato retuſo. *Haller.* Folia & altitudo frangulos, ſed fructus ſiccus ſtrobyli formâ. *à Lavanet.*

CRATÆGUS foliis ovalibus inæqualiter ſerratis ſubtus tomentoſis. *Linn.* Cratægus folio ſubrotundo ſerrato ſubtus incano. *T. Drollier près Alais.*

COTINUS foliis obverſe-ovatis. *Linn.*

Cotinus coriaria. *Dodon. Fuſtet. en Dauphiné.*

STYRAX. *Linn.*

Styrax folio mali cotonei. *T. Storax, Aligouſier à las Santes près la Camargue, à la Sainte Baume en Provence.*

Inter *Cæſpititias* ordinis quarti addatur.

TULIPA. *Linn. la Tulipe.*

Varietas ejus flore luteo oritur ſponte *à la Verune.* In pratis primo vere. Tulipa minor lutea Gallica.

ERITHRONIUM. *Linn.*

Dens canis latiore rotundioreque folio. *C. B.*

Illa elegans planta antequan floreat gerit unicum folium cordatum, cum floreſcit ejus ſcapus obtinet duo folia oppoſita lanceolata.

ıter *adverſifolias floribus apetalis.*

URTICA amentis floriferis globoſis, androgyna. *Linn.* Urtica urens pillulas ferens. *C. B.* *Ortie grieche.*

ʼrtica foliis ovalibus. Androgyna. *Linn.* Urtica urens minor. *C. B.* Amentis cylindricis.

ʼrtica foliis oblongo-cordatis. Divica. *Linn.* Urtica urens maxima. *C B.*

ʼrtica foliis cordato-ovatis amentis ramoſis diſtichis erectis. *Linn.* Urtica maxima racemoſa Canadenſis *Moriſſon. Ortie de Canada.*

ʼrtica foliis orbiculatis utrimque acutis ſubtus tomentoſis. *Linn.* Urtica racemifera maxima Sinarum, foliis ſubtus argenteâ lanugine villoſis. *Pluk. Ortie de la Chine.*

ıter adverſifolias floribus monopetalis anomalis.

USTICIA foliis ovato lanceolatis, ſpicis folioſis, florum galeâ concavâ. *Linn.* Adhatoda zeilanenſium. *Pluk.* Ecbolium. *Rivini.*

ıſticia foliis lineari-lanceolatis, floribus ſæpius ſolitariis. *Linn.*

ıter anguſtifolias foliis ſublanceolatis floribus monopetalis.

HYTOLACCA foliis integerrimis. *Linn.* Phytolacca Americana majori fructu. *T.* Racemi oblongi penduli cum maturi, acinis rubris, in hortis vivax eſt.

ıter decompoſitas floribus polypetalis.

PÆONIA. *Linn. Pivoine.*

Pæonia folio ſplendido nigricante quæ mas. *C. B. près d'Alais.* Pœonia communis vel fœmina. *C. B. au puy de St. Loup.*

CICUTA. *Linn. Ciguë d'eau.*

Cicuta aquatica. *Geſner.* Sium erucæ folio. *C. B.* Inter laciniatas floribus ſemifloſculoſis.

. CATANANCHE ſquamis calycinis inferioribus ovatis. *Linn. La Cupidone.* Catanance quorumdam. *T.* flos amethiſti.

. Catananche ſquamis calycinis inferioribus lanceolatis. *Linn.* Catanance flore luteo latiore folio. *T.*

Nuper reperi in amne Viſtre juxta oppidum le Caila plantas ſequentes auguſti 15°. Inter butomum, ceratophylla, aliſmata & potamogeta varia.

. HIPPURIS. *Linn. la peſſe d'eau.*

. SIUM foliis pinnatis umbellâ terminatrice. *Linn.* Sium latifolium. *T. le panais d'eau.*

. PHELLANDRIUM. *Dodon.* Involucrum univerſale nullum niſi unicum foliolum lineare dicas.

. SAGITTARIA foliis ſagittatis. *Linn.*

Sagitta minor anguſtifolia. *J. B.*

. HYDROCHARIS *Linn.*

Morſus ranæ foliis circinnatis. *T.*

DAUCUS radiis involucri planis, laciniis recurvis. *Royen.* Gingidium *Mathiol.*

. MENIANTHES. foliis ovalibus.

Nymphoides aquis innatans. *T.*

Nymphæa lutea minor flore fimbriato. *C. B.*

. HOTTONIA. *Linn.*

Myriophyllum. *Rivini.* Stratiotes vulgaris flore albo. *Vaill.* & proſequens iter medico-practicum, inter le Caila & Franquevaux.

. SPARTIUM ramis ſpinoſis anguloſis foliis ternatis. *Linn.* Cytiſus ſpinoſus. *Herm. Lugd.*

Quod ideo notare placuit, ut Botanophyli ad multo plures plantas ratiores, quæ nos nullatenus ignorantes effugerunt, curioſius inquirandæ alliciantur.

CLASSIS III.

Anguſtifoliis Gramineis addantur ſpecies nondum ſatis perſpectæ.

1 AIRA foliis ſetaceis, culmis, ſubnudis, paniculâ divaricatâ, pedunculis flexuoſis. *Flor. Suec.*
Gramen nemoroſum paniculis albis capillaceo folio *G. B.*

2 Aira floſculo maſculino ariſtato, hermaphroditico mutico *Fl. Suec.* Gramen pratenſe paniculatum molle. *C.* B. *P.*

3 Aira quæ Gramen pratenſe paniculatum altiſſimum locuſtis parvis ſplendentibus non ariſtatis. *T.*

4 AGROSTIS paniculâ compreſſâ, calycibus Subulatis æqualibus hiſpidiuſculis coloratis. *Royen.*
Gramen montanum paniculâ ſpadiceâ delicatiore. *C.* B.

5 Agroſtis Gramen pratenſe vulgare ſpicâ fere arundinaceâ. *J. B.*
Poa ſpiculis ovatis compreſſis muticis. *H. Cliff.* Sed illi calix eſt uniflorus bivalvis ut & corolla.

6 ALOPECURUS culmo erecto. *Royen.*
Gramen cum caudâ muris purpuraſcente. *J. B.*

7 Alopecurus culmo infracto ariſtis glumâ longioribus. *Royen.*
Gramen aquaticum geniculatum ſpicatum. *C.* B.

8 Alopecurus Gramen alopecuroides minus ſpicâ longiori. *C. B.* Luxuriat in Horto Regis.

9 AVENA panicula laxâ, calycibus trifloris brevibus, floribus omnibus ariſtatis. *Royen.*

Gramen avenaceum pratenſe elatius paniculâ flaveſcente locuſtis parvis. *Raii. Hiſt.*
10 Avena petiolis longiſſimis. . . . .
Ægylops bromoïdes jubâ purpuraſcente. *J. B.*
Gramen ſparteum feſtuceum. B*arel.* 1. c. 18.
11 Avena calycibus biſloris, ſloſculo hermaphroditico mutico, maſculo ariſtato. *Linn.*
Gramen nodoſum avenaceâ paniculâ. *C. B.*
12 Avena Gramen loliaceum ſpurium hirſutum ariſtis geniculatis medium ſeu vulgare. *Barelier.* Icon. 905.
13 Avena paniculâ nutante ſloſculis baſi piloſis. *Fl. Suec.*
Avena ſylveſtris piloſa ariſtis recurvis. *Moriſſ.*
14 BROMUS paniculâ nutante ſpiculis linearibus. *Fl. Suec.*
Gramen quod feſtuca avenacea ſterilis humilior. *G. B. P.*
Gramen avenaceum paniculâ ſparsâ locuſtis minoribus & ariſtatis. *T.*
15 Bromus Gramen quod feſtuca graminea annua, ſpiciſerectis. *Moriſſ.*
16. BRIZA Gramen paniculis elegantiſſimus ſive eragroſtis majus. *C.* B.
17 CYNOSURUS paniculâ ſecundâ glomeratâ. *Fl. Suec. Amourettes.*
Gramen ſpicatum folio aſpero. *C. B.* pag. 37. ſupra n. 61.
Poa floſculis confertis uno verſu diſpoſitis *Hort. Cliff.*
18 Cynoſurus bracteis integris. *Linn.*
Nardus gangitis ſpuria Narbonenſis. *Lobel.*
In pratis l'Eſperou plurimus eſt, foliis caulem undique ex radice ambientibus. *Vide.* pag 26. Nardum 142.
19 FESTUCA gramen loliaceum corniculatum

ariſtis glabris. *C. B.*
Feſtuca dumetorum. *C. B.*
o. Feſtuca foliis ſetaceis, radicalibus minoribus, paniculâ inferne ramoſà nutante, ſpicis aſcendentibus hiſpidis. *Royen.*
Gramen pratenſe paniculâ duriore laxâ unam partem ſpectante. *Raii.*
1 HORDEUM gramen ſpicatum maritimum ſecalinum minus. *T.*
2. LOLIUM gramen loliaceum ſpicâ longiore ſine ariſtis. *C.* B.
3 Lolium gramen loliaceum ſpicis articuloſis erectis. *T.*
4 POA ſpiculis ovato-anguſtis acutis vivipara. *Fl. Lappon.*
Gramen arvenſe paniculâ criſpâ. *C.* B.
5 Poa ſpiculis oblongis erectis. *Linn.*
Gramen paniculatum aquaticum fluitans. *T.*
Gramen fluviatile. *Tabern.* ic. 216
6 Poa gramen loliaceum corniculatum. *T.*H.*Pariſ.*
7 Poa paniculâ ſecundâ coarctatâ, culmo obliquo compreſſo. *Fl. Suec.*
Floſculi ſex, calycis glumæ ſubæquales.
Gramen caninum vineale. *C. B. P.*
8 Poa gramen ſpicâ cupreſſi formi aſperâ. *H.Cathol.*
9 Poa gramen typhoides molle. *C.* B. *P.*
Gramen ſpicatum ſpicâ cylindricâ molli & denſâ. *T. Dans les foſſés de la Ville, vers le Jardin Royal en Septembre.*
o PHALARIS paniculâ oblongâ *Fl. Suec.*
Gramen aquaticum paniculatum phalaridis ſeſemine. *T.*
1 SECATALE ſpiculis geminatis. F*l. Suec.*
Gramen loliaceum radice repente maritimum. *C. B.*
2 GRAMEN ſupinum aculeatum. *J.*B.an Phleum.

33 Gramen avenaceum capillaceum minoribus glumis. *J.B.* Panicula coarctata in ſpicam, folia anguſtiſſima.
34 Gramen loliaceum maritimum ſcorpioides, *Sh.*
35 Gramen barcinonenſe paniculâ densâ. *Int.* Sed non eſt hujus regionis.
36 Gramen caninum paniculatum molle. *Raii hiſt.*
37 Gramen ſparteum ſpicatum ſpicâ ſericeâ ex utriculo prodeumte. *T.*
Horum genus determinandum oculatioribus & minùs occupatis relinquo, dantur & alia in Botanico Monſpelienſi nondum examino ſubjecta. *UT.*
38 Gramen phænicoides foliis convolutis junceis ac pungentibus *J. B.*
Gramen loliaceum maritimum foliis pungentibus. *T.*
39 Gramen avenaceum maximum utriculis cum lanugine albâ, & ariſtis longiſſimis. *Magnol.*
40 Gramen avenaceum lanuginoſum glumis rarioribus. *C. B.*
41 Gramen rubrum Monſpeliense. *J. B.*
42 Gramen ſupinum Monſpeliense. *Laug. Lobel. Ill.*
43 Gramen ſpicatum ſpicis in capitulum foliaceum congeſtis. *T.*
Gramen album capitulis aculeatis italicum. *C.B.*
44 Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *B. B. in foſſis de Lunel Septembri.*
45 Gramen paniculâ ſparſâ luteâ foliaceâ. *Magnol. au-delà de la garigue du Taral.*
46 Gramen paniculatum locuſtis parvis purpuraſcentibus annuum. *Raii.*

CLASSIS VII. ORDO V.

CLEOME floribus gynandris. *Linn.* Sinapistrum indicum pentaphyllum. &c.

Cleome floribus dodecandris. *Linn.* Sinapiſtrum indicum triphillum, &c.

Cleome floribus hexandris, genitalibus declinatis ſiliquis ſubulatis. *Linn.*

Cleome floribus hexandris genitalibus declinatis siliquis subulatis. *Linn.*

Cleome floribus hexandris genitalibus declinatis, ſiliquis teretibus toroſis. *Linn.*

FINIS.

INDEX.

** Indique les Feüilles* V. & X.

GENERA. *PAGINA.*

A

ABies, 44. 45. *Sapin. Picea, meleſe.*
Acanthus, 220. 278. *Brancurſine, Acante.*
Acer, 212. *Erable. Sycomore.*
Achillæa, 54. 240. 267. 268. 304. *Millefeuille.*
Aconitum, 213. *Aconit. Anthora.*
Acorus, 41. *Calamus aromaticus* offic.
Acroſticum, 246. 270.
Actœa, 249. *Herbe à St. Chriſtophle.*
Adjanthum, 245. *Capillaire.*
Adonis, 253. *Hellebore d'Hippocrate.*
Adoxa, 174. *Moſchatelline.*
Ægopodium, 182.
Agaricus, I. *Champignon. Agaric.*
Agave. *Vide* Aloe, 17.
Agrimonia, 178. 224. *Aigremoine.*
Agroſtema, 146. * *Nielle des blés.*
Agroſtis, 35. 307.
Aizoon, 116.
Aira, 36. 307. *Foin.*
Ajuga, 145. *Bugle.*
Alcea, 113. 201. *Paſſeroſe. Mauve-roſe.*
Alchemilla, 172. 196. *Pié de Lion.*
Alcyonium, 3.
Aliſma, 14. *Damaſonium.*
Allium, 10. 16. 18. 42. *Ail. Rocambole.*
Alnus, 305. *Aune verd.*

Aloë, 6. 17. 19. 41. *Aloés.*
Alopecurus, 34. 37. 308.
Alſine, 45. 142. * 152. *Morgeline.*
Althæa, 99. 200. *Guimauve.*
Alyſſum, 70. 71. 280.
Amanita, 1. 2. *Oronge.*
Amaranthus, 102. 103. *Amarante, betto.*
Amaryllis; 18. *Lys-narciſſe.*
Ambroſia, 294. *Ambroſie.*
Ammi, 232. *Ammi.*
Amygdalus, 98. *Amandier.*
Anagallis, 135. *Mouron.*
Anagyris, 191. *Boispuant.*
Anaſtatica, 72. *Roſe de Jericho.*
Anchuſa, 63. 101. *Orcanete.*
Andrachne, 227. *Cynocrambe.*
Andromeda, 57.
Androſace, 16.
Andryala, 83. 296.
Anemone, 178. 181. 253. 254. *Anemone.*
Anethum, 255. *Fenouil, Anet.*
Angelica, 264. *Angelique.*
Aniſum, 231. *Anis.*
Anthemis, 266. 303. *Camomille. Maroute.*
Anthericum, 19.
Antirrhinum, 47. 48. 52. 67. 92. 101. 102. 121. 139. 165. 166. 277.
Muffle de veau, Linaire, Velvote.
Anthoceros, 31.
Anthoxantum, 26. 35.
Anthyllis, 237. *Vulneraire.*
Aparine, 163. *Gratteron.*
Aphanes, 196. *Perchepier.*
Aphyllantes, 8. *Bragalou.*
Apium, 262. *Ache, Celeri, Perſil.*
Apocynum, 133. *Oüatier.*

Aquilegia, 182. *Ancolie.*
Arabis, 73. 78. 106. 120. 282.
Arbutus, 59. 96. *Arbouſier. Bouſſerole. Buxerole.*
Arctium, 118. *Bardane. Glouteron.*
Arctotis, 304.
Arenaria, 142. * 153.
Aretia, 16.
Argemone, 286. *Pavot épineux.*
Ariſtolochia, 111. *Ariſtoloche, Fauterne.*
Artemiſia, 54. 264. 294. *Artemiſe Armoiſe, Auronne.*
Arum, 16. 28. 121. 196. *Pié de veau, Racine amidoniere.*
Aruncus, 249. *Vide* Filipendula.
Arundo, 38. *Roſeau, Rauſet, Canelle.*
Aſarum, 4. *Cabaret.*
Aſclepias, 131. 132. 133. *Domptevenin.*
Aſparagus, 44. 45. *Aſperge, Roumecounil.*
Aſperugo, 64. 101.
Aſperula, 163. 164.
Aſphodelus, 20 43. *Aſphodele, Alede.*
Aſplenium, 28. 245. 218 270. *Politric. Ceterac.*
Aſter, 8. 54. 55. 86. 87. 108. 117. 303. *Aſtre.*
Aſtragalus, 238. *Aſtragale.*
Aſtrantia, 209.
Athamanta, 256. *Meum.*
Attractylis, 293. *Fuſelée.*
Attriplex, 100. 125. 126. 127. 128. 272. *Arroche, Armols.*
Atropa, 104. *Belladona.*
Avena, 38. *Avoine, Civade.* (308)
Azalea, 57. 96.

B.

Ballota, 151. *Marrube puant.*
Baudhinia, 209.
Bellis, 15. *Paquerette, Marguerite.*
Berberis, *Epine* 305. *vinette.*

Vid. 305.
Beta, 306. *Poirée, Blede.*
Vid. 305.
Betonica, 144. *Betoine.*
Betula, omiſſa, pag. 210. n. 189. *Bouleau, Bès*
Vid. 305.
Bidens, 155. 195. 240.
Bignonia, 223. 247. *Bignone.*
Biſcutella, 72. 282. *Bunetiere.*
Biſſerula, 237. *Pelecinus.*
Biſtorta, 66. 104. *Biſtorte, Bandine.*
Blaſia, 31.
Blitum, omiſſum, pag. 100. n. 93.
Boerrhavia, 104. 108. *La Boerrhave.*
Boletus, 2. *D'eſque, lengue bouïne.*
Borrago, 113. *Lourrache.*
Boviſta, 1. *Veſſe de loup.*
Braſſica, 117. 284. *Chou, Rave, Navet.*
Briza, 37. *Amourettes.* 308.
Bromelia, 41. *Ananas.*
Bromus, 38.
Brunella, 141. 142. 279. *Brunelle.*
Bryonia, 199. *Couleuvrée*, Bryoine.
Bryum, 32. 33. 90.
Bubon, 260. *Perſil de Macedoine.*
Buffonia, 141. * *La Buffon.*
Bunias, 285. *La Maſſe au Bedeau.*
Bunium, 256. *Terrenoix*, Niſſotle.
Buphtalmum, 56. 240. 265. 303. *Œil de bœuf Pyreſre, Camomille.*
Bupleurum, 49. 50. 55. 60. 76. 116. 117.
Butomus, 19. *Jonc fleuri.*
Buxus, 128. *Bouïs.*
Byſſus, 4. 11.

C

Cachris, 256. *Armarinte.*
Cactus, 5. *Cierge, Raquette, Tête à l'Anglois, Melon épineux.*
Calendula, 88. 304. *Soucy.*
Calla, 28.
Caltha, 110. *la Tore.*
Campanula, 51. 56. 64. 95. 93. 106. 118. *Campanule.*
Camphoroſma, 45. *Camphorata.*
Canna, 306. *Baliſier.* Vide 305.
Cannabis, 172. *Chanvre, Candi.*
Capparis, omiſſa, pag. 210. n. 193. *Capprier.* Vide 305.
Capſicum, 103. 104. *Poivre de Guinée.*
Cardamine, 178. 229. 255. 285.
Cardioſpermum, 182. 194. *Cor-indum.*
Carduus, 79. 290. 291. 292. *Chardon, Chauſſetrape.*
Carex, 21.
Carlina, 293. *Carline, Cardoüille.*
Carpinus, 98. *Charme, Charmille.*
Carthamus, 80. 109. 292. *Safran bâtard. Cartame, Capelan.*
Carum, 168. 257. *Carvi.*
Caſſia, 215. *Caſſier, Sené.*
Catananche, omiſſa, pag. 301. n. 253. *Cupidone.* Vide 306.
Caucalis, 230. 258. *Reboule.*
Celoſia, 102.
Celſia, 248.
Celtis, 60. *Miquecoulier.*
Cenchrus, 40.
Centaurea, 78. 79. 239. 263. 264. 287. 288. 289. 290. *Chardon, Jacée.*
Centunculus, 91.
Cepa, 10. *Oignon.*

Ceraſtium, 142. * 143. * 152. * 153.
Ceraſus, 97. *Ceriſier, Meriſier, Griottier.*
Ceratonia, 219. *Caroubier. Couroubier.*
Ceratophyllum, 160. 172. Hydre *cornu.*
Cercis, 110. *Arbre de Judas.*
Cerinthe, 63. 113. *Melinet.*
Chærophyllum, 258. 262 *Cerfeuil.*
Chamœrops, 261. *Palmier à balay.*
Chara, 159. *Luſtre d'eau.*
Cheiranthus, 73. 204. 282. *Violier, Giroſſlier.*
Chelidonium, 227. 285. 286. *Eclaire, Chelidoine, Pavot cornu.*
Chenopodium, 7. 53. 99. 100. 102. 273. *Patte d'oye, Blanchette.*
Cherleria, 142. *
Chondrilla, 300. *Condrile.*
Chryſanthemum, 80. 87. 267. 303. 304. *Marguerite.*
Chryſocoma, 48.
Chryſosplenium, 128.
Cicer, 233. *Poischiche, Ers, Eſſe, Lentille.*
Cichorium, 301. *Chicorée, Endive.*
Cicuta, *Ciguë d'eau.*
Vide 306.
Circæa, 151. * *Circè.*
Ciſtus, 45. 46. 147 * 148. * 149. * 150. * 178. 179. 286. *Mugue. Ciſte.*
Citrus, 60. *Citronier, Oranger, Limonier, Chinois, &c.*
Clandeſtina, 4.
Clathrus, 3.
Clavaria, 3. *Galinole.*
Clematis 149. * 249. *Clematite, Entrévige, Herbe aux gueux.*
Cleome, 308.
Clinopodium, 147.
Clitoria, 192.

Clypeola, 71. 93.
Cnicus, 81. 292. 293. *Chardon béni.*
Cochlearia, 72. 78. 102. 120. 254. 281. *Herbe aux Cueillers.*
Coffea, 137. *Le Caffé.*
Coix, 40. *Larme de Job.*
Colchicum, 18. *Colchique, tuë chien.*
Collutea, 238. *Baguenaudier.*
Commelina, 43.
Conferva, 11. 27. *queüe de Renard.*
Conium, 259. *Grande Ciguë*
Convallaria, 16. 42. 107. 113. 165. *Lys des valées.*
Convolvulus, 30. 56. 65. 100. 105. 110. 121. 202. 274. *Lizeron.*
Conyza, 54. 80. *Conize.*
Corallo-fungus, 3.
Cordyline, 41. *Yuca.*
Coriandrum, 260. *Coriandre.*
Coriaria, 151. * *Redoul, Roudoul, Campanon.*
Coris, 46.
Corispermum, 52. 122. 127. *Stellaria.*
Cornus, 151. * *Cornouiller, Cormier.*
Coronaria, 146. * *Coquelourde des Fleuriſtes.*
Coronilla, 235. *Colutea des Fleuriſtes.*
Corrigiola, 53.
Cortuſa, 28.
Corylus, 110. *Coudrier, Noiſetier, Avelanier.*
Corypha, 202.
Cotinus, *Fuſtet.* 305.
Cotula, 303.
Cotyledon, 29. 134. *Nombril de Venus.*
Crambe, 118. 254. 280. *Chou marin.*
Craſſula, 7. 27.
Cratægus, 211. 286. *Aliſier, Aubepin, Drullier.*
Crepis, 14. 81. 82. 298. 299. *Terre grepie.*

Creſſa, 92.
Crithmum, 258. 259. *Bacille.*
Crocus, 19. *Safran.*
Crotalaria, 61. *Crotalaire.*
Croton, *Maurelle Tourneſol.* Vide 305.
Crucianella, 164.
Cucubalus, 146.* 151.* 152.*
Cucumis, 112 198. *Concombre, Coudombre, Coloquinte.*
Cucurbita, 112. 198. *Courge, Citrouille.*
Cuminum, 256., *Cumin.*
Cunila, 145.
Cupreſſus, 125. *Cyprès.*
Cuſcuta, 11. *Cuſcute, Raſque.*
Cyathoides, 3.
Cyclamen, 28. *Pain de pourceau.*
Cynanchum, 133.
Cynara, 239. 263. *Artichaud, Cardonete, Carchoſles.*
Cynoſurus, 37. 308.
Cynogloſſum, 54. 63. 64. 118. *Cynogloſſe, Lenguecane.*
Cyperus, 20. *Souchet.*
Cypripedium, 24. 107.
Cytiſus, 190. 191. *Cytiſe.*
D
Daphné, 56. 57. *Laureole, Canteperdrix, Trentanel.*
Datiſca, 220. *Cannabine.*
Datura, 100. 274. 275. *Pomme épineuſe, endormie.*
Daucus, 257. 259. *Carotte, chiroüis.*
Delphinium, 213. 214. 253. *Pié d'alouete.*
Dentaria, 180 181. 228.
Dianthus, 143.* 144.* *Œillet, Mignonette.*
Dictamnus, 232. *Dictam.*
Diervilla, 136.
Digitalis, 66. 137. *Digitale, Gantelée.*

Dioſpyros, 59. 132. *Guayacana.*
Dipſacus, 155. 156. *Chardon du* Bonetier. *Verge à Paſteur.*
Dolichor, 192. *Haricot des Indes.*
Doronicum, 13. 84. 107. 118. 156. *Doronic.*
Doryenium, 214. *Embriaigue.*
Draba, 16. 27. 93. 118.
Dracocephalum, 144.
Droſera, 14. 15. *Roſſolis.*

E

Echinophora, 258. n. 17.
Echinops, 293.
Echium, 61. *Viperine.*
Eleagnus, 58.
Elaterium, 112.
Elatine, 164.
Elvela, 3.
Empetrum, 45. 92.
Ephedra, 125. *Raiſin dæ mer.*
Epilobium, 50. 53. 74. 75. 106. 143. *
Epimedium, 182. 249.
Equiſetum, 158. 159. 160. *Prêle.*
Erica, 46. 125. 169. 170. *Bruyeræ.*
Erigeron, 55. 81r 85.
Erinaceus, 2.
Erinus, 116.
Eriophorvm, 9.
Ervum, 233. n. 148. *Ers.*
Eryngium, 76. 209. 286. *Panicaut.*
Eryſimum, 74. 109. 113 283. 284. *Velar.*
Erythronium, obmiſſum pag. 14. n. 19. Vide 306.
Eſculus, 180. *Marronier d'Inde.*
Ethuſa, 262. *Petite ciguë.*
Evonymus, 151. * *Fuſain.*
Eupatorium, 195. *Eupatoire.*
Euphorbia, 5. 6. 46. 47. 51. 52. 67. 68. 98. 115.

126. 129. *Tithymale.*
Euphraſia, 138. 139. *Euphraiſe.*
F
Fagonia, 178. *La Fagon.*
Fagus, 59. 98. *Hêtre, Fau.*
Ferula, 257. *Ferule.*
Feſtuca, 38. 39.
Ficus, 117. 197. *Finguier.*
Filipendulæ, 224. 249. *Filipendule, Reine des prés.*
Fontinalis, 91.
Fragaria, 177. *Fraiſier.*
Frankenia, 46. 168.
Fraxinus, 219. 246. 249. *Frêne. Fraïſſe.*
Fritillaria, 41. *Fritillaire.*
Fucus, 28. 271.
Fumaria, 194. 263 *Fumeterre.*
Fungus, 1. 2. 3. *Champignon.*
G
Galega, 235.
Galeopſis, 143.
Galium, 161 162 *Caillelait.*
Garidella, 252. *La Garidel.*
Geniſta, 60. 61. 92. 93. 94. 170. *Gênet.*
Gentiana, 132. 133. 135. 136. *Gentiane, petite Centaurée.*
Geranium, 154. 181. 206. 207. 208. 227. 252. 286. *Bec de gruë.*
Geum, 224. *Benoite.*
Gladiolus, 41. *Glayeul.*
Glechoma. *Lierre terreſte. Rondotte.*
Globularia, 15. *Globulaire. Faux ſené.*
Glycyrrhiza, 232. 233. *Regliſſe, Regaluſſie.*
Glycine, 238.
Gnaphalicum, 48. 49. 80. 116. *l'herbe à cotton, immortelle, pié de chat.*
Gomphrena, 108. *Amaranthoide.*

Goſſypium,

Dioſpyros, 59. 132. *Guayacana.*
Dipſacus, 155. 156. *Chardon à Bonetier. Verge à Paſteur.*
Dolichos, 192. *Haricot des Indes.*
Doronicum, 13. 84. 108. 156. *Doronic.*
Dorycnium, 214. *Embraigue.*
Draba, 16. 27. 93. 111
Dracocephalum, 144. 8 *s Moldavique.*
Droſera, 14. 15. *Roſſoli.*

E.

Echinophora, 258. n. 17.
Echinopus, 293.
Echium, 61. *Viperine.*
Elæagnus, 58.
Elaterium, 112.
Elatine, 164.
Elvela, 3.
Empetrum, 45. 92.
Ephedra, 125. *Raiſin de mer.*
Epilobium, 50. 53. 74. 75. 106. 143. *
Epimedium, 182. 249.
Equiſetum, 158. 159. 160. *Prêle.*
Erica, 46. 125. 169. 170. *Bruyere.*
Erigeron, 55. 81. 85.
Erinaceus, 2.
Erinus, 116.
Eriophorum, 9.
Ervum, 233. n. 148. *Ers.*
Eryngium, 76. 209. 286. Panicaut.
Eryſimum, 74. 109. 113. 283. 284- *Velar.*
Erythronium, omiſſum, pag. 14. n. 19. Vide 306.
Eſculus, 180. *Marronier d'Inde.*
Ethuſa, 262. *Petite ciguë.*
Evonymus, 151. * *Fuſain.*
Eupatorium. 195. *Eupatoire.*

Euphorbia, 5. 6. 46. 47. 51. 52. 67. 68. 98. 115. 126. 129. *Euphorbe. Epurge. Tithymale.*
Euphraſia, 138. 139. *Eufraiſe.*

F.

Fagonia, 178. *La Fagon.*
Fagus, 59. 98. *Hêtre, Fau.*
Ferula, 257. *Ferule.*
Feſtuca, 38. 39. 310.
Ficus, 117. 197. *Figuier.*
Filipendula, 224. 249. *Filipendule, Reine des prés.*
Fontinalis, 91.
Fragaria, 177. *Fraiſier.*
Frankenia, 46. 168.
Fraxinus, 219. 246. *Frêne. Fraïſſe.*
Fritillaria, 41. *Fritillaire.*
Fucus, 28. 271.
Fumaria, 194. 263. *Fumeterre.*
Fungus, 1. 2. 3. *Champignon.*

G.

Galega, 235.
Galeopſis, 143.
Gallium, 161. 162. *Caillelait.*
Garidella, 252. *La Garidel.*
Geniſta, 60. 61. 92. 93. 94. 170. *Genêt.*
Gentiana, 132. 133. 135. 136. *Gentiane, petite Centaurée.*
Geranium, 154. 181. 206. 207. 208. 227. 251. 252. 286. *Bec de gruë.*
Geum, 224. *Benoite. Galiot.*
Gladiolus, 41. *Glayeul.*
Glechoma, 149. *Lierre terreſtre. Rondotte.*
Globularia, 15. *Globulaire. Faux ſené.*
Glycyrrhiza, 232. 233. *Regliſſe, Regaluſſie.*
Glycine, 238.
Gnaphalium, 48. 49. 80. 116. *l'herbe à cotton, Immortelle, Pié de chat.*

Gomphrena, 108. *Amaranthoide.*
Goſſypium, 199. *Cotton.*
Gratiola, 137. *Gratiole.*
Gramen. 311.

H.

Hedera, 100. 211. *Lierre.*
Hedyſarum, 61. 191. 233. *Sain-foin.*
Helenia, 88.
Helianthus, 156. 157. *Soleil. Taupinambour.*
Heliotropium, Omiſſum, pag. 102. n. 122. *Heliotrope.* Vide 305.
Helleborus, 167. 180. 206. *Hellebore, Marcioure, Herbe du feu.*
Helxine, 114. *Blé noir.*
Hemerocallis, 19. *Belle de jour.*
Hepatica, 204. *fleur de la Trinité.*
Heracleum, 230. 287. *Berce.*
Hermannia, 60.
Herniaria, 129. *Turquette, Herniole.*
Heſperis, 74. 78. 104. 282. *Julienne, Caſſolette.*
Heuchera, 30.
Hibiſcus, 60. 99. 201. *Roſe de Cayene.*
Hieracium, 83. 100. 109. 107 298. *Herbe à l'Eprevier. Piloſelle.*
Hypociſtis 4. *hypociſte.*
Hippocrepis, 236. *Fer à cheval.*
Hippuris, 159. *Peſſe d'eau.*
Holcus, 40. *Sorghi, Millet d'Inde.*
Hordeum, 39., *Orge, fourage, Pamoule, Ordi.* 311
Hottonia, 160. 222.
Humulus, 196. *Lupulus. Houblon.*
Hyacinthus, 17. 19. *Hyacinthe, Muguet.*
Hydnum, 2. 3.
Hydrocharis, 29. *Morſus ranæ.*
Hydrocotyle, 29.
Hydrophyllum, 174. 273.

Hyoſcyamus, 100. 104. 275. *Juſquiame, Hanne-bane, Careillade.*
Hyoſeris. 14. 300.
Hypecoum. 263.
Hypericum, 149. * *Millepertuis, Treſcalan.*
Hypnum, 33. 89. 90.
Hypochæris, 14. 83. 299. 300.
Hyſſopus, 143. 279. *Hiſope.*

J.

Jaſione, 64.
Jaſminum, 174. 221. 222. *Jaſmin.*
Jatropha, 202. *Caſſave.*
Iberis, 71. 72. 228. 281. 282. *Paſſerage.*
Ilex, Omiſſus, 210. n. 189. *Houx, Agrévou.*
Illecebrum, 126.
Impatiens, 77. *Balſamine.*
Imperatoria, 182. *Imperatoire. Auſtruche.*
Inula 85. 86. 108. *Enula campana.*
Ipomæa, 114. 222. *Campanete.*
Iris, 18. 40. 41. 43. *Flambe.*
Iſatis, 78. 120. *Paſtel, Guéde.*
Juglans, 219. *Noyer.*
Juncus, 2. 25. *Jonc.*
Jungermannia, 31. 33. 91. 217.
Juniperus, 125. 169. *Genevrier, Oxycedre, Savinier.*
Juſticia *omiſſa*, 140. n. 145. Vide 306.
Iſchœmum, 34. *Pié de poule.*
Iſis, 11. *Corail.*

K.

Kleinia, 6. 52. 81. *Antieuphorbe.*
Knautia, Omiſſa, 272. n. 220. pag. 307.

L.

Lactuca, 83. 295. 296. *Laituë.*
Lagœcia, 227. *Nid. de liévre.*
Lagurus, 38. *Queuë de liévre.*

Lamium, 150. *Archangelique. Ortie morte.*
Lapſana, 82. 83. 169. 301. *Lapſane.*
Laſerpitium, 257. 261. 287.
Lathræa, 4. *Clandeſtine.*
Lavandula, 143. 279. *Lavande. Spic.*
Lavatera, 101. 113. 199. 200.
Lathyrus, 155. 192. 193. 194. *Geſſe.*
Laurentia, 91.
Laurus, 59. *Laurier.*
Lemna, 31, 91. 159.
Leontice, 195. *Leontopetalon.*
Leonrodon, 13. *Dent de Lion. Piſſen-lit.*
Leonurus, 141. 147. 203. *Agripaume. Cardiaca.*
Lepidium, 49. 72. 78. 93. 118. 120. 228. 254. 281. *Naſitord.*
Leucoium, 18. *Percenege.*
Lichen, 11. 30. 270. 271. *Lichen. Perelle.*
Liguſticum, 259. 271. *Liveche.*
Liguſtrum, 130. *Troêne.*
Lilium. Vide Lirium. *Lys.*
Limodorum, 4.
Linnæa, 137.
Linum, 49. 53. 56. 92. 147. * *Lin.*
Lirium, 41. 42. 162. *Lys, Ely.*
Lithoſpermum, 50. 62. 63. *Gremil.*
Lolium, 39. *Ivraye, Giol, Margal.*
Lonicera, 136. 139. 140. *Chevrefeuil, Maire ſauve.*
Lotus, 188. 189. *Lotier.*
Lunaria, 113. *Lunaire.*
Lupinus, 214. 215. *Lupin.*
Lupulus, 196. *Houblon.*
Lychnis, 146. *
Lycium, 56.

Lycoperdon, 1. *Veſſe de Loup. Truffe.*
Lycopſis, 62.
Lycopus, 148. 279. *Crumene.*
Lyſimachia, 130. 135. 165. *Corneille, Nummulaire.*
Lythum, 49. 53. 143.* *Salicaire.*

M.

Madrepora, 12.
Malope, 99. 201.
Malva, 99. 200. 274. *Mauve.*
Mandragora, 14. *Mandragore.*
Marchantia, 31. 270.
Marrubium, 150. 151. *Marrube.*
Marſilea, 31.
Matricaria, 266. 267. *Matricaire, Camomille.*
Medicago, 186. 187. *Luſerne.*
Melampyrum, 138. 277. *Blé de vache.*
Melia, 248. *Azedarach, Pater noſter.*
Melianthus, 232. *Meliante.*
Melica, 35.
Meliſſa, 149. *Meliſſe, Citronelle, Calament.*
Melitis, 150.
Meloppo, 11. *Potiron.*
Meniſpermum, 113.
Mentha, 142. 143. 148. *Menthe, Baume. Pouliot.*
Menyanthes, 29. 173. *Nymphoides.*
Mercurialis, 128. *Mercuriale, Foirole.*
Merulius, 3.
Meſembryanthemum, 6. 101. 133.
Meſpilus, 59. 95. 96. *Neſlier.*
Milium, 35. *Millet.*
Millepora, 12.
Mimoſa, 250. *Senſitive.*
Mirabilis, 134.
Mnium, 33. 91.
Mœhringia, 123. 142.*

Mollugo, 164.
Molluccella, 150. 203.
Momordica, 199. *Pomme de Merveille.*
Montia, 127.
Morus, 117. 198. *Meurier.*
Mucor, 3. 4. *Moiſiſſure.*
Myagrum, 77. 280.
Myoſotis, 63. *Oreille de Souris.*
Myoſurus, 26.
Myrica, 57. *Galé.*
Myriophyllum, 150. *Volant d'eau.*
Myrtus, 94. *Mirte, Meurtre.*
Myxa, 98. *Sebeſte.*

N.

Najas, 124. 159. *Nayade.*
Narciſſus, 17. 19. *Narciſſe, Coutelle, Jonquille.*
Nardus, 26. 35. *Nard.*
Neotia, 4. 25.
Nepeta, 151. *Herbe au chat.*
Nerion, 169. *Laurier-roſe.*
Nicotiana, 100. 104. *Tabac.*
Nidus avis, 4.
Nigella, 252. 253. *Nielle.*
Nyctanthes, 137. *Jaſmin d'Arabie.*
Nymphæa, 29. *Nenuphar. Nymphée.*

O.

Ocymum, 147. *Baſilic.*
Œgopodium, 182. *Podagraria.* Offic.
Œnanthe, 257. 259. 260.
Œnothera, 74. 106. *Onagra.*
Olea, 58. *Olivier.*
Ononis, 189. 190. *Arrête beuf, Lente.*
Onopordon, 79. 80. 290. *Pet d'âne.*
Ophyogloſſum, 107. *Ophiogloſſe. langue de ſerpent.*
Ophrys, 4. 128. *Double feüille.*
Opulus, 202. *Obier.*

Opuntia, 5. *Raquette.*
Orchis, 4. 22. *Jallet.*
Origanum, 147. *Origan, Marjolaine. Dictame de Crete.*
Ornithogalum, 19. *Ornitogale.*
Ornithopus, 192. 236. *Pié d'oiſeau.*
Orobanche, 4. 5.
Orobus, 235. 236. *Orobe.*
Oryza, 35. *Ris.*
Oſmunda, 218. 244. *Fougere fleurie.*
Oſyris, 56. *Caſie.*
Othonna, 88. 302.
Oxalis, 173. *Alleluya. Lujula.*

P.

Padus, 59. 60. 97. *Laurïer-ceriſe.*
Pæonia, omiſſa, pag, 249. n. 36. *Pivoine.* Vide 307.
Pancratium, 18.
Panicum, 34. 35. *Panis.*
Papaver, 77. 252. 285. *Pavot. Coquelicoc, Roüelle.*
Parietaria, 202. *Parietaire, Herbe de Notre-Dame.*
Paris, 167. *Raiſin de Renard.* 114.
Parnaſſia. 114.
Parthenium, 294.
Paſſerina, 92.
Paſſiflora, 209. 210. *Fleur de la Paſſion.*
Paſtinaca, 230. *Panais. Paſtenade.*
Pavia, 180. n. 55.
Pedicularis, 247. 278. *Pediculaire.*
Peganum, 208.
Peplis, 127.
Periploca, 133.
Perſicaria, 16. 66. 67. *Perſicaire. Poivre d'eau. Curage.*
Peucedanum, 182. 257. 259. *Queuë de pourceau*
Peziza, 3.
Phaca, 237.
Phalaris, 37. 311. *Canari.*

Phallus,

Phallus 3. *Priape.*
Phaſeolus, 191. 192. *Haricot.*
Pellandrium, 256.
Phyladelphus, 136. *Siringa.*
Phyllirea, 130. 136. *Filaria.*
Phleum, 26. 34.
Phlomis, 143. 152. 279. *Herbe du vent.*
Phœnix, omiſſa 56. *Dattier.*
Phyſalis, 164. *Coqueret, Alkekenge. Coquerelle.*
Phyteuma, 50. 51. *Raiponce.*
Phytolacca, omiſſa, 102. n 120. Vide 307.
Pieris, 82. 395. *Pieris.*
Pimpinella, 231. *Bouquetine, Boucage.*
Pinguicula, 14. *Graſſete*
Pinus, 44. *Pin.*
Piſtacia, 172. 219. *Piſtachier, Terebinte, Lentiſque.*
Piſum, 233. *Pois.*
Plantago, 16. 26. 28. 126. 275. *Plantain, Plantage.*
Platanus, 197. *Plane, Platane.*
Plumbago, 63. *Malherbe, Dentelaire.*
Poa, 36. 37. 311. *Colombat.*
Poinciana, 249. *Poincillade.*
Polemonium, 221.
Polianthes, 41. *Tubereuſe.*
Polychnemum, 45.
Polygala, 52. 53.
Polygonum, 53. 92. *Renoüée, Trinquetaille, Trainaſſe.*
Polypodium, 218. 244. 245 270. *Polypode.*
Polytrichum, 32. 90. *Perce mouſſe.*
Populus, 99. 198. *Peuplier, Tremble, Aubier, Pivou.*
Porrum, 10 43. 44. *Poireau.*
Portulacca, 77. 168. *Pourpier.*
Potamogeton, 14. 45. 50. 55. 56. 75. 124.
Potentilla, 179. 223. 224. *Argentine. Quinteſeuille.*
Poterium, 220. 221.
Praſium, 144.

Prenanthes, 82. 109. 296.
Primula, 13. *Primevere, Oreille d'Ours.*
Prunus, 94. 95. 110. *Prunier. Abricotier, Prunellier.*
Pſoralea, 190.
Pteris, 218. 244. 245, 270. *Fougère.*
Pulmonaria, 62. 101. *Pulmonaire.*
Pulſatilla, 181. 206. 254. *Coquelourde.*
Punica, 59. 149. * *Grenadier, Miougranier.*
Pyrola, omiſſa, 116. n. 245. *Pirole.* Vide 305.
Pyrus, 97. 110. *Poirier, Pommier, Coignaſſier.*

Q.

Quercus, 96. 198. 271. 272. *Chêne, Yeuſe, Rouve.*

R.

Ranunculus, 27. 54. 75. 76. 110. 111. 154. 180. 181. 204. 205. 227. 253. *Renoncule. Bacinet, Bouton d'or.*
Raphanus, 285. *Raifort, Radis.*
Reſeda, 48. 194. *Gaude.*
Rhamnus, 59. 95. *Nerprun, Jujubier, Palivre, Bourgêne.*
Rheum, 28. 118. *Rhubarbe, Rapontic.*
Rhinanthus, 138.
Rhodiola, 77. 116. *Radix. Rhodia*, offic.
Rhus, 172. 227. *Sumach.*
Ribes, 210. 211. *Groſelier.*
Riccia, 31.
Ricinus, 197. *Riccin.*
Rivinia, omiſſa, 102. n. 120. Vide 306.
Robinia, 238. *Acacia.*
Roſa, 225. 226. *Roſier, Eglantier, Kinorhodon.*
Roſmarinus, 141. *Romarin.*
Rubia, 161. *Garance.*
Rubus, 177. 178. 211. 233. *Ronce.*
Ruellia, 138.
Rumex, 69. 70. 101. 111. 121. 272. *Patience, Ozeille, Rouvirgue. Surelle, Agrete.*

Ruſcus, 59. 94. *Houxfrelon, Verbouïſſet.*
Ruta, 249 *Rhuë, Rude.*

S.

Sagina, 142. *
Sagittaria, 27. 29. 77. *Sagette.*
Salicornia, 7. *Salicor, Sonſouïre.*
Salix, 57. 58. 98. 125. 172. *Saule, Marſaule, Ozier, Amarinier.*
Salſola, 7 147.* *Soude.*
Salvia, 143. 146. 175. 278. *Sauge. Sclarée Orvale. Prudhomme, Tonte bonne.*
Salvinia, 218.
Sambucus, 222. *Sureau, Sambuc, evou.*
Samolus, 65. *Panfourmen.*
Sanguiſorba, 220. *Pimprenelle.*
Sanicula, 109. *Sanicle.*
Santolina, 80. *Garderobe.*
Saponaria, 107. 144. * 145. * 153. *Savonaire.*
Satureia, 142. *Sariette.*
Satyrium, 24. *Satirion.*
Saxifraga, 52. 116. 151. * 208. 209. *Saxifrage. Percepierre.*
Scabioſa, 156. 241 342. 268. *Scabieuſe. Remors.*
Scandix, 260. *Peigne de Venus.*
Schinus, 224. *Molle, arbor. Clus Faux poivrier.*
Schænus, 9. 22.
Scilla, 18. 19. *Squille.*
Scirpus, 8. 9. *Jonquine, Bore.*
Scleranthus, 124.
Scolymus, 295. *Cardouſſe.*
Scorpiurus, 61. *Chenille.*
Scorzonera, 82. 296. *Scorzonere.*
Scrophularia, 116. 118. 138. 166. 223. 257. 177. *Scrophulaire. Herbe du ſiege.*
Scutellaria, 146. 147.
Secale, 35. 311. *Seigle.*

Securidaca. *Vide.* Coronilla. 235.
Sedum, 7. 8. 76. 77. 116. 150. * *Triquemadame. Repriſe Orpin.*
Selinum, 232. 261, 262.
Sempervivum . 76. *Joubarbe.*
Senecio, 85. 240. 265. 294. 301, 302. *Seneçon, Verge d'or.*
Serapias, 42. 107.
Serratula, 239. 262.
Sertularia, 11.
Seſamum, 137. *Seſame.*
Seſeli, 255. 256. *Seſeli.*
Sherardia, 163. *La Sherard.*
Sicyos, 113.
Sida, 113. 201.
Sideritis, 142. 145 749. 279. *Siderite.*
Silene, 27. 145. * 146. * 153. *Silene.*
Simplanobla, 169.
Sinapis, 230. 255. 284. *Moutarde.*
Siſon, 232 257. *Siſon.*
Siſymbrium, 73. 109. 228. 229. 255. 283. *Creſſon d'ean.*
Sium, 231. 232. 259. 261. Berle. *Chervi.*
Smilax, 113.
Smyrnium, *Maceron.*
Solanum, 58, 103. 220. 246. 274. *Morelle, pomme d'amour. douce-amere, loque. Aubergine moyene.*
Soldanella 29. 110. *Soldanelle.*
Solidago, 84. 302. *Verge dorée.*
Sonchus, 81. 300. *Laitron.*
Sorbus, 223. *Sorbier.*
Sparganium, 40.
Spartium, 60. 93. 191.
Spergula, 45. 141. * 167. 168.
Sphagnum, 33. 90. 91.
Sphæra marina, 3.

Spinacia, 273. *Epinard.*
Spiræa, 58.
Spongia, 4. *Eponge.*
Squamaria, 4.
Stachys, 142. 144. 151. 152.
Stapelia, 6. *Fleur du crapaud.*
Staphylæa, 248. *Nés coupé.*
Statice, 15. 27. 28. 286. *Gazon d'Eſpagne.*
Stelaria Vide Coriſpermum.
Stellera, 69.
Styrax, omiſſa, 210. n. 189. *Storax.* Vide 305.
Symphytum, 62. *Conſoude. Oreille d'âne.*
Syringa, 130. 136. 221. *Lilac.*

T.

Tagetes, 241. *Paſſevelours Œillet d'Inde.*
Tamarix, 45. *Tamaris.*
Tamus, 113. *Sçau de la Vierge. Tamnus. Racine Vierge.*
Tanacetum, 81. 239. 265. 294. *Tanaiſie. Mente-coque.*
Taraxacum, 296. 297. *Piſſenlit.*
Taxus, 220. *If.*
Telephium, 227.
Tetragonia, 124.
Teucrium, 147. 144. 145. 175. 203. 248. 278. *Chenete, petit Chêne. Chamaras. Jvette. Marum.*
Thalictrum, 250. 251. *Thalictron.*
Thapſia, 258. *Tapſie.*
Theligonum, 102. 129. *Cynocrambe. Chou de Chien.*
Theſium, 78. 126.
Thlaſpi, 53. 71. 78. 120. 281. *Taraſpic. Bourſette.*
Thuya, omiſſa, 125. n. 17. Vide 306. *Arbre de vie.*
Thymus, 148. *Thim, Serpollet.*
Tilia, 110. *Tillau, Tilleul.*
Tillæa, 129.
Tithymalus, *Reveille-matin.*

Tinus, 137. n. 115. *Lauriertin, Lauretin.*
Tordylium, 230. 259.
Tormentilla, 179. *Tormentille.*
Tournefortia, 101. *la Tourneſort.*
Trachelium, 173.
Tradeſcantia, 23.
Tragacantha, 237. *Adragant. Barberenard.*
Tragopogon, 82. 295. *Sarciſi, Barbe de bouc.*
Trapa, 228. *Mâcre.*
Tremella, 4. *Boyau de chat.*
Trianthema, 127.
Tribulus, 227.
Trichomanes, 218. n. 14.
Trifolium, 17 . 183. 184. 185. 186, 214. *Trefie, Triolet, Melilot.*
Triglochin, 19.
Trigonella, 18-. *Fenugrec, Senegré*
Trionum, 201. n. 42.
Triticum, 39. *Blé Froment, Touzelle, Seiſſette.*
Tropæolum, omiſſum, 114. n. 218. Vide 305. *Capucine.*
Tulipa, omiſſa, 17. n. 44. Vide 307. *Tulipe.*
Turritis, 73. 121. 282. 283. *Tourete.*
Tuſſilago, 30. 113. *Pas d'âne, Tuſſilage, Petaſite.*
Typha, 20. *Maſſe.*

V.

Vaccinium, 95. *Mirtille. Airelle.*
Valantia, 162. 163. *La Vaillant. Croiſette.*
Valeriana, 130. 131. 134. 138. 2221. 275. 276. *Valeriane. Mache Blancbette.*
Vella, 254. 280.
Veratrum, 107. 7. *Varaïre, Hellebore noir.*
Verbaſcum, 65. 66. 104. 105. 276. *Bouillon blanc. Molene.*
Verbena, 145. 248. 279. *Verbene.*
Verbeſina, 83. 195. 240. 265.

Veronica, 101. 114. 131. 134. 135. 165. 173. 202. *Veroniqne. Beccabunga ,Creſſon de fontaine.*
Viburnum, 136. *Viorne.*
Vicia, 234. 235. *Veſſe,*
Vinca, 133. *Prévanche.*
Viola, 29. 105. 111. *Violier, Penſée.*
Viſcus, 125. *Guy.*
Vitex, 176. *Agnus caſtus.*
Vitis, 180. 210 *Vigne. Muſcat. treille &c.*

U.

Ulmus, 98. *Ormeau, Orme, Oume.*
Urtica, omiſſa, 129. n. 54. Vide 306. *Ortie.*
Utricularia, 222. 248.

W.

Waltheria, 60.

X.

Xanthium, 118 215. *Lampourde.*
Xeranthemum, 54. 88.
Xylon, 199. *Cotton.*

Y.

Yucca, *Vide* Cordiline.

Z.

Zanichelia, 50. 124.
Zea, 40. *Mays, Blé de Turquie.*
Zoztera, *Vide* Alga, *Algue.*
Zygophyllum, 177.

ERRATA.

E R R A T A.

Pag. 5. lin. 4. A Phllæ, *leg.* aphyllæ.
N. 48. ſellilibus, *leg.* ſeſſilibus.
Pag. 18. n. 56. malantibus, *leg.* nutantibus. Ornyto galum, *leg.* ornithogalum.
Pag. 19. & 20. lin. 1. graminifoliæ, *leg.* enſiformis.
Pag. 23. lin. 2. prelenſis, *leg.* pratenſis.
N. 116. ſub palmatis, *leg.* ſubpalmatis.
Pag. 24. n. 121. nutente *leg.* nutante.
Pag. 25. n. 127. ſuciflora, *leg.* fuciflora.
Pag. 26. n. 141. diendris, *leg.* diandris.
N. 146. ſpipâ, *leg.* ſpicâ.
Pag. 27. n. 151. ſychn. *leg.* lychn.
N. 152. babunculus, *leg.* ranunculus.
N. 155. vividis, *leg.* viridis.
N. 159. ſertato, *leg.* ſerrato.
Pag. 31. n. 201. atro vireus, *leg.* atrovirens; pro licheus, *leg.* lichen.
Pag. 32. lin. 4. bricy, *leg.* bry.
N. 50. patento, *leg.* patente.
Pag. 37, n. 61. Binn. *leg.* Linn.
N. 63. corolle, *leg.* corolla.
Pag. 38. n. 79. plannatis, *leg.* planatis.
N. 94. raditce, *leg.* radice; pro modio, *leg.* medio.
N. 94. diſtychâ & disſtychum, *leg.* deſtichâ &c.
Pag. 40. lin. 2. monica, *leg.* monoica.
N. 107. barbaris, *leg.* barbatis.
Pag. 45. n. 151. differà, *leg.* differt à.
N. 156. pectantibus, *leg.* ſpectantibus.
N. 169. l'es, *leg.* lez; pro heraciæ, *leg.* herbaceæ.
Pag. 47. lin. 2. phitruſæ faciæ, *leg.* pityuſæ facie.
N. 176. bracteiſe, *leg.* bracteis.
Pag. 50. n. 204. ſeraceis, *leg.* ſetaceis.
Pag. 52. lin. 3. luſulata, *leg.* lunulata.
Pag. 53. n. 233. filiculis, *leg.* filiculis; & pro ſexatile, *leg.* ſaxatile.
Pag. 54. n. 246. ſarratis, *leg.* ſerratis.
N. 248. inequatis, *leg.* inæquatis.
Pag. 55. n. 255. perunculis, *leg.* pedunculis.
N. 257. levirer, *leg.* leviter.
Pag. 56. n. 268. retrandis, *leg.* tetrandis.
Pag. 57. n. 272. inlerfolia, *leg.* inter folia.
Pag. 58. n. 280. ablongo, *leg.* oblongo.
Pag. 60. n. 303. dulcià, *leg.* dulci.
N. 308. obvesè, *leg.* obverſé.
Pag. 65. n. 357. batbatus, *leg.* barbatus.
Pag. 66. n. 367. d'ean, *leg.* d'eau.

Pag. 68. n. 378. bifidis D. C. B. *dele* C. B.
Pag. 69. n. 386 Manguio, *leg.* Mauguio.
Pag. 70. n. 391. rumeu, *leg.* rumex.
Pag. 73. n. 419. confeſtis, *leg.* confertis.
N. 421. amplanicaſilibus, *leg.* amplexicaulibus.
Pag. 74. n. 429. ſuttecta, *leg.* ſurrecta.
Pag. 76. n. 448. floripus, *leg.* floribus.
N. 450. cepæiæ, *leg.* cepæa,
N. 451. ſylveſtro, *leg.* ſylveſtre.
Pag. 77. n. 455. poſtulaca, *leg.* portulaca.
N. 458. Boesh. *leg.* Boerrh.
N. 459. flax, *leg.* flor.
N. 460. confeſtis, *leg.* confertis.
Pag. 82. n. 502. perri, *leg.* porri.
N. 504. pannoica, *leg.* pannonica.
N. 505. foiiis, *leg.* foliis.
Pag. 83. n. 506. vallis, *leg.* Vaillant.
N. 508. focani, *leg.* focami.
Pag. 84. n. 515. denticularis, *leg.* denticulatis.
N. 517. maxicana, *leg.* mexicana.
Pag. 85. n. 527. æcris, *leg.* acris.
Pag. 89, lin. 2. hiſpn. *leg.* hypn.
Pag. 91. lin. 27. icou, *leg.* icon; Luvel, *leg.* Lunel.
Pag. 94. n. 47. lincari aminima, *leg.* linearia minima.
N. 54. vatomagno, *leg.* ovato magno.
N. 72. rubta, *leg.* rubra.
Pag. 97. n. 74. ois, *leg.* bois.
N. 75. pallaſcente, *leg.* palleſcente.
Pag. 99. n. 87. folia, *leg.* folio.
Pag. 100. n. 96. amplexicalibus, *leg.* amplexicaulibus.
Pag. 101. n. 109. Meſentryanthemum, *leg.* Meſembryanthemum.
N. 111. alperugo, *leg.* aſperugo.
N. 118. fæditum, *leg.* fetidum.
N. 130. dulamara, *leg.* dulcamara.
N. 130. inregerrimis, *leg.* integerrimis.
Pag. 104. n. 143. Tricotiana, *leg.* Nicotiana.
Pag. 107. n. 163. opyogloſſum, *legr* ophiogloſſum.
N, 183. lenneoii, *leg.* leucoii.
N. 199. andogymum *leg.* androgynum.
N. 202. arieſt. *leg.* ariſtolochia.
Pag. 116. n. 247. portulaea, *leg.* portulaca.
Pag. 119. n. 272. crambo, *leg.* crambe.
Pag. 120. lin. 1. oboerſe, *leg.* obverſe.
Pag. 129. n. 53. apoſita, *leg.* oppoſita.
Pag. 130. n. 56. crenanis, *leg.* crenatis.
Pag. 133. n. 85. alrernis, *leg.* alternis.
N. 86. lilio, *leg.* lilii; rubuntis, *leg.* rubentis.
Pag. 134. n. 97. junge ſyllabæ *tis* lin. 2. *ova* quam invenies initio lin. ſubſequentis.
N. 98. alrernis *leg.* alternis.
Pag. 137. lin. 15. corollæ, *leg.* corolla.
Pag. 140. n. 144. chamæceſarus, *leg.* chamæceraſus.

Pag. 141. n. 146. laverdulæ, *leg.* lavendulæ.
Pag. 146. n. 178. ſelarea, *leg.* ſclarea.
N. 183. ſavivum, *leg.* ſativum.
Pag. 148. n. 202. ſyveſtris, *leg.* ſylveſtris.
N. 205. pluegium, *leg.* pulegium.
Pag, 145. n. 270. mujuſculo, *leg.* majuſculo; luch. *leg.* lych.
N. 274. triſtilaa, *leg.* triſtila.
Pag. 152. n. 325. holeſteus, *leg.* holoſteus.
Pag. 160. n. 18. myriph. *leg.* myrioph.
Pag. 163, n. 37. aperine, *leg.* aparine.
Pag. 16s. n. 68. poſtul. *leg.* portul.
Pag. 171. lin. penult. ſi ſi, *leg.* ſi; lin. ult. diſtingua, *leg.* diſtinguat.
Pag. 179. n. 41. folio, *leg.* foliis.
Pag. 185. n. 89. fiicinarum, *leg.* officinarum.
Pag. 186. n. 91. ſpæricis, *leg.* ſphæricis.
Pag. 187. n. 102. ſphoridæus, *leg.* ſphæroidæus.
Pag. 189. n. 116. inernis, *leg.* inermis.
N. 117. oononis, *leg.* ononis.
Pag. 198. n. 13. folia, *leg.* foliis; citrilus, *leg.* citrullus.
Pag. 199. n. 17. mem. *leg.* mom.
Pag. 201. n. 36. parmrto, *leg.* palmato.
N. 41. kermia, *leg.* ketmia.
N. 43. lonciolato, *leg.* lanceolato.
Pag. 203. lin. 9. palmata, *leg.* palmatæ.
Pag. 206. n. 77. brec, *leg.* bec.
Pag. 254. lin. 3. puſatilla. *leg.* pulſatilla.
Pag. 256. n. 97. elaticus, *leg.* elatius.
N. 99. aham, *leg.* atham.
Pag. 257. lin. 2. fulcaro. *leg.* ſulcato.
Pag. 263. n. 147. aquileginæ. *leg.* aquilegiæ.
Pag. 265. n. 180. penunculatis, *leg.* pedunculatis.
Pag. 221. n. 39. valeriana eſt ſynonymum polemonii.

Errores typographicos leviores, Auctore abſente commiſſos benignus Lector excuſet. Legatque fetidum ubi fœditum, ſphæricum ubi ſphericum, ſeſſilibus ubi ſellilibus, Hypociſtis ubi Hipociſtis, cylindricus ubi cilindricus, ſaxatile ubi ſexatile, ſerratis ubi ſerraris, &c.